

تنوع گونه ای خانواده سیرفیده (Diptera: Syrphidae) در بوم نظامهای کشاورزی شهرستان نیشابور

مهدي حسيني - حسين صادقي نامقى^{۱*}

تاریخ دریافت: ۸۶/۸/۲۸

تاریخ پذیرش: ۸۷/۲/۲۳

چکیده

در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بررسیهایی به منظور جمع آوری و شناخت تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظامهای کشاورزی شهرستان نیشابور انجام گرفت. در این مطالعه از سه روش جمع آوری: تله زرد آبی، تله مالایز و تور حشره گیری استفاده شد. نتایج تفاوت قابل ملاحظه ای را در شکار سیرفیدها توسط روش های مختلف جمع آوری نشان داد. نمونه هایی از ۱۴ گونه بوسیله تله مالایز، ۵ گونه با تله زرد آبی و ۸ گونه فقط با تور حشره گیری شکار شد. در مجموع، ۲۲ گونه متعلق به ۱۴ جنس از خانواده سیرفیده شناسایی و تأیید شده است. تمامی گونه ها برای اولین بار از شهرستان نیشابور گزارش می شوند. از این تعداد، گونه های *E.jacobsonni*, *Eumerus trivittatus* و *Helophilus tricolor* برای فون خراسان رضوی جدید هستند. با گزارش گونه ای از نیشابور دامنه انتشار این گونه که تاکنون محدود به جنوب شرق ایران بود گسترش می یابد. محاسبه تنوع زیستی بر اساس شاخص تنوع شانون- وینر، مقدار این شاخص را برای تله مالایز بیشتر از تله زرد آبی نشان داد.

واژه های کلیدی: فون، حشرات، مگس های گل، اکوسیستم های کشاورزی، نیشابور

هوورفلای^۱ نیز شهرت دارند. مگس های بالغ این خانواده اغلب با داشتن رگبال دروغی حدفاصل رگبال شعاعی (R) و میانی (M) از سایر دوبالان متمایز می گردند. جثه آنها متوسط تا بزرگ، طول بین ۴ تا ۲۵ میلیمتر، رنگ بدند حشرات کامل متنوع بوده و اغلب تیره و همراه با نقش زرد رنگ می می باشد. با این حال، برخی گونه ها مانند جنس های *Cheilosia* و *Pipizella* کاملاً تیره اند و شماری نیز مانند جنس های *Volucella*, *Merodon*, *Helophilus* و *Eristalis* شباهت زیادی به زنبور عسل و دوبالان زنبور نما

مقدمه

مگس های گل با بیش از ۶۰۰۰ گونه در دنیا یکی از بزرگترین خانواده های دوبالان می باشند (۳۰). با توجه به تنوع غذایی لاروهای این خانواده، مگس های گل در زیستگاه های متنوعی یافت می شوند. حشرات بالغ اغلب حول و حوش گلهای به وفور مشاهده می شوند و به همین دلیل به مگس های گل معروفند از طرفی بعلت داشتن توانایی در جا بال زدن به

۱- به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

Email: Husseinsadeghi@yahoo.co.uk

نویسنده مسئول

در تضاد با حشرات کامل، لاروها رژیم‌های غذایی متنوعی نظیر گیاهخواری (گونه‌های جنس *Eumerus* و *Merodon*، شکارگری (گونه‌های زیرخانواده *Syrphinae*)، قارچ خواری (گونه‌های *Cheilosia*) و پوسیده خواری (نظیر گونه‌های جنس *Eristalis*) دارند. لارو اعضای زیرخانواده *Syrphinae* از دشمنان طبیعی حشرات آفت بویژه شته‌ها و شپشک‌ها هستند (۳۴).

علی‌رغم اهمیت اعضا این خانواده در حفظ تعادل طبیعی جمعیت برخی حشرات آفت و اهمیت آنها در گرده افشاری گیاهان، در مقایسه با سایر کشورها مطالعات اندکی روی این حشرات در ایران صورت گرفته است (۱-۲۶). تا جاییکه از ۶۰۰۰ گونه گزارش شده در سراسر دنیا سهم ایران با فلور متنوع فقط اندکی بیش از ۲ درصد گونه‌های شناخته شده می‌باشد (۲۸). علاوه بر این، از جنبه‌های کاربردی، اطلاعات در زمینه زیستگاهها، پراکنش، دوره فعالیت، کارایی گونه‌های شته خوار، دشمنان طبیعی سیرفیدها و نقش آنها در گرده افشاری گلهای نیز اندک است (۱۱). لذا این مطالعه با هدف شناسایی فون خانواده سیرفیده در منطقه نیشابور که تا حال ناشناخته بود صورت پذیرفته است تا گامی در جهت تکمیل فون این خانواده در ایران باشد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق طی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در شهرستان نیشابور خراسان رضوی انجام گرفت. این شهرستان به وسعت ۹۳۰ کیلومتر مربع، از شمال به قوچان و از شرق به مشهد، از غرب به اسفراین و سبزوار و از جنوب به تربت حیدریه و کاشمر محدود است. کوههای بینالود در شمال آن از مهمترین سلسله جبال استان خراسان می‌باشد که دنباله رشته کوههای البرز و بصورت شمال غربی و جنوب شرقی کشیده شده و بلندترین قله آن در قسمت نیشابور از ۳۳۰۰ متر تجاوز می‌نماید. با وجود این رشته کوه که تاثیر بسزایی

دارند و برخی نیز مانند جنسهای *Syrophus* و *Chrysotoxum* شبیه به زنبورهای زرد (Vespidae) هستند. شباهت ظاهری که این مگسها به زنبورها دارند به عنوان یک مکانیسم دفاعی در برابر شکارگران محسوب می‌شود (۳۱ و ۳۷).

غذای اصلی حشرات کامل مگسها گل را اغلب شهد و گرده گلهای تشکیل داده، بخصوص در مورد ماده‌ها تغذیه از گرده گلهای برای تکوین جنسی آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. سیرفیدهای نر زمان زیادی را در طول روز صرف جستجوی در میان گلهای گیاهان مختلف می‌کنند. این کار در جستجوی یافتن منابع شهد و گرده و هچنین به خاطر یافتن افراد ماده در مکانهای پر گل صورت می‌گیرد (۲۹).

تحقیقات نشان داده است که جذایت گیاهان گلدار برای سیرفیدهای بالغ و حتی در بین جنس‌های مختلف تفاوت فاحش دارد (۲۹). اغلب گونه‌های جنس *Paragus* گیاهان کوتاه قد مثل *Potentilla* و *Galium sactile* و *Eristalis erecta* و گونه‌های جنس‌های دیگر نظیر *Volucella* بوته‌های بلند و گلهای درختان میوه را انتخاب می‌کنند. مطالعات روی *Episyphus balteatus* روی شهد و گرده ییشتۀ زرد رنگ با اختلاف معنی داری نسبت به بقیه گلهای زرد رنگ با اختلاف معنی داری نسبت به قرار می‌گیرند. علاوه، گلهای زرد کوچکتر ولی با میزان شهد و گرده بیشتر مورد علاقه این حشره هستند.

بعضی آزمایشها نشان دهنده آن است که این حشرات در بازدیدهای روزانه خود تمایل دارند که از هر گل فقط یکبار بازدید کنند (۳۱). بنابراین مگس‌های سیرفیده گرده افشاری‌های بالقوه ای برای بسیاری از گلهای نظیر گلهای خانواده کمپوزیته و چتریان و گونه‌هایی مانند خرما که تک پایه هستند می‌باشند. آزمایشها در ژاپن نشان داده است که موهای موجود روی بدن مگس‌های جنس *Eristalis* نقش مهمی در گرده افشاری گلهای درختان سیب بوسیله این حشرات دارد (۳۳).

کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه‌های مستند نگاهداری می‌شوند.

تنوع زیستی خانواده سیرفیده بر اساس داده‌های ۱۰ هفتنه نمونه برداری با تله‌های مالایز و زرد آبی در ایستگاه باغشن گچ نیشابور با محاسبه شاخص شانون-وینر (۳۵) محاسبه شد. بعلاوه با برآورد ضریب سورنسون (SQ) میزان همپوشانی دو تله مالایز و زرد آبی در شکار دوبالان خانواده سیرفیده تعیین شد. ضریب سورنسون بین صفر برای عدم مشابهت و ۱ برای مشابهت کامل متغیر است.

نتایج

در این بررسی ۲۲ گونه از دوزیر خانواده و ۱۴ جنس بشرح جدول‌های ۱ و ۲ شناسایی شد که همگی آنها برای فون شهرستان جدید می‌باشند. در این جدول‌ها، گونه‌های ستاره دار(*) برای اولین بار از استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و اسمای بدون ستاره شامل گونه‌هایی است که قبلاً از ایران گزارش شده‌اند.

با ملاحظه تاریخ‌های جمع آوری، بیشترین تنوع گونه‌ای سیرفیده‌ای زیر خانواده سیرفینه در ماههای اردیبهشت و خرداد و به مقدار کمتری در شهریور و اوایل مهر ماه مشاهده گردید. در بین گونه‌های این زیر خانواده، دوره فعالیت فصلی گونه‌هایی نظیر *Episyrrhus balteatus*، *Sphaerophoria scripta* و *Eupeodes corollae* اغلب نمونه‌ها فراوانی بیشتری نیز داشتند طولانی تر از بقیه و تقریباً از اواسط فروردین ماه تا اواخر خرداد با نوساناتی فعال بودند. گونه *Melanostoma mellinum* فقط در دو نوبت و در شهریور ماه ۱۳۸۵ جمع آوری شد. در بین گونه‌های زیر خانواده میلسینه (Milesiinae)، گونه‌هایی نظیر *Eristalis tenax* و *pipiens* طولانی ترین دوره فعالیت را نسبت به سایر نمونه‌های این زیر خانواده داشته و تقریباً در کلیه نمونه برداری‌ها بیشترین تعداد را نیز دارا بودند. در مقابل گونه‌هایی نظیر *Eumerus jacopsonii* و *Eristalinus taeniops* فقط یک بار و در تعداد اندک جمع

بر شرایط اقلیمی منطقه دارد، انتظار می‌رود که فون و فلور متنوع تری نسبت به سایر نقاط استان وجود داشته باشد.

جمع آوری سیرفیده‌ها با استفاده از تله مالایز، تله زردآبی و تور حشره گیری بدین ترتیب انجام گرفت که برای تله‌های مالایز و زردآبی دو ایستگاه ثابت نمونه برداری: یکی در حدفاصل یک باغ میوه و مزارع غلات در حوالی روستای باغشن گچ، حدود ۱۲ کیلومتری شرق نیشابور و ایستگاه دوم در بین مزارع یونجه و چغendar قند در حميد آباد در غرب نیشابور انتخاب و نسبت به استقرار یک تله مالایز استاندارد (۲۹) و یک تله زردآبی (۱۱) در هر ایستگاه اقدام و بطور هفتگی هر یک از این تله‌ها بازدید و نمونه‌های به دام افتداده برای بررسی های تاکسونومیکی در الکل اتانول ۷۵٪ به آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی منتقل می‌شد. برای کشتن نمونه‌ها در تله مالایز از فسفید آلومینیم (۳۲) استفاده شد. نمونه برداری از سایر مناطق شهرستان نیشابور با استفاده از یک تور حشره گیری استاندارد (۲۷) و با مسافت به مناطق مختلف در طول بهار و تابستان به مدت دو سال انجام شد. نمونه برداری با تور دستی معمولاً از اوایل صبح شروع و تا گرم شدن هوا و در بعد از ظهرها نیز پس از سپری شدن گرمای نیمروز نیز ادامه می‌یافتد.

در شناسایی نمونه‌ها از مشخصات ظاهری اندام‌های خارجی بدن نظیر سر، قفسه سینه، بالها، نقوش روی بندهای شکم و اندام‌های تناسلی خارجی استفاده شد. برای تعیین هویت گونه‌ها از کلیدهای شناسایی موجود در استاپز و فالک (۳۷)، اشتکلبرگ (۳۹)، و کرووث (۴۰) و اسپیت (۳۸) استفاده شد. تعدادی از نمونه‌های مشکوک طی چهارمین سمپوزیوم بین المللی سیرفید شناسی ۲۰۰۷ در هلسینکی فلانند توسط آقایان دکتر آنه و جیک از صربستان، جان اسمیت از هلند، دیتر دوژکال از آلمان، پاول لاسکا از جمهوری چک و آناتولی بارکالوف از روسیه تائید و یا در مواردی شناسایی شدند. نمونه‌های شناسایی شده در کلکسیون حشره شناسی گروه گیاه پزشکی دانشکده

آوری شدند.

جدول ۱- گونه‌های شناسایی شده از زیر خانواده Syrphinae در شهرستان نیشابور در سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۷

Scientific name	Date of collection	Locations
<i>Chrysotaxum intermedium</i> (Meigen, 1822)	May 2007: 2, 5, 9, 15, 20 & 26 June 2007: 5, 7, 13, 20 & 27	Bagheshan-e gach, Hamidabad, Bojan Daroud, Amozeshkadeh, Neyshbor
<i>Euspedes corollae</i> (Fab., 1794)	July 2006: 3, 8, 14, 20, 26 & 30 August 2006: 16, 23 & 30 May 2007: 2, 5, 9, 15, 20 & 26 June 2007: 1, 7, 15, 22 & 27	Amozeshkadeh, Bagheshan-e gach, Hamidabad, Bozghan, Daroud, Ghadamgah, Boujan, Hesar, Khate kashmar, Foshenjan, Ardameh, Kelidar, Bos hrabadi, Neyshabor, Ahmad abad
<i>Euspedes nube</i> (Wiedemann, 1818)	April 2007: 21 & 28 May 2007: 2, 5, 9, 15 & 20	Amozeshkadeh, Bagheshan-e gach, Boujan, Neyshbor
<i>Paragus haemorrhous</i> (Meigen, 1822)	August 2006: 16, 23 & 30 Sept. 2006: 1, 6, 15, 28 & 28 October 2006: 4, 11, 18, 25 & 30 June 2007: 2, 3, 7, 13, 16 & 23	Daroud, Ghadamgah, Boujan, Hesar, Khate kashmar, Foshenjan, Ardameh, Kelidar, Boshrabadi, Neyshabor
<i>Paragus bicolor</i> (Fab., 1794)	August 2006: 22, 27 Sept. 2006: 1, 6, 15 & 22 October 2006: 4, 11, 18, 25 & 30 June 2007: 1, 6, 15 & 22	Kharve, Hamidabad, Bozghan, Daroud, Neyshbor ,Ahmad abad
<i>Paragus quadrifasciatus</i> (Meigen, 1822)	Sept. 2006: 1, 6, 15, 22 & 25	Kharve, Hamidabad, Bozghan , Daroud, Neyshbor
<i>Paragus tibialis</i> (Fall., 1817)	Oct. 2006: 11, 18 & 25 June 2007: 15, 22 & 29	Boujan, Hamidabad ,Kharv,
<i>Syrrhus vitripennis</i> (Meigen, 1822)	April 2007: 15, 21 & 29 May 2007: 2, 5, 9, 20 & 26	Barzanon, Hoseynabad, Ardoghesh, Foshenjan
<i>Episyrrhus bolteatus</i> (DeGeer, 1799)	Sept. 2006: 1, 6, 15, 22 & 28 October 2006: 4, 11, 18 & 25 April 2007: 27, 28, 29 & 30 May 2007: 11, 18, 23 & 28 June 2007: 2, 3, 4, 5, 6	Amozeshkadeh, Bagheshangach, Hamidabad, Bozghan, Daroud, Ghadamgah, Boujan, Hesar, Khate kashmar, Foshenjan, Ardameh, Kelidar, Boshrabadi, Neyshabor,
<i>Melanostoma mellinum</i> (L., 1755)	July 2007: 1, 2, 3, 4, 5 Sept. 2006: 6, 13 & 22	Neyshabor, Barzanon, Hoseinabad, Ardoghesh, Boujan, Hamidabad
<i>Sphaerophoria scripta</i> (L., 1755)	September 2006: 1, 15 & 22 October 2006: 4, 11, 18, 25 & 30 April 2007: 21 & 29 May 2007: 9, 15, 20 & 26 June 2007: 4, 7, 15 & 22	Amozeshkadeh, Bagheshangach, Hamidabad, Bozghan, Daroud, Ghadamgah, Boujan, Hesar, Khate kashmar, Foshenjan, Ardameh, Kelidar, Boshrabadi, Neyshabor, Barzanon, Hoseinabad, Ardoghesh,
<i>Sphaerophoria scripta</i>	October 2007: 4	Foshenjan

جدول ۲- گونه‌های شناسایی شده از زیر خانواده Milesiinae در شهرستان نیشابور در سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۶

Scientific name	Date of Collection	Locations
<i>Eumerus jacobsonii*</i> (Becker, 1913)	October 2006: 4	Baghrod
<i>Eumerus strigatus</i> (Fall., 1817)	June 2007: 15 & 22	Bagheshan gach, Ahmad abad
<i>Eumerus tricolor*</i> (Fabricius, 1798)	July 2007: 22 & 29	Bagheshan gach, Darbehesht
<i>Eristalis tenax</i> (L., 1785)	August 2006: 2, 9, 16, 23 & 30 Sept. 2006: 1, 6, 15 & 22 May 2007: 9, 15, 20, 26	Barzaneh, Hoseinabad, Ardoghesh, Fosheqjan, Bagheshan gach, Baghrod
<i>Eristalis turbatiformis</i> (L., 1785)	Sept. 2006: 6 & 15 June 2007: 15, 22 & 29	Boujan, Ardameh, Kelidzir
<i>Eristalomyia taenioptera</i> (Wiedemann, 1818)	Sept. 2006: 15	Hamedabad, Hesar, Darbehesht
<i>Eristalomyia cernua</i> (Scopoli, 1763)	Sept. 2006: 6, 15, 22 & 29 May 2007: 5, 9, 15, 20 & 26	Bozghocheh, Hamedabad, Boujan
<i>Apatolestes flava</i> (L., 1785)	October 2006: 2, 5, 14 & 19	Boujan, Daroud, Farikhak
<i>Systasis apionis</i> (L., 1785)	August 2006: 18, 25 & 30 Sept. 2006: 6, 15, 22 & 28 Oct. 2006: 4, 11, 18, 25 & 30 May 2007: 2, 5, 9, 15, 20 & 26 June 2007: 1, 7, 15, 22 & 27	Amazdehshahr, Bagheshan gach, Hamedabad, Bozghan, Daroud, Ghadamgah, Boujan, Hesar, Khate kashmar, Foshenjan, Ardameh, Kelidzir, Bozhrabdi, Neyshabor, Barzaneh, Hoseinabad, Ardoghesh, Farikhak
<i>Helophilus trivittatus*</i> (Fab., 1805)	July 2007: 2, 9, 15, 22 & 29	Neyshabor

زیادی به شرایط آب و هوای داشت. گونه‌های *Eupeodes scripta corollae* بوفور توسط این تله شکار می‌شدند. تنوع و فراوانی گونه‌های شکار شده توسط *Episyrrhus balteatus* زرد آبی نسبت به تله مالایز کمتر بود. شایع ترین گونه‌ای بود که توسط این تله جمع آوری شد.

روش جمع آوری با تور دستی قابل مقایسه با دو روش قبلی نیست زیرا در این روش مهارت فرد نمونه بردار و کنگکاوی وی تأثیر مهمی بر کارایی این روش دارد و از طرفی این روش برای گونه‌های خاصی کارایی دارد. لذا منطقی نخواهد بود که این روش انتخابی با روش‌های تصادفی نظیر تله مالایز و یا تله زرد آبی مقایسه شود. با وجود این، گونه‌هایی نظیر *Eristalis tenax* و *E. balteatus* بطور عمدی بدلیل پراکنش وسیع جغرافیایی و فراوانی نسبی آنها بیشتر تور حشره گیری شکار

محاسبه شاخص تنوع شانون - وینر، مقدار این شاخص را برای تله مالایز ($H=1/86$) و بیشتر از تله زرد آبی ($H=1/39$) نشان داد. علیرغم غنای گونه‌ای بالاتر تله مالایز، ضریب تنوع گونه‌ای این تله بالابوده و این احتمالاً به دلیل توزیع یکنواخت تر افراد بین گونه‌های جمع آوری شده توسط تله زرد آبی می‌باشد. محاسبه ضریب مشابهت بین دو تله با استفاده از ضریب سورنسون نشان داد که مقدار بدست آمده ($SQ = 1/44$) برای مشابهت این دو روش جمع آوری بسیار پایین بوده و در حقیقت تعداد گونه‌های مشترک جمع آوری شده بوسیله این دو روش جمع آوری اندک بود.

بحث

در این بررسی تله مالایز طیف وسیعی شامل ۱۴ گونه از ۲۲ گونه را جمع آوری نمود. فراوانی سیرفیدها نیز در تله مالایز بالا بود ولی تعداد نمونه جمع آوری شده بستگی

لذا توصیه می‌شود که در مطالعات فونستیک حشرات و بویژه خانواده سیرفیده در یک منطقه، همزمان از چند روش نمونه برداری استفاده شود.

سپاسگزاری

این مقاله قسمتی از نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول می‌باشد. بدینوسیله نگارنده‌گان از کلیه افرادی که در اجرای این تحقیق و تأیید نمونه‌ها ما را باری کردند بویژه آقایان دکتر آنته و جیک از صربستان، جان اسمیت از هلند، دیتر دوزکال از آلمان، پاول لاسکا از جمهوری چک و آناتولی بارکالوف از روسیه سپاسگزاری می‌نمایند. از دانشگاه فردوسی مشهد که در فراهم کردن امکانات اجرای طرح مساعدت لازم را مبذول داشتند نیز قدردانی می‌گردد.

می‌شدند.

علی‌رغم تلاش‌های بعمل آمده، بطور قطع فهرست حاضر فقط قسمتی از فون منطقه می‌باشد، بیشتر به این دلیل که بسیاری از نقاط دور افتاده و کوهستانی و بویژه مناطق غیر کشاورزی مورد بررسی فونستیک قرار نگرفتند. لذا ارائه فهرست کاملی از سیرفیدهای منطقه نیازمند مطالعات گسترده‌تری می‌باشد. با توجه به اینکه بنظر می‌رسد هیچیک از روشهای جمع آوری به تنها یک کارایی لازم را برای بررسی فون یک منطقه ندارند. این یافته با نتایج مطالعات مشابه در سایر نقاط دنیا (۳۶) مطابقت دارد. نویسنده اخیر معتقد است که تله مالایز حداقل تا ۵۰ درصد فون یک منطقه را جمع آوری می‌کند و حتی یک نمونه بردار خبره با استفاده از تور حشره گیری دستی نیز بیش از ۵۰ درصد فون سیرفیدهای یک منطقه را نمی‌تواند جمع آوری کند.

منابع

- ۱- آذرخش، ی. ۱۳۸۰. بررسی وضعیت تاکسونومیک و تراکم گونه‌های خانواده Syrphidae در شهرستان لنگرود. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شمال (منتشر نشده). ۱۴۰ صفحه
- ۲- امیری مقدم، ف. ۱۳۸۳. بررسی فونستیک مگس‌های سیرفیده در منطقه کاشمر و بردسکن. پایان نامه کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری (منتشر نشده)، دانشگاه شهید بهشتی.
- ۳- امیری مقدم، ف. پاشایی راد، صادقی حسین و شیدایی، م. ۱۳۸۳. بررسی تنوع زیستی و فون مگس‌های گل در شهرستان بردسکن. مجله علوم محیطی، ۵، صفحات: ۸-۲
- ۴- پاشایی راد، ش. ۱۳۸۱. مگس‌های زیر خانواده Eristalinae (Diptera: Syrphidae) در شهرستان مرند و شمال غربی ایران. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران-شهریور ۱۳۸۱.
- ۵- پورقاسم، م. ۱۳۸۳. بررسی فون سیرفیدهای (Syrphidae) مناطق مرکزی استان اصفهان و پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. ۲۱۱ صفحه.
- ۶- دوستی، ا. ۱۳۷۹. بررسی تنوع زیستی گونه‌های مگس Syrphidae در اهواز با استفاده از تله مالایز. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران-اصفهان.
- ۷- دوستی، الف. حجت، س.ح. اسلامیان نژادیان. فون مگس‌های خانواده Syrphidae (Diptera) در اهواز و حومه. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ۸- صادقی نامقی، ح. ۱۳۸۲. بخشی از فون مگس‌های سیرفیده (Diptera: Syrphidae) مشهد و کلید شناسایی جنسها. مجله

- علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، شماره ۳ صفحات: ۱۱۹-۱۲۷.
- ۹- صادقی، ح.، حسینی، ا. و محمد آبادی، ع. ۱۳۸۵. تأثیر کاربرد علف کش توپرودی در مزارع غلات بر حشرات. مجله علوم و صنایع کشاورزی جلد ۲۰ شماره ۲، صفحات: ۱۰۹-۱۱۰.
- ۱۰- صادقی، ح. ۱۳۸۶. ارزیابی جذایت تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفیدهای شته خوار (Diptera: Syrphidae). مجله علوم و صنایع کشاورزی، ویژه نامه حفاظت گیاهان، دانشگاه فردوسی مشهد. جلد ۲۱.
- ۱۱- صادقی، ح.، کیوانفر، ن.، جاجوندیان، ر. ۱۳۸۶. مقدمه ای بر شناخت مگس های گل. انتشارات سنبه مشهد. ۱۷۶ صفحه.
- ۱۲- قرالی، ب. ۱۳۷۹. گزارشهاي جديده از مگسهاي سيرفيده (Diptera: Syrphidae). چهاردهمين كنگره گياهپرشيکي ايران-اصفهان.
- ۱۳- قرالی، ب. ۱۳۸۳. مگسهاي زيرخانواده Syrphinae (Diptera: Syrphidae) در استان فارس. مجله دانش کشاورزی-انتشارات دانشگاه تبريز، جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات: ۱۱-۱۶.
- ۱۴- کیوانفر، ن. ۱۳۸۱. شناسايي فون مگسهاي Syrphidae در مشهد و حومه. پيان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۱۸ صفحه.
- ۱۵- گل محمدزاده خيابان، ن. ۱۳۷۷. بررسی فونستیک مگسهاي Syrphidae در منطقه ارومیه. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپرشيکي ايران-کرج.
- ۱۶- گل محمدی، غ. گل محمدزاده خيابان، ن. ۱۳۸۳. فون مگسهاي Syrphidae در منطقه سیستان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپرشيکي ايران - تبريز. ص ۱۳۲.
- ۱۷- گل دسته، ش. ۱۳۸۱. بررسی فونستیک مگسهاي خانواده Syrphidae(Diptera) در منطقه گرگان و حومه. خلاصه مقالات پانزدهمین گیلاسيان، ا. اولين گزارش از هشت گونه مگسهاي خانواده Syrphidae در استان همدان. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپرشيکي ايران-کرمانشاه.
- ۱۸- گیلاسيان، ا. ۱۳۸۳. گزارش دو گونه جديده سيرفيده برای فون ايران. خلاصه مقالات شانزدهمین گیاهپرشيکي ايران-تبريز. ص ۱۳۰.
- ۱۹- گیلاسيان، ابار كالوف، ا. ۱۳۸۳. گزارش دو گونه جديده سيرفيده برای فون ايران. خلاصه مقالات شانزدهمین گیاهپرشيکي اiran-تبريز. ص ۱۳۱.
- ۲۰- گیلاسيان، ا. و وجيك، ا. ۱۳۸۳. بررسی مقدماتی فون مگسهاي Syrphidae در استان مازندران. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپرشيکي اiran-تبريز ص ۱۳۱.
- ۲۱- لطفعلی زاده، ح. قرالی، ب. ۱۳۷۹. معرفی بخشی از فون مگسهاي سيرفيده (Diptera: Syrphidae) در شهرستان مرند، مجله دانش کشاورزی، جلد ۱۰ شماره ۲. صفحات: ۱۲-۲۲.
- ۲۲- مدرس اول، م. ۱۳۷۳. فهرست آفات کشاورزی آنها و دشمنان طبیعی آنها. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۳۶۴ صفحه.
- ۲۳- معتمدی نیا، ب. ۱۳۸۱. معرفی مگسهاي خانواده Syrphidae در استان گیلان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپرشيکي اiran-کرمانشاه.
- ۲۴- ملکشی، ح. ع. رضوانی و ع. ا. طالبی. ۱۳۷۳. شناسايي دشمنان طبیعی مهم شته های درختان میوه دار در بجنورد. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپرشيکي اiran-کرج. ص ۱۶۳.

- ۲۵- موسویان، م. ۱۳۸۰. بررسی فونستیک مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۰ صفحه.
- ۲۶- نوربخش، ح. ۱۳۷۹. فون دشمنان طبیعی شته‌های درختان بادام در استان چهارمحال و بختیاری. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپژوهشکی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
- 27.Borror, D. J., Triplehorn, G. A., and Johnson, N. F. 1989. *An Introduction to the Study of Insects* (6th ed.), Saunders College Publishing, Philadelphia, 875 pp.
- 28.Dousti, A. F. & Hayat, R. 2006. A Catalogue of the Syrphidae (Insecta: Diptera) of Iran. *J. Ent. Res. Soc. Turkey*, 8(3): 5-38.
- 29.Gilbert, F. S. 1993. *Hoverflies*. Naturalists handbook 5, Richmond Pub. Co.Ltd.Slough, England. 67 pp.
- 30.Giovanni, B.U..Danielle, S.O, 2001. Syrphiade (Diptera) caught by Malaise trap in Bolonga. *Bullten of insectology* 55(1-2): 43-47.
- 31.Golding, Yc. 2000. Behavioural mimicry of honeybees (*Apis mellifera*) by droneflies (Diptera:Syrphidae) *Proc. R. Soc. Lond. B. Biol Sci.* 2000. 2: 276.
- 32.Hutchinson, J.A. 1990. Characters of terrestrial insect communities using quantified, Malaise trapped Coleoptera. *Ecological entomology* 15(2):143-151.
- 33.Maldonado, M.L. 2003. Diurnal activity of Hoverflies (Diptera:Syrphidae) and beneficial insectary plants. 2nd International Symposium on the Syrphidae . Alicante, Spain 16-19th June.
- 34.Rotheray, G. E. 1989. *Aphid predators*. Naturalist's handbook.2. Slough. The Richmond Pub.Co.Ltd., 77pp.
- 35.Southwood T. R. E. 1978. *Ecological methods with particular reference to the study of insect populations*. Chapman and Hall, London.
- 36.Ssymank, A. 2001. *Vegetation und blutenbesuchende Insekten in der Kulturlandschaft*. Bundesamt fur Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg. 513pp.
- 37.Stubbs, A. E., Falk, S. J. 1996. *British hoverflies: An illustrated identification Guide*.London, British Entomological and Ntaural History Society, 253pp.
- 38.Speight, M.C.D. 2007. Species accounts of European Syrphidae (Diptera). In: Speight, M.C.D., Castella, E., Sarthou, J. P. & Monteile, C. (eds.) *Syrph the Net*, The data base of European Syrphidae, Vol. 55, 286 pp. *Syrph the Net* publication Dublin.
- 39.Stackelberg, A. A. 1988. Family Syrphidae. Pages 10-148, In: Bei-Bienko, G. Ya (ed.). *Keys to the insects of the European part of USSR*. Vol. V, Diptera and Siphonaptera. Part II. Smithsonian institution Liberaries and National Science Foundation, Washington, D. C., New Delhi, xxii + 1505 pp.
- 40.Vockeroth, J. R. 1973. The identity of some genera of Syrphini (Diptera:Syrphidae), described by Matsumura. *Canadian J. Entomol.* 105:1075-1079.

Diversity of Syrphidae(Diptera) in agroecosystems of Neyshabor region

M. Hosseini - H. Sadeghi^{*1}

Abstract

During growing seasons of years 2006 & 2007, a faunistic survey on Syrphidae family(Diptera) in agroecosystems of Neyshabor region, Khorasan-e-razavi province was carried out. In this study, 3 collection methods: Yellow water trap, Malaise trap and Sweeping net were applied. The results showed a large difference between different collection methods. Specimens of 14 species collected by Malaise trap while Yellow water trap collected 5 species and 8 species exclusively collected by sweeping net. In total, 22 species belonging to 14 genera have been identified. All species are reported from the region for the first time. Among these, *E.tricolor* & *H.trivittatus* are new for Khorasan-e Razavi province fauna. Recording the species, *E.jacobsonii* from Neyshbor, the distribution range of this Syrphid which was restricted to south east Iran is extended. Shannon-Weiner index of biodiversity measured for Malaise trap was higher than that calculated for yellow water trap.

Key words: Fauna, Insects, Flower flies, Agroecosystem, Neyshabor

* - Corresponding author Email: Husseinsadeghi@yahoo.co.uk

1- Contribution from College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad