

”مجله علوم زراعی ایران“

جلد ششم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۳

اثر بر همکنش فاصله کاشت و نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج (*Oryza sativa L.*) در تراکم های مختلف دزگال

Interaction effect of plant spacing and nitrogen on growth and yield of rice (*Oryza sativa L.*) under different Barnyardgrass (*Echinochloa crus-galli*) densities

سید عبدالرضا کاظمینی^۱ و حسین غدیری^۲

چکیده

کاظمینی، سید عبدالرضا. ح. غدیری، ۱۳۸۳. اثر بر همکنش فاصله کاشت و نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج (*Oryza sativa L.*) در تراکم های مختلف دزگال، مجله علوم زراعی ایران، جلد ششم، شماره ۴. صفحه ۴۱۵-۴۲۵.

در سال ۱۳۷۷ آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی کوشک دانشگاه شیراز به منظور بررسی بر همکنش فاصله کاشت بوته های برنج و نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج در قالب طرح تحقیقاتی کرت های دوار خرد شده اجرا گردید. عامل اصلی نیتروژن (صفر، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و عامل فرعی فاصله کاشت بوته برنج (۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵ سانتی متر) و فاکتور فرعی فرعی تراکم علف هرز دزگال (صفر، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در مترمربع) بود. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش فاصله کاشت بوته های برنج از ۲۰×۲۰ به ۲۵×۲۵ سانتی متر، عملکرد دانه برنج افزایش یافت. همچنین با افزایش فاصله کاشت بوته های برنج از ۱۱/۷ به ۱۳/۷ (در مقابل ۱۳/۷ در مقابله ۷۸۲/۲) به طور معنی داری عملکرد برنج، تعداد خوش در هر بوته (۱۱/۷ در مقابل ۱۳/۷) و تعداد دانه در هر بوته (۷۸۲/۲ در مقابل ۱۲۰/۲) به افزایش افزایش یافت. با افزایش تراکم دزگال عملکرد دانه (از ۴۳۲۸ به ۲۵۸۷ کیلوگرم در هکتار) به طور معنی داری کاهش یافت. با افزایش کود نیتروژن، عملکرد دانه برنج (از ۲۸۱۸ به ۳۸۰۲ کیلوگرم در هکتار) افزایش یافت، اما بین سطوح ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده نشد. با اضافه شدن کود نیتروژن بازده کود افزایش کود نیتروژن، شاخص برداشت را کاهش داد اما این کاهش معنی دار نبود.

واژه های کلیدی: فاصله کاشت برنج، نیتروژن، عملکرد برنج، دزگال برنج، تراکم دزگال.

مقدمه

به طور کلی تراکم مناسب برنج، تراکمی است که اولیه و ثانویه و سنبلاجه در خوش کاهش و تعداد خوش در مترمربع به طور خطی افزایش می یابد و

تاریخ دریافت: ۱۳۸۳/۲/۸

۱- مرتب بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

۲- استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز و نویسنده مکاتبه کننده

قرار می‌دهد. بیشترین و کمترین ۷ عملکرد دانه به ترتیب در فاصله 20×20 سانتی متر (۵۰ هزار بوته در هکتار) و 4×25 سانتی متر (۱۰۰ هزار بوته در هکتار) به دست آمد و نیز بیشترین عملکرد در میزان $120 - 26$ کیلوگرم در هکتار P-N حاصل شد. کارایی مصرف کود با افزایش میزان آن کاهش پیدا کرد و نیز بیشترین کارآیی کود در تراکم‌های گیاهی بالاتر به دست آمد. شرفی (۱۳۷۳) اثر سه فاصله کاشت (20×20 و 20×25 و 20×25) و سه سطح مختلف کود نیتروژن و فسفر (نیتروژن = ۴۵ و فسفر = ۳۵ کیلوگرم در هکتار- نیتروژن = ۷۰ و فسفر = ۶۰ کیلوگرم در هکتار) را بر روی دو رقم برنج 304 و 305 مورد بررسی قرارداد. نتایج نشان داد که فاصله کاشت بهترین فاصله نشاء برای هر دو رقم بود و بین دو عامل فاصله کاشت و سطوح کودی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. عملکرد دانه نیز به طور معنی‌داری با اضافه شدن سطح کود افزایش پیدا کرد. سنتیاکه و همکاران (Senanayake *et al.*, 1996) نشان دادند که تغذیه گیاه با نیتروژن، توسعه‌ی اجزاء عملکرد دانه برنج را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرما و سینگ (Sharmas & Singh, 1999) نتیجه گرفتند که سطح نیتروژن و ظرفیت پنجه‌زنی در برنج، دو عامل عمدۀ هستند که تراکم بهینه‌ی گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با هیان و شاه (Bhaiyan & Shah, 1990) طی آزمایشی در مورد اثر کود نیتروژن و تراکم گیاه بر کارایی کود نیتروژن دریافتند که تراکم 20 و 50 بوته برنج در مترمربع، عملکرد دانه و کاه را تحت تأثیر قرار نداد هر چند که تعداد خوش در واحد سطح به دلیل افزایش تراکم جمعیت گیاهی به طور معنی‌داری زیاد شد. کاربرد کود نیتروژن در سطح 60 کیلوگرم در هکتار بدون توجه به نحوه کاربرد کود، نسبت به عدم مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تعداد خوش در واحد سطح و در نتیجه افزایش معنی‌داری در عملکرد دانه و ساقه گردید. وانگ و همکاران (Wang *et al.*, 1995) دریافتند که

با کاهش تراکم، ضخامت ساقه افزایش می‌یابد (Kim & Moody, 1980). از طرفی بایستی توجه داشت که فواصل بین بوتهای برنج و جهت ردیف‌ها به دلیل نیاز به نورگیری، بر عملکرد دانه برنج اثر خواهد گذاشت (Lin & Lin, 1985). راته‌ی و همکاران (Rathi *et al.*, 1984) پنج رقم پاکوتاه برنج را در سه فاصله کاشت و الگوی کاشت مورد بررسی قرار دادند. بیشترین عملکرد در فاصله 15×15 سانتی متر بین بوتهای در مقایسه با فاصله $22/5 \times 22/5$ سانتی متر و 30×30 سانتی متر به دست آمد. با افزایش فواصل بین بوتهای برنج عملکرد به طور خطی کاهش یافت. الگوی کاشت مربعی نسبت به الگوی کاشت مستطیل بهتر بود و کاشت مربع مستطیل نسبت به تغییر فاصله، حساس‌تر از کاشت مربعی بود. با قری اثرات ۵ فاصله کاشت نشاء (10×10 ، 10×15 ، 15×20 ، 20×25 و 25×30) را در عملکرد برنج چمپا مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت بهترین تیمار که منجر به تولید بالاترین عملکرد شد تیمار 10×10 بود که از لحاظ آماری هیچ اختلاف معنی‌داری با دو فاصله کاشت 15×15 و 20×20 نداشت. سوراجیت و دی دتا (Surajit & DeDatta, 1981) دریافتند که با افزایش فاصله کاشت از 15×15 به 20×20 و 25×25 سانتی متر، عملکرد دانه برنج به ترتیب 30 و 52 درصد کاهش یافت.

ویس پراس و همکاران (Visperas *et al.*, 1994) طی آزمایشی درباره پایداری منحنی پنجه‌زنی ارقام جدید برنج در تراکم‌های مختلف در فاصله 10×10 و 20×20 سانتی متر و سطوح مختلف 60 و 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار دریافتند در فاصله 25×25 سانتی متر، رقم برنج پرپنجه IR72 بدون توجه به میزان کود مصرفی، نسبت به ارقام جدید کم پنجه سه برابر پنجه بیشتر داشت و این کاهش پنجه‌زنی در تمام تراکم‌های گیاهی و سطوح نیتروژن عمومیت داشت. زیا (Zia, 1987) دریافت تراکم گیاهی و سطوح نیتروژن و فسفر به طور معنی‌داری عملکرد برنج رقم IR6 را تحت تأثیر

"اثر بر همکنش فاصله کاشت و نیتروژن بر ..."

عملکرد دانه برنج برای سه رقم برنج M201 و M202 L به ترتیب ۱۲۵، ۱۱۲ و ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار است. واکنش عملکرد برنج به افزایش مصرف نیتروژن در شرایط آلدگی کم به علف هرز زمانی است که نیتروژن به اندازه کافی برای هر دو علف هرز و برنج تامین شده باشد. کول و مانوئل (Cole & Manuel, 1988) دریافتند که در حضور علف‌های هرز هیچ تفاوتی در عملکرد برنج بین سطوح مختلف نیتروژن به وجود نمی‌آید. در این آزمایش، کوددهی روی تراکم و جوانه زدن علف هرز تأثیر نداشت. اینامورا و همکاران (Inamura et al., 2003) دریافتند علف‌های هرز در طول مرحله تولید پنجه با برنج برای جذب نیتروژن رقابت می‌کنند.

هدف از این آزمایش تعیین اثر بر همکنش فاصله کاشت و نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج در تراکم‌های مختلف دژگال بود.

مواد و روش‌ها

این مطالعه در سال ۱۳۷۷ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات داشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک (طول جغرافیایی ۵۲ درجه ۳۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۰ درجه و ۴ دقیقه و ارتفاع ۱۶۰۹ متر از سطح دریا) با بافت خاک لومی رسی انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های دو بار خرد شده با ۳ تکرار اجراء گردید. عامل اصلی نیتروژن (صفر، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود که از منبع اوره تأمین گردید و عامل فرعی شامل فواصل کاشت برنج (۲۰×۲۰ و ۲۵×۲۵) و عامل فرعی-فرعی تراکم‌های مختلف دژگال (صفر، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ بوته دژگال در مترمربع) بود. انتخاب فواصل مساوی بین ردیف و روی ردیف به خاطر دریافت حداکثر تشعشع ممکن در مراحل اولیه رشد جهت افزایش عملکرد بود. قبل از انجام عملیات تهیه زمین نمونه‌برداری از عمق صفر تا ۳۰ سانتی‌متری خاک جهت اندازه‌گیری مقدار نیتروژن خاک به عمل آمد. عملیات تهیه زمین خزانه چند روز

روابط مثبت قوی بین عملکرد برنج قهوه‌ای و نسبت ساقه به دانه و نیز بین این نسبت با ظرفیت منبع (Sink) وجود دارد. عملکرد ارقام مورد آزمایش ۹۰۰۴ و Km در کرت‌هایی که در آن فسفر مصرف گردید به دلیل جلوگیری از پوکی و در نتیجه زیاد شدن تعداد سنبلاچه افزایش پیدا کرد. مصرف کود فسفر و نیتروژن با هم در مقایسه با نیتروژن تنها، باعث زیاد شدن تولید ماده خشک در طول دوره رسیدن گردید. ویلار و همکاران (Willauer et al., 1995) دریافتند که ارقام مختلف نسبت به مصرف سطوح مختلف کود نیتروژن عکس العمل متفاوتی نشان می‌دهند. ارقام RC8, RC6, RC4, C2, RC12, RC14 در سطوح مختلف کود نیتروژن (۴۵، ۹۰، ۱۳۵ کیلوگرم در هکتار) مورد آزمایش قرار گرفتند. بیشترین عملکرد در سطح ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و بیشترین افزایش عملکرد و دانه‌بندی برای اغلب ارقام با ۴۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. نتیجه افزایش کود نیتروژن مصرفی، کاهش روند افزایشی عملکرد دانه است و این کاهش در ارقام RC4, RC8, RC10, RC14 مشاهده شد که به علت تغییر در اجزاء عملکرد دانه بود. کارایی نیتروژن در میزان بالاتر کود نیتروژن کاهش پیدا کرد.

لو (Lue, 1991) نشان داد که توانایی نسبی برنج برای رقابت با علف‌های هرز به طور مشخصی با تأخیر در رشد علف هرز و نیز بیشتر شدن تراکم برنج افزایش یافت. براساس نتایج لو عملکرد برنج با افزایش تراکم دژگال کاهش پیدا کرد و قدرت رقابت علف هرز در تراکم پایین برنج نسبت به تراکم بالای آن بیشتر بود. پاند و بان (Pande & Bhan, 1966) دریافتند که در برنج افزایش فواصل گیاهی از ۱۵ به ۴۵ سانتی‌متر باعث افزایش تراکم و بیomas علف هرز گردید که این امر به علت رشد بیشتر علف هرز و جذب نیتروژن به وسیله علف‌های هرز در فواصل پهن تر به ترتیب باعث کاهش عملکرد معادل (Madison, 1993) ۵۶/۳ تا ۴۲/۱ درصد شد. مدیسون (Madison, 1993) دریافت که حد مطلوب میزان نیتروژن برای حداکثر

کیلوگرم نیتروژن در هکتار و حدائق ارتفاع در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر بوته های برنج و میزان صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد (شکل ۱). لیاگاس و همکاران (Liagas et al., 1987) طی آزمایشی نشان دادند که افزایش کود نیتروژن باعث افزایش ارتفاع برنج گردید. نتایج نشان داد که در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر افزایش نیتروژن از صفر به 120 کیلوگرم در هکتار به طور معنی داری ارتفاع گیاه برنج را افزایش داد و در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر اختلاف معنی داری بین میزان 80 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار وجود نداشت. با افزایش فاصله کاشت از 20×20 سانتی متر به 25×25 سانتی متر، ارتفاع گیاه برنج به طور معنی داری افزایش پیدا کرد. دلیل این امر احتمالاً این بوده که افزایش فاصله کاشت باعث کاهش عوامل محدود کننده رشد شده و در واقع چون گیاه پنجه های بیشتری تولید کرده است عملاً رقابت گیاه برای جذب نور به وسیله پنجه های هر بوته زیادتر شد و در واقع افزایش رقابت درون بوته ای نسبت به بین بوته برای نور باعث افزایش ارتفاع برنج شد.

تعداد پنجه برنج


حداکثر تعداد پنجه در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر بوته های برنج از یکدیگر و میزان 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و حدائق تعداد پنجه در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر و تیمار بدون نیتروژن به دست آمد (شکل ۲). نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن، تعداد پنجه در بوته برنج افزایش پیدا کرد که این افزایش در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر از میزان 40 کیلوگرم در هکتار به 80 و 120 کیلوگرم در هکتار معنی دار بود و در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر از میزان 40 کیلوگرم در هکتار به 80 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی دار بود. اثر افزایش کود از 80 به 120 کیلوگرم در هکتار در این فاصله کاشت معنی دار نبود. در واقع افزایش نیتروژن مصرفی باعث کاهش بازده کود مصرفی و افزایش توان

قبل از خیس کردن و جوانه زنی بذر انجام گرفت. این عملیات با عملیات تهیه زمین اصلی مشابه بود و شامل شخم، دیسک، لولر و شخم شلک (شخم با کمک دستگاه تیلر) بود. قبل از شخم کود فسفات از منبع سوپر فسفات تریپل به میزان 45 کیلوگرم در هکتار P_2O_5 تأمین و در زمین به طور یکنواخت پخش گردید و نیتروژن را در سه نوبت، یک سوم 5 تا 6 روز بعد از نشاء کاری، یک سوم را در زمان حداکثر پنجه زنی و یک سوم آخر در هنگام گلدهی در کرت های مورد نظر پخش شد. در زمان نشا کاری ارتفاع برنج در خزانه به 20 تا 25 سانتی متر رسیده بود و میزان بذر مصرفی 100 کیلو گرم در هکتار و رقم مورد استفاده کامپیروزی از نوع چمپا محلی بود. برای رسیدن به تراکم علف هرز مورد نظر، زمینی که آلودگی زیادی به علف هرز داشت انتخاب گردید و سپس طی چند مرحله با وجین کردن کرت ها تراکم مطلوب علف هرز به دست آمد. ابعاد کرت ها 3×3 متر انتخاب گردید. برای تعیین عملکرد دانه و بیولوژیکی در زمان رسیدن (رطوبت دانه 14 درصد)، یک متر مربع وسط کرت آزمایشی را ز نزدیک سطح زمین کف بر نموده و پس از جدا کردن دانه از بقایا برای مدت 24 ساعت در دمای 75 درجه سانتیگراد در داخل آون قرار داده و سپس توزین نموده و به این ترتیب پارامترهای مورد نظر اندازه گیری شد. برای تعیین ارتفاع، تعداد پنجه، تعداد خوش و دانه در بوته از هر کرت آزمایشی، چهار بوته به طور تصادفی انتخاب و اندازه گیری های لازم به عمل آمد. اعداد و ارقام به دست آمده با استفاده از برنامه ای کامپیوتري MSTATC مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. برای رسم نمودارها و شکل ها از برنامه های گرافیکی HARVARD GRAPHIC و WINWORD استفاده شد.

نتایج و بحث

ارتفاع گیاه برنج

حداکثر ارتفاع گیاه برنج در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر بوته های برنج از یکدیگر و میزان 80




شکل ۱- اثر بر همکنش نیتروژن و فاصله کاشت بر ارتفاع بوته

Fig. 1. Interaction effect of nitrogen and plant spacing on rice height.
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار است که به طور معنی داری تعداد پنجه را افزایش داد و مصرف بیشتر یعنی ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار باعث کاهش بازده نیتروژن اضافی گردید (شکل ۲). یاماموتو و همکاران (Yamamoto *et al.*, 1989) ابراز داشتند، کاهش میزان نیتروژن مصرفی باعث کاهش پنجه زنی در برنج گردید.

رقابتی علف هرز گردید. افزایش فاصله کاشت از 20×20 سانتی متر به 25×25 سانتی متر نیز در تمام سطوح نیتروژن به استثناء ۸۰ کیلوگرم در هکتار به طور معنی داری تعداد پنجه در برنج را افزایش داد. با افزایش نیتروژن، از صفر به ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار، تعداد پنجه در هر بوته برنج افزایش پیدا کرد. در واقع میزان بهینه نیتروژن مصرفی،




شکل ۲- اثر بر همکنش نیتروژن و فاصله کاشت بر تعداد پنجه برنج

Fig. 2. Interaction effect of nitrogen and plant spacing on rice tiller number
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

تعداد خوش

پنجه نسبت داد که عملاً رقابت بیشتری ایجاد نموده و در نهایت تعداد پنجه بارور را کاهش داد. واگ و تورات (1987) (Wagh & Thorat) دریافتند که افزایش نیتروژن به طور معنی داری تعداد خوش در واحد سطح را افزایش داد. در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر، بالافراش نیتروژن از 80 به 120 کیلو گرم اختلاف معنی داری مشاهده نشد و در واقع در این فاصله کاشت همانند فاصله کاشت 20×20 سانتی متر بهترین میزان کود نیتروژن 80 کیلو گرم در هکتار بود و افزایش میزان نیتروژن به 120 کیلو گرم در هکتار فقط باعث کاهش کارایی کود اضافی و سوء استفاده بیشتر علف هرز گردید.

حداکثر تعداد خوش در بوته برنج در میزان 20×25 کیلو گرم نیتروژن در هکتار و فاصله کاشت 20×20 سانتی متر بوته های برنج از یکدیگر و حداقل تعداد خوش برنج در تیمار بدون کود نیتروژن و فاصله کاشت 20×20 سانتی متر به دست آمد (شکل ۳). نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن از صفر به 80 کیلو گرم در هکتار در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر تعداد خوش به طور معنی داری افزایش پیدا کرد و افزایش نیتروژن از 80 به 120 کیلو گرم در هکتار باعث کاهش بازده کود نیتروژن اضافی گردید که علت آن را می توان به تولید




شکل ۳- اثر بر همکنش نیتروژن و فاصله کاشت بر تعداد خوش برنج

Fig. 3. Interaction effect of nitrogen and plant spacing on rice panicle number
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

کاهش معنی داری در مقایسه با تراکم های دیگر ایجاد نمود. در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر و تراکم 20 بوته علف هرز کاهش معنی دار در تعداد خوش ایجاد شد. به عبارت دیگر در فواصل کاشت بیشتر، تعداد خوش در هر بوته برنج در تراکم های پایینتر علف های هرز نیز تحت تأثیر قرار گرفت در حالیکه با کمتر شدن فاصله بین بوته های برنج، تعداد خوش در هر بوته برنج در تراکم های بالای علف های هرز به طور معنی داری کاهش یافت. افزایش فاصله بین بوته های برنج از 20×20 سانتی متر به 25×25 ، به طور معنی داری تعداد خوش در

حداکثر تعداد خوش برنج در تیمار بدون دزگال و فاصله کاشت 25×25 سانتی متر بوته های برنج از یکدیگر و حداقل تعداد خوش برنج در تراکم 40 بوته علف هرز دزگال و فاصله کاشت 20×20 سانتی متر به دست آمد (شکل ۴). نتایج نشان داد که با افزایش تراکم دزگال در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر و 25×25 سانتی متر، تعداد خوش برنج در هر بوته کاهش پیدا کرد. کاهش تعداد خوش برنج در فاصله 20×20 سانتی متر می تواند به دلیل زودتر بسته شدن پوشش گیاهی و نیز رقابت زیاد علف های هرز در تراکم 40 بوته علف هرز باشد که

بوته برنج را افزایش داد. افزایش تراکم بوته برنج که با کاهش فاصله بین بوتهای برنج حاصل شد باعث کاهش تعداد شاخه‌های اولیه و ثانویه و سنبلاچه در خوشه برنج گردید. اینامورا و همکاران می‌شوند.




شکل ۴- اثر بر همکنش تراکم علف هرز دزگال و فاصله کاشت بر تعداد خوشه برنج

Fig. 4. Interaction effect of weed density and plant spacing on rice panicle number
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

تعداد دانه در بوته برنج

حداکثر تعداد دانه در بوته برنج در میزان ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاصله کاشت 25×25 سانتی‌متر و حداقل تعداد دانه در بوته در تیمار بدون نیتروژن و فاصله کاشت 20×20 سانتی‌متر به دست آمد (شکل ۵). افزایش فاصله کاشت از 20×20 سانتی‌متر به



شکل ۵- اثر بر همکنش نیتروژن و فاصله کاشت بر عملکرد دانه برنج


Fig. 5. Interaction effect of nitrogen and plant spacing on rice seed yield
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

نیتروژن در هکتار اختلاف معنی‌داری با میزان صفر و ۴۰ کیلوگرم در هکتار نشان داد. افزایش نیتروژن از ۸۰ به ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار، در فاصله کاشت ۲۵×۲۵ سانتی متر افزایش معنی‌داری در تعداد دانه برنج در بوته ایجاد نکرد.

عملکرد دانه

حداکثر عملکرد دانه برنج در سطح ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاصله کاشت ۲۵×۲۵ سانتی متر و حداقل آن در تیمار بدون نیتروژن و فاصله کاشت ۲۰×۲۰ سانتی متر به دست آمد (شکل ۶). نتایج نشان داد که تغییر در فاصله کاشت از ۲۰×۲۰ به ۲۵×۲۵ سانتی متر و در سطوح نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه برنج شد اما این اختلاف معنی‌دار نبود.

۲۵×۲۵ سانتی متر به طور معنی‌داری تعداد دانه برنج در بوته را افزایش داد. بلاک شا (Blackshaw, 1994) گزارش داد که افت عملکرد دانه گندم بر اثر سایه‌اندازی می‌تواند به دلیل کاهش باروری گلچه، کاهش تعداد دانه در خوشه و یا کاهش وزن دانه باشد. سام و همکاران (Sam et al., 1991) دریافتند، کاهش عملکرد دانه برنج در تداخل با علف هرز برنج قرمز مربوط به تعداد دانه در خوشه و طول خوشه بود. نتایج نشان داد که در هر فاصله کاشت تعداد دانه در بوته برنج با بیشترشدن میزان کود افزایش یافت که این افزایش در فاصله کاشت ۲۰×۲۰ سانتی متر بوته‌های برنج از یکدیگر اختلاف معنی‌داری نشان نداد و در فاصله کاشت ۲۵×۲۵ سانتی متر بوته‌های برنج از یکدیگر در میزان ۸۰ کیلوگرم




شکل ۶- اثر بر همکنش نیتروژن و فاصله کاشت بر عملکرد دانه برنج

Fig. 5. Interaction effect of nitrogen and plant spacing on rice seed yield
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

گونه‌ای) نسبت داد. در فاصله کاشت 25×25 سانتی‌متر به دلیل افزایش فاصله بین بوته‌ها، این رقابت کمتر شده و با افزایش تراکم علف هرز از 20×20 به 40 بوته در مترمربع عملکرد دانه به طور معنی‌داری کاهش یافت. به عبارت دیگر در فاصله کاشت کمتر بین بوته‌های برنج، علی‌رغم افزایش تعداد بوته در واحد سطح به دلیل اینکه تعداد خوشه در بوته برنج کاهش یافت، عملکرد نیز کاهش پیدا کرد. از طرفی به دلیل بسته‌تر شدن فاصله و سایه‌اندازی بیشتر، رقابت برای نور افزایش یافت که به دلیل تغییر یافتن شدت نور و کیفیت آن رشد مطلوب گیاه زراعی را تحت تأثیر قرار داد. اسمتیت (Smith, 1987) دریافت که با افزایش تراکم دزگال، عملکرد دانه برنج کاهش می‌یابد. ونگریس و همکاران (Vengris et al., 1955) ابراز داشتند که سطوح بالای کود قادر به برطرف کردن اثرات رقابت علف هرز نیست.

افزایش تراکم علف هرز از صفر به 20 ، 30 و 40 بوته در مترمربع، عملکرد دانه برنج را به طور معنی‌داری کاهش داد (شکل ۷). حداکثر عملکرد دانه برنج در فاصله کاشت 25×25 سانتی‌متر بوته برنج از یکدیگر و ییمار بدون دزگال به دست آمد. با افزایش تراکم دزگال، عملکرد به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. حداقل عملکرد دانه برنج در فاصله 20×20 سانتی‌متر و تراکم 40 بوته علف هرز دزگال در مترمربع به دست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله بین بوته‌های برنج از 20×20 به 25×25 سانتی‌متر، عملکرد دانه افزایش یافت اما این افزایش معنی‌دار نبود. در فاصله کاشت 20×20 سانتی‌متر، افزایش تراکم علف هرز باعث کاهش عملکرد دانه شد اما این کاهش در تراکم‌های 30 ، 20 و 40 بوته علف هرز دزگال در مترمربع اختلاف معنی‌داری نشان نداد. دلیل این را می‌توان به وجود افزایش رقابت بین بوته‌های علف هرز (رقابت درون




شکل ۷- اثر بر همکنش تراکم علف هر ز دزگال و فاصله کاشت بر عملکرد دانه برنج

Fig. 6. Interaction effect of weed density and plant spacing on rice seed yield
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

۴ کیلوگرم در هکتار، افزایش فاصله کاشت از 20×20 به 25×25 سانتی متر به طور معنی داری شاخص برداشت را کاهش داد، در سطوح بالای نیتروژن این کاهش معنی دار نبود (شکل ۸). گنزالس (Gonzalez, 1987) دریافت بر اثر رقابت یولاف وحشی، نسبت وزن دانه به وزن کاه کاهش می باید و بدین ترتیب عملکرد دانه بیشتر از بخش رویشی تحت تأثیر قرار می گیرد. با افزایش کود نیتروژن از صفر به ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم، اختلاف معنی داری در شاخص برداشت ایجاد نشد. آبمو (Abamu, 1995) دریافت که شاخص برداشت تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن قرار نمی گیرد.

شاخص برداشت

نتایج نشان داد که در فاصله کاشت 25×25 سانتی متر با افزایش نیتروژن، از صفر تا ۸۰ و از ۸۰ به ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده نشد. اما بهترین میزان کود مصرفی ۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار است. با افزایش نیتروژن به ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار، کارایی کود اضافی کاهش پیدا کرد و در فاصله کاشت 20×20 سانتی متر، افزایش نیتروژن از صفر به ۴۰ کیلوگرم در هکتار، به طور معنی داری شاخص برداشت را افزایش داد. در افزایش نیتروژن از ۴۰ به ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار هیچگونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در سطوح پایین نیتروژن یعنی صفر و



شکل ۸- اثر بر همکنش نیتروژن و فاصله کاشت بر شاخص برداشت برنج

Fig. 8. Interaction effect of nitrogen and plant spacing on rice harvest index
(Error bars represent ± 1 standard error of the mean)

References

منابع مورد استفاده

- باقری، م. م. ۱۳۷۳. بررسی اثرات تراکم بوته (فاصله کاشت نشاء) در عملکرد برنج چمپا قصرالدشتی. سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تبریز. شهریور ۷۳. چکیده مقالات. صفحه ۶۶.
- شرفی، ن. ۱۳۷۳. بررسی اثر فاصله کاشت نشاء و سطوح کودی در راندمان محصول ارقام ۳۰۴ و ۳۰۵ برنج. سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه تبریز. شهریور ۷۳. چکیده مقالات. صفحه ۱۰۰.
- Abamu, F. J. 1995.** Evaluating a crop-weed simulation model as a tool for weed management in irrigated transplanted rice (*Oryza sativa* L.). College, Laguna (Philippines). 174 pp.
- Bhaiyan, N. L. and A. L. Shah. 1990.** Effect of nitrogen fertilizer management and plant population density on nitrogen fertilizer use efficiency in irrigated (Boro) Rice Bangladesh-Rice-Journal. 1: 48-54.
- Blackshaw, R. E. 1994.** Differential competitive ability of winter wheat cultivars against downy brome. Agron. J. 86: 649-654.
- Cole, Z. A. and J. S. Manuel. 1988.** Effect of weeds on the yield and yield components of lowland rice affected by nitrogen fertilization. Pest Control Council of the Philippines. Cebu City. 19: 1pp.
- Gonzalez, O. R. 1987.** Competition for N and between wheat and wild oat (*Avena sterilis*) according to the proximity of their time of emergence. Plant Soil. 102: 133-139.
- Inamura, T., S. Miyagawa., O. Singvilya., N. Sipaseauth and Y. Kono. 2003.** Competition between weeds and wet season transplanted paddy rice for nitrogen use, growth and yield in the central and northern regions of Laos. Weed Biology and Management. 3: 213-221(9).
- Kim, S. C. and R. Moody. 1980.** Effect of plant spacing on the competition ability of rice growing in association with various weed communities at different nitrogen levels. J. Korean. Soc. Crop Sci. 25: 17-27.

- Liagas, M. A., T. R. Mig, and S. K. De Datta.** 1987. Integrated weed management in broadcast-seeded flooded rice (*Oryza sativa*). International Rice Research Inst.1P.
- Lin, J. L. and T. L. Lin.** 1985. Tiller number and leaf area index in rice community as influenced by planting density and N-fertilizer. J. Agric. Assoc. China. 129: 14-34.
- Luh, B. S.** 1991. Rice Production. Van Nostrand Reinhold NY., 439 pp.
- Madison, W.** 1993. Effect of nitrogen and harvest grain moisture on head rice yield. Agron. J. 85: 1143-1146.
- Pande, H. K. and V. M. Bhan.** 1966. Effect of row spacing and levels of fertilization on growth, yield and nutrient uptake of upland paddy and on associated weeds. Riso. 15: 47-67.
- Rathi, G. S., J. P. Patel, and R. S. Sharma.** 1984. Relative performance of some dwarf varieties of rice (*Oryza sativa*) and their response to spacing and planting pattern. Indian. J. Agron. 29: 218-221.
- Sam, L. K., S. G. Roy, and T. E. Ronald.** 1991. Interference of red rice (*Oryza sativa*) densities in rice (*O. sativa*). Weed Sci. 39: 169-174.
- Senanayake, N., R. E. L. Naylor, and S. K. DeDatta.** 1996. Effect of nitrogen fertilization on rice spikelet differentiation and survival. J. Agric Sci. Camb. 127: 303-309.
- Sharmas, A. R., D. P. Singh.** 1999. Rice. In :D.L.Smith, and Chamel(eds.) p:109-168.Crop Yield ,Physiology and Processes.Springer Verlag Berlin, Heidelbrg
- Smith, R. J. J.** 1987. Area of interference of Hemp sesbania in rice. Proc. South. Weed Sci. Soc. 40: 305.
- Surajit, K. and DeDatta.** 1981. Principles and practices of rice production. John Wiley and Sons. Inc. Singapore. 618 PP.
- Vengris, J., W. G. Colby, and M. Drake.** 1955. Plant nutrient competition between weeds and corn. Agron. J. 47: 213-216.
- Visperas, R. M., A. Sanico, M. R. C. Laza, and S. Peng.** 1994. Stability of tillering of the new rice plant types under different population densities and nitrogen levels. IRRI. The Philippine J. Crop Sci. 19: 62.
- Wagh, R. G. and S. T. Thorat.** 1987. Effect of split application of nitrogen and plant densities on yield and yield attributes of rice. Oryza. 24: 169-171.
- Wang, Y., Y. Yamamoto, and Y. Nitta.** 1995. Analysis of the factors of high yielding ability for a Japonica type rice (*Oryza sativa*) line, 9004, breed in China. 1: Comparison of yielding ability with a Japanese rice variety under the same level of spikelets number per area. Jap. J. Crop Sci. 64: 545-555.
- Willauer, J. L., R. R. Valdez, and T. Cruz.** 1995. Nitrogen use efficiency and grain yield of lowland cultivars. IRRI. Annual Scientific Meeting of the Federation of Crop Science Society of The Philippines. 23-30 Apr.
- Yamamoto, Y., H. Kurokawa, Y. Nitta, and T. Yoshida.** 1989. Varietal differences of tillering response to shading and nitrogen levels in rice (*Oryza sativa*) plant: Comparison between high tillering semidwarf indica and low tillering Japonica. Japan. J Crop Sci. 64: 227-234.
- Zia, M. S.** 1987. Effect of plant density and fertilization on rice yield and fertilizer efficiency. International Rice Research Newsletter. (The Philippines). 12: 56.