

"مجله علوم زراعی ایران"

جلد هفتم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز سویا در منطقه ساری Determination of critical period of weed control in soybean (*Glycine max. L*) in Sari

علی افتخاری^۱، امیرحسین شیرانی‌راد^۲، عبدالمجید رضایی^۳،
حمید صالحیان^۴، محمدرضا اردکانی^۵

چکیده

افتخاری، ع.، ا. ح. شیرانی‌راد، ع. رضایی، ح. صالحیان، م. ر. اردکانی، ۱۳۸۴. تعیین دوره بحرانی علف‌های هرز سویا در منطقه ساری. مجله علوم زراعی ایران. جلد هفتم، شماره ۴، صفحه:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز سویا، در سال ۱۳۸۱ آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دشت ناز ساری با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و ۱۶ تیمار به اجرا درآمد. تیمارها شامل دوره‌های مختلف عاری از علف هرز و نیز دوره‌های متفاوت رقابت علف‌های هرز در مراحل فنولوژیک گیاه بود. دو تیمار نیز به عنوان شاهد آزمایش یکی کنترل در تمام فصل رشد و دیگر رقابت علف‌های هرز در تمام فصل رشد در نظر گرفته شدند. از میان هشت گونه علف هرز شناسایی شده، علف هرز تاج خروس با ۴۷/۲ درصد، بیشترین و علف هرز پیچک با ۲/۳ درصد کمترین سهم تجمع ماده خشک علف‌های هرز را داشتند و با افزایش دوره عاری از علف هرز، وزن خشک علف‌های هرز به طور معنی‌دار کاهش یافت. طول دوره عاری از علف‌های هرز تأثیر معنی‌دار بر تعداد گره ساقه، وزن خشک دانه و تعداد دانه در غلاف نداشت. حداکثر تعداد غلاف در بوته، مربوط به تیمار شاهد عاری از علف‌های هرز با ۸۵ غلاف و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد رقابت با علف‌های هرز با ۴۰ غلاف در هر بوته بود، همچنین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد شاخه‌های فرعی در بوته نیز با افزایش دوره تداخل علف‌های هرز به مقدار بسیار معنی‌داری کاهش یافت به طوری که میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد عاری از علف‌های هرز از 570 g/m^2 به 185 g/m^2 در تیمار شاهد رقابت علف‌های هرز رسیده است. با توجه به نتایج این تحقیق، می‌توان نتیجه گرفت که با حذف علف‌های هرز فقط بین مراحل فنولوژیک V_3 (۲۵ روز پس از کاشت) تا R_1 (۵۲ روز پس از کاشت) از کاهش معنی‌دار عملکرد دانه جلوگیری می‌شود. روند تغییرات درصد عملکرد مشاهده شده نسبت به شاهد در دوره مذکور از ۹۹/۹۳ درصد در تیمار FR_1 به ۸۰/۷۶ درصد در تیمار FV_{11} (۴۵ روزه پس از کاشت) و از ۹۸/۵۹ درصد در تیمار CV_3 به ۷۲/۲ درصد در تیمار CV_7 (۳۷ روز پس از کاشت) رسیده است.

واژه‌های کلیدی: تداخل، کنترل، دوره بحرانی، سویا و علف‌های هرز.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۳/۱۱/۲۷

۲- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

۱- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر (مکاتبه‌کننده)

۴- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

۳- استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

۵- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مقدمه

از زمانی که بشر برای افزایش محصول اولین بار به کشاورزی از طریق سیستم تک کشتی پرداخت، مفهوم علف‌های هرز به عنوان گیاهان ناخواسته‌ای که از طریق رقابت موجب کاهش محصول می‌شوند به وجود آمد (سلطان و همکاران، ۱۹۸۷). علف‌های هرز دارای ویژگی‌های خاصی هستند. آن‌ها بذر فراوان تولید می‌کنند. بذر علف‌های هرز دارای دوره‌های خواب هستند و قادرند در شرایط نامساعد، قوه نامیه خود را برای مدت طولانی حفظ کنند (راشد محصل، ۱۳۷۲). دوک (Duke, 1985) در آزمایش‌های خود پی برد که در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز علاوه بر ترکیب روش‌های مختلف مبارزه، شناخت دقیق علف‌های هرز با استفاده از فاصله زمانی سبز شدن گیاه زراعی و علف هرز، تعیین بهترین زمان مبارزه با کمترین میزان افت عملکرد و کمترین هزینه تولید، با در نظر گیری دوره‌های بحرانی کنترل علف‌هرز (Critical period weed control) نیز باید مورد نظر قرار گیرد. هال و همکاران (Hall et al., 1992) در آزمایش‌های خود نتیجه گیری کردند که دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز، فاصله زمانی در طول زندگی محصول است که به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد باید عاری از علف هرز نگه داشته شود. جکسون و همکاران (Jackson et al., 1985) نشان دادند که این دوره بحرانی زمانی است که علف‌های هرز شدیدترین رقابت را با محصول انجام می‌دهند و خسارت اصلی و عمده در این فاصله زمانی اتفاق می‌افتد. وان‌اکر و همکاران (Van Acker et al., 1993) نتیجه گرفتند که اگر علف‌های هرز در دوره بحرانی در مزرعه حضور داشته باشند و بعد یا قبل از آن حذف بشوند، خسارت عمده خود را وارد کرده و باعث کاهش چشمگیر عملکرد محصول می‌شوند. اما اگر قبل از شروع دوره بحرانی و همچنین بعد از پایان آن در مزرعه حضور داشته باشند، ولی در طول دوره بحرانی حذف بشوند، خسارت قابل

ملاحظه‌ای ایجاد نمی‌شود. برای تعیین دوره بحرانی، مشخص کردن دو فاصله زمانی که مزرعه به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد باید عاری از علف هرز باشد و حداکثر فاصله زمانی که علف‌های هرز می‌توانند حضور داشته باشند بدون این که باعث کاهش قابل ملاحظه عملکرد بشوند، ضروری است. با دانستن دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز برای هر محصول در هر مکان، می‌توان زمان دقیق مصرف علف کش‌ها را تعیین کرده و از مصرف اضافی و بی‌موقع آن‌ها که آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد، جلوگیری کرد. همچنین عملیات مکانیکی کنترل علف هرز مانند شخم و وجین را به حداقل ممکن رساند و در نتیجه از فرسایش خاک جلوگیری به عمل آورد. با تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز، به علت کاهش مقدار کاربرد علف کش‌ها و سایر روش‌های مبارزه هزینه‌های مربوطه به کمترین مقدار خود خواهد رسید همچنین نمی‌توان یک گونه خاص را به عنوان شاخص دوره بحرانی به کار برد، زیرا در مزرعه با تراکم و گونه‌های مختلف علف‌های هرز با اثرات متقابل با یکدیگر و با گیاهان زراعی مواجه هستند آن‌ها همچنین اظهار کردند که علف‌های هرزی نظیر علف هفت بند (*Polygonum sp.*)، گاوپنبه (*Ahutilon theophrasti*) و دم روباهی زرد (*Setaria viridis*) باعث کوتاه ماندن ارتفاع گیاه سویا، افزایش ورس و اندکی تأخیر در رسیدن محصول شدند. زیمداهل (Zimdahl, 1993) دوره بحرانی کنترل قیاق (*Sorghum halopense*) در سویا را بین ۲ تا ۶ هفته پس از سبز شدن تعیین کرد. ولی و همکاران (Woolley et al., 1993) با انجام پژوهشی با عنوان دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در لویسا دریافتند که شروع دوره بحرانی که با شروع افزایش وزن خشک علف‌های هرز همزمان بود در مرحله آغاز گل‌دهی و تقریباً ۴۶ روز پس از کاشت بود؛ تعداد دانه در غلاف و وزن دانه در اثر رقابت علف‌های هرز به طور معنی‌داری کاهش نیافت در

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز...

مواد و روش‌ها

این تحقیق در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در دشت ناز ساری و در محل زمین‌های زراعی شرکت کشت و صنعت دشت ناز با طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۱۳ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۶۰ دقیقه شمالی و با ارتفاع ۲۸ متر از سطح دریا به اجرا درآمد. بافت خاک مزرعه از نوع لومی رسی، با هدایت الکتریکی ۰/۴۴ میلی‌موس بر سانتی‌متر، ماده آلی خاک در حدود ۲/۹ درصد و کربن آلی ۱/۶۵ درصد و pH تا عمق ۳۰ سانتی‌متری حدود ۷/۸۴ اندازه‌گیری شد. طرح در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و ۳ تکرار به اجرا درآمد. فاصله بوته‌ها روی ردیف ۵ سانتی‌متر و بین ردیف‌ها ۵۰ سانتی‌متر بود و هر کرت شامل ۵ ردیف به طول ۸ متر و عرض ۲۵۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد. فاصله بین کرت‌ها نیز ۵۰ سانتی‌متر و فاصله بین هر تکرار ۲ متر در نظر گرفته شد. بذر مورد استفاده سویا رقم جی کی (J.K) بود.

به علت آن که گونه خاصی از علف هرز در نظر گرفته نشد. مثل دیگر آزمایش‌های دوره بحرانی از آلودگی طبیعی استفاده شد. تیمارها در دو دسته هشت‌تایی یک دسته تیمارهای تداخل و دیگری تیمارهای کنترل در نظر گرفته شدند. مراحل فنولوژیکی شروع و اتمام کنترل علف‌های هرز شامل V_1 (ظهور اولین برگچه)، V_3 (ظهور سومین برگچه)، V_7 (ظهور هفتمین برگچه)، V_{11} (ظهور بازدهمین برگچه)، R_1 (شروع گلدهی)، R_3 (شروع غلاف‌دهی) و R_5 (شروع پر شدن دانه) بود. دو تیمار نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند، یکی شاهد (با علف‌هرز در تمام فصل رشد) و دیگری شاهد (رقابت در تمام فصل رشد) در تیمارهای تداخل پس از رسیدن به مرحله فنولوژیکی مورد نظر، وجین علف‌های هرز انجام شد و این وجین تا انتهای فصل رشد ادامه یافت. و در مورد تیمارهای کنترل برعکس تیمارهای تداخل عمل گردید، بدین نحو که ابتدا کنترل علف‌های هرز براساس مراحل

صورتی که تعداد غلاف در گیاه کاهش معنی‌دار نشان داد.

مونس و الیور (Mones and Oliver, 1998) در بررسی گونه علف هرز سویا دریافتند زمانی که رقابت تنگاتنگی بین محصول و علف هرز اتفاق افتد، عملکرد بسیار کاهش می‌یابد اما گونه‌های مختلف علف هرز در فواصل زمانی یکسان تأثیر مشابه‌ای بر کاهش عملکرد نداشتند. راس و همکاران (Ross et al., 1983) گزارش کردند که یک دوره عاری از علف‌های هرز به مدت ۴ هفته پس از سبز شدن سویا، وزن خشک علف‌های هرز را در زمان برداشت محصول، ۸۷ درصد کاهش داد.

راشینگ و الیور (Rushing and Oliver, 1998) اظهار کردند که تراکم و مدت تداخل توق تأثیری بر ارتفاع و تعداد گره ساقه اصلی سویا نداشت. هادی‌زاده (۱۳۷۵) زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز سویا در منطقه مشهد را از مرحله V_2 تعیین کرد.

لیند کوئیست و همکاران (Linguist et al., 1999) بیان کردند که توانایی رقابتی محصولات زراعی و علف‌های هرز وابستگی شدیدی به شرایط محیطی دارد؛ محیط می‌تواند نقش مهمی در الگوی جوانه‌زنی و تنظیم روابط رقابتی بین علف هرز و محصولات زراعی ایفا کند.

مارتین و همکاران (Martin et al., 2001) اظهار کردند که علف‌های هرز در تراکم‌های خیلی کم، ممکن است دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز نداشته باشند و همچنین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در محصولات مشابه نیز متفاوت است.

با توجه به تحقیقات انجام گرفته، هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی، تعیین علف‌های هرز غالب منطقه و تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز سویا و تأثیر رقابت علف‌های هرز آن بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی سویا بود.

برای تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و برآزش منحنی‌های درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد، بدون رقابت به ترتیب برای افزایش دوره رقابت از مرحله رشدی تا زمان برداشت و افزایش دوره رقابت از زمان سبز شدن تا مرحله رشدی از معادلات فرم گامپترز و لجستیک استفاده شد. این معادلات از روش غیرخطی و با استفاده از برنامه آماری SIGMA STAT و SLIDE WRIGHT برآزش داده شدند. مقدار عددی ۵٪ کاهش عملکرد برای هر یک از دوسری تیمار برای محاسبه حداکثر دوره مجاز رقابت یا حضور علف هرز از هنگام کاشت و حداقل دوره عاری از علف هرز از ابتدای کاشت بدون کاهش عملکرد معنی‌دار به ترتیب در معادلات فرم لجستیک و فرم گامپترز قرار داده شد تا از اختلاف این دو دوره، دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز سویا به دست آید.

برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن از نرم‌افزار آماری MSTATC استفاده شد و برای ترسیم نمودارها، برنامه Word به کار گرفته شد.

فولوژیکی انجام شد و بعد از رسیدن به مراحل تعیین شده، هیچ گونه کنترلی (وجین) تا انتهای فصل انجام نگردید. صفات مورد ارزیابی شامل سهم نسبی وزن خشک هر گونه و وزن خشک مخلوط علف‌های هرز، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن خشک صدانه، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد گره ساقه اصلی، تعداد شاخه‌های فرعی در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک سویا بود. برای نمونه‌برداری و تعیین وزن خشک مخلوط علف‌های هرز در هر کرت از مساحت ۵ کوادرات ۳۰×۵۰ سانتی‌متری استفاده شد که به طور تصادفی در سطح کرت انداخته می‌شد. برای سایر صفات زراعی پس از حذف یک متر از ابتدا و انتهای هر کرت و همچنین حذف دو خط کناری به عنوان حاشیه، نمونه‌برداری از مساحت یک کوادرات یک مترمربعی انجام می‌گرفت. نمونه‌ها پس از برداشت برای تعیین وزن خشک به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۵°C در آون قرار داده شده و سپس توزین شدند. عمل برداشت سویا در هجدهم مهرماه انجام گرفت.

جدول ۱- سهم نسبی تجمع ماده خشک علف‌های هرز به تفکیک گونه در تیمارها و شاهد دارای

علف‌های هرز در تمام فصل رشد

Table 1. Relative share of cumulative dry matter of weed species in treatments and control with weeds in whole growing season

نام فارسی	نام علمی	سهم نسبی تجمع ماده خشک
تاج خروس	<i>Amaranthus retroflexus</i>	47.2
گاو پنبه	<i>Abutilon theophrasti</i>	21.3
تاج‌ریزی	<i>Solomon nigrum</i>	14.5
مرغ	<i>Cynodon dactylon</i>	8.1
قیاق	<i>Sorghum halepense</i>	5.6
علف قناری	<i>Setaria viridis</i>	4.4
توق	<i>Xanthium strumarium</i>	3.7
پیچک	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	2.3


عملکرد دانه، تعداد غلاف پوک در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد شاخه‌های فرعی در بوته و وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۱٪ برای وزن خشک

نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ برای عملکرد بیولوژیک،

وزن خشک علف‌های هرز تغییر معنی‌داری نیافت، ولی زمانی که دوره کنترل یا مرحله V11 کاهش یافت، وزن خشک علف‌های هرز به شدت افزایش پیدا کرد و تا انتها این روند تداوم یافت (شکل ۱).

علف‌های هرز و عدم تفاوت معنی‌دار برای وزن خشک صددانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد گره در ساقه اصلی است (جدول ۲ و ۳).
با کاهش دوره عاری از علف هرز (از شاهد عاری از علف هرز در تمام فصل رشد) تا R₁ (شروع گل‌دهی)،



تیمارهای کنترل علف‌های هرز

شکل ۱- اثر تیمارهای کنترل علف‌های هرز بر وزن خشک علف‌های هرز


Fig. 1. Effect of weeds control treatments on dry matter weight of weeds

نتایج نشان داد که در تیمارهایی که علف‌های هرز بیشترین تجمع ماده خشک را داشتند، عملکرد بیولوژیک سویا در حداقل بود (نمودار ۱۲ و ۱۳). همچنین بیشترین سهم نسبی تجمع ماده خشک به ترتیب مربوط به علف‌های هرز تاج خروس، گاو پنبه و تاج ریزی و کمترین تجمع ماده خشک مربوط به علف هرز پیچک بود (جدول ۲). راس و همکاران Ross *et al.*, 1983 نیز گزارش کردند که یک دوره عاری از علف‌های هرز ۴ هفته‌ای پس از سبز شدن سویا، وزن خشک علف‌های هرز را در زمان برداشت محصول ۸۷ درصد کاهش داد.


در تیمارهای کنترل، سویا روند عادی رشد خود را طی کرد و تعداد گره تحت تأثیر واقع نشد (شکل ۳). عدم تغییرات معنی‌دار تعداد گره در دوره‌های رقابتی نشانگر توان بالای رقابتی این گیاه با علف هرز است. راشینگ و اولیور (Rushing and Oliver, 1998) نیز در تحقیق خود پی بردند که تراکم و طول مدت تداخل توج تأثیری بر تعداد گره ساقه اصلی سویا نداشته است.

در تیمارهای کنترل، کاهش تعداد غلاف در بوته نسبت به تیمار شاهد (بدون علف هرز در تمام فصل رشد) تا تیمار ۱ R (شروع گلدهی) معنی‌دار نبود.

(جدول ۳). ولی زمانی که دوره کنترل تا V11 کاهش یافت تعداد غلاف در بوته به طور معنی‌دار کاهش یافت. در نتیجه برای جلوگیری از کاهش تعداد غلاف در بوته باید تا مرحله R₁ عملیات وجین انجام شود و نیازی




شکل ۲- اثر تیمارهای تداخل علف‌های هرز بر تعداد گره ساقه اصلی
Fig. 2. Effect of weed competition treatments on the number of nods of stem



شکل ۳- اثر تیمارهای کنترل علف‌های هرز بر تعداد گره در ساقه اصلی
Fig. 3. Effect of weed control treatments on the number of nods in mainstem

به کنترل علف‌های هرز از این مرحله به بعد نیست زیرا گسترش یافته و علف‌های هرز دیگر قادر به رقابت با بوته‌های سویا به اندازه کافی رشد کرده و سایه‌انداز آن سویا نیستند.




شکل ۴- اثر تیمارهای کنترل علف‌های هرز بر تعداد غلاف کل بوته

Fig. 4. Effect of weeds control treatments on the number of sheaths per plant

بوته کاهش معنی‌داری نشان داد (شکل ۵). بنابراین برای جلوگیری از کاهش معنی‌دار تعداد غلاف در بوته، دوره رقابت نباید از مرحله V_3 فراتر رود.

تیمارهای تداخل تا مرحله V_3 با تیمار شاهد (عاری از علف هرز در تمام فصل رشد) اختلاف معنی‌داری نداشتند، ولی زمانی که دوره تداخل تا مرحله V_7 ادامه یافت، تعداد غلاف در




شکل ۵- اثر تیمار تداخل علف‌های هرز بر تعداد غلاف در بوته

Fig. 5. Effect of weeds competition treatments on the number of sheaths per plant

زیرا در تیمارهای تداخل، رقابت برای استفاده از منابع به ویژه نور و مواد غذایی افزایش می‌یابد و با افزایش شدت رقابت و اختصاص مقادیر کمتری از منابع به غلاف‌ها، این امر منجر به پوک‌تری بیشتر می‌شود.

هاگود و همکاران Hagood *et al.*, 1980 نیز در تحقیق خود پی بردند که تراکم $1/4$ تا 40 بوته گاوپنبه در مترمربع باعث کاهش تعداد غلاف در بوته گردید. در تیمارهای تداخل با افزایش دوره‌های رقابت تعداد غلاف پوک در بوته افزایش یافت (شکل ۶)،



شکل ۶- اثر تیمارهای تداخل علف‌های هرز بر تعداد غلاف پوک در بوته


Fig. 6. Effect of weeds competition treatment on number of grain per sheath

خسارت خود را به صورت کاهش تعداد غلاف در بوته نشان می‌دهند و با کاهش تعداد غلاف، سهم مواد فتوسنتزی که به هر دانه می‌رسد بیشتر می‌شود. از طرفی در تیمارهای تداخل فشار رقابت و سایه‌اندازی علف‌های هرز باعث ریزش برگ و رشد و نمو ضعیف گیاه می‌شود و در مجموع، مواد فتوسنتزی کاهش می‌یابد و چون از تعداد دانه در اثر کاهش تعداد غلاف در بوته کاسته شده است، مواد فتوسنتزی موجود بین دانه‌های کمتری توزیع شده و در نهایت وزن خشک صددانه در تیمار تداخل اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد (بدون علف‌هرز) نشان نداده است. در تیمارهای کنترل نیز به خاطر شرایط مطلوب، تعداد دانه در بوته به خاطر افزایش تعداد غلاف در بوته بیشتر شده و باعث گردیده است که

تعداد دانه در غلاف تحت تأثیر تیمارهای تداخل و کنترل علف‌های هرز قرار نگرفت، زیرا اعمال تیمارهای تداخل باعث کاهش تعداد غلاف در بوته می‌شود از طرفی غلاف‌های تشکیل شده با روند مشابه‌ای دانه‌بندی می‌کنند، بنابراین همان تعداد غلاف کمی هم که تشکیل می‌شود، دانه می‌بندد و تعداد دانه در غلاف اختلاف معنی‌داری در تیمارهای کنترل و تداخل نشان نمی‌دهد وولی و همکاران Wolley *et al.*, 1993 نیز نشان دادند که تعداد دانه در غلاف تحت تأثیر رقابت علف‌های هرز قرار نمی‌گیرد.

در مورد وزن خشک صد دانه اثر تیمارهای تداخل و کنترل علف‌های هرز معنی‌دار نشد (جدول ۳). توجیه این مطلب می‌تواند چنین باشد که علف‌های هرز عمده

مواد فتوستتزی بین تعداد بیشتری دانه توزیع شود. معنی داری با تیمار شاهد (بدون علف هرز) نشان نداد وزن خشک صددانه در تیمار کنترل اختلاف (شکل ۷).




شکل ۷- اثر تیمارهای کنترل علف‌های هرز بر وزن خشک صددانه

Fig.7. Effect of weeds control treatments on 200-grains drymatter weight

تعداد شاخه‌های فرعی در بوته در تیمارهای تداخل با افزایش دوره‌های رقابت کاهش یافت و به کمترین مقدار خود در تیمار شاهد (وجود علف هرز در تمام دوره رشد) رسید (شکل ۸).

هاگود و همکاران (Hagood *et al.*, 1998) نیز در بررسی رقابت گاو پنبه با سویا همبستگی پائینی را بین وزن دانه با عملکرد دانه نشان دادند




شکل ۸- اثر تیمارهای تداخل علف‌های هرز بر تعداد شاخه در بوته

Fig. 8. Effect of weeds competition treatment on branches number

تیمار شاهد (بدون علف هرز در تمام فصل رشد) تا مرحله R_1 (شروع گلدهی) اختلاف معنی‌داری را نشان نداد، ولی با کاهش دوره کنترل به V_{11} کاهش معنی‌داری در تعداد شاخه فرعی در بوته مشاهده شد (شکل ۹).

با افزایش دوره‌های رقابت، میزان منابع محیطی اختصاص یافته به جوانه‌های رویشی جانبی کاسته شد و قابلیت رشد شاخه‌های فرعی معنی‌دار نشد، ولی وقتی دوره تداخل تا V_7 به طول انجامید، شاخه‌های فرعی با کاهش یافتن دوره کنترل از




شکل ۹- اثر تیمارهای کنترل علف هرز بر تعداد شاخه‌های فرعی

Fig. 9. Effect of weed control treatment on secondary branches number

شاهد (بدون علف هرز در تمام فصل رشد) در عملکرد سویا مشاهده نشد، ولی زمانی که دوره عاری از علف هرز به مرحله V_{11} کاهش یافت، عملکرد سویا به طور معنی‌داری کم شد (شکل ۱۰).

تیلور Taylor, 1980 نیز در تحقیق خود پی‌برد که جبران محصول در هر گیاه در شرایط تراکم کم بر اثر افزایش تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف در بوته است. در تیمار دوره عاری از علف هرز تا مرحله R_1 (شروع گل‌دهی) کاهش معنی‌داری نسبت به تیمار




شکل ۱۰- اثر تیمارهای کنترل علف‌های هرز بر عملکرد دانه

Fig. 10. Effect of weed control treatments on grain yield

در سایه اندازه سویا قادر به رقابت با سویا نیستند و وجود آن‌ها در انتهای فصل رشد باعث کاهش معنی‌دار در عملکرد محصول نمی‌شود. با افزایش دوره تداخل تا مرحله V_3 نسبت به تیمار شاهد (عاری از علف هرز در تمام فصل رشد)، کاهش معنی‌داری در عملکرد دانه سویا اتفاق نمی‌افتد. وقتی دوره رقابت علف هرز تا مرحله V_7 افزایش پیدا کرد، عملکرد دانه سویا به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد (شکل ۱۱).

بنابراین امکان کاهش دوره عاری از علف هرز از تمام فصل رشد به مرحله R_1 (شروع گل‌دهی) فراهم است، بدون این که کاهش معنی‌داری در عملکرد سویا روی دهد و به عبارت دیگر لازم نیست مزرعه در تمام فصل رشد بدون علف‌های هرز باشد. به نظر می‌رسد بوته سویا تا مرحله گل‌دهی به اندازه کافی رشد کرده و از قدرت رقابتی خوبی برخوردار می‌شود، به طوری که شرایط برای رشد و توسعه علف‌های هرز با مشکل مواجه شده و به علت قرار گرفتن علف‌ها



تیمارهای تداخل علف‌های هرز در مراحل رشدی
Treatments of weeds competition during growth stages

شکل ۱۱- اثر تیمارهای تداخل علف‌های هرز بر عملکرد دانه


Fig. 11. Effect of weed competition treatment on grain yield

اکولوژیک آن‌ها از محدودیت کمتری برخوردار است و تداخل آن‌ها کمتر است، علف هرز و سویا کوچک بوده و هنوز ریشه و قسمت‌های هوایی آن‌ها در محیط عمل یکدیگر تداخل ایجاد نمی‌کنند در حالی که با گذشت زمان قابلیت رقابت آن‌ها بیشتر شده و اثرات بازدارندگی متقابل علف هرز و گیاه زراعی افزایش

می‌توان نتیجه گرفت که علف‌های هرز حداکثر تا مرحله V_3 می‌توانند در مزرعه حضور داشته باشند، بدون این که باعث کاهش معنی‌دار عملکرد سویا در مقایسه با شاهد (عاری از علف هرز در تمام فصل رشد) شوند. تا مرحله V_3 رقابت بین علف‌های هرز و محصول برای نور، آب و مواد غذایی ناچیز است، زیرا در این زمان، آشیان

عملکرد دانه سویا شد. اثر تیمارهای تداخل و کنترل علف‌های هرز بر عملکرد بیولوژیک معنی‌دار بود. با افزایش دوره‌های رقابت، عملکرد بیولوژیک کاهش یافت و به کمترین مقدار خود در تیمار شاهد (علف هرز در تمام دوره رشد) رسید (شکل ۱۲).


می‌یابد و کاهش تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد غلاف در بوته باعث کاهش عملکرد دانه بعد از مرحله V_3 می‌شود. هاگود و همکاران Hagood *et al.*, 1981 نیز در تحقیق خود پی بردند که تراکم $0.7-2.0$ بوته^۲ تون در مترمربع باعث کاهش ۵۴-۱۸ درصدی



شکل ۱۲- اثر تیمارهای تداخل علف‌های هرز بر عملکرد بیولوژیک
Fig. 12. Effect of weeds competition treatment on biological yield

فصل رشد) تا مرحله R_1 (شروع گل‌دهی) کاهش معنی‌داری در عملکرد بیولوژیک حاصل نشد، ولی وقتی دوره کنترل تا مرحله V_{11} کاهش یافت، عملکرد بیولوژیک معنی‌دار گردید (شکل ۱۳).

با افزایش دوره رقابت علف‌های هرز، تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد غلاف در بوته کاهش یافت و نهایتاً عملکرد بیولوژیک دچار افت شد. در تیمارهای کنترل علف‌های هرز با کاهش دوره کنترل از شاهد (بدون علف هرز در تمام



شکل ۱۳- اثر تیمارهای کنترل علف‌های هرز بر عملکرد بیولوژیک
Fig. 13. Effect of weed control treatments on biological yield

هاریسون و همکاران Harrison *et al.*, 1985 دریافتند که مداخله دم روباهی از ۱۵ روز بعد از رویش سویا در شرایط مطلوب رشد (بارندگی کافی) باعث کاهش تجمع ماده خشک سویا می‌گردد. دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز از طریق معادلات فرم گامپرتز به همراه خطای معیار و ۹۵ درصد فاصله اطمینان (جدول ۴) و معادلات لجستیک به همراه خطای معیار و ۹۵ درصد فاصله اطمینان (جدول ۵) و براساس مقادیر نسبی عملکرد نسبت به شاهد (عاری از علف هرز در تمام فصل رشد) تعیین گردید.

جدول ۴- مقادیر پارامتری به همراه خطای معیار و ۹۵ درصد فاصله اطمینان برای فرم لجستیک
Table 4. Parametr values to standard error and %95 confidence distance for logestic form

پارامتر Parametr	مقدار تخمین	خطای معیار مجانبی Standard error	فاصله اطمینان ۹۵٪ مجانبی Confidence distance %95	
			حد پایین down limit	حد بالا upper limit
D	3.9794	0.0949	2.9687	4.7646
K	0.1608	0.0350	0.0232	0.2983
F	2.7262	0.1806	2.2617	3.1906

$$Y = ((1/De^{K(T-X)} + F)) + ((F-1)F)100$$

Y = عملکرد (درصد نسبت به شاهد فاقد رقابت)

e = تابع نمایی

T = روزهای پس از سبز شدن

X = نقطه عطف بر حسب روز (در اینجا روز ۹۴)

F, D, K = مقادیر ثابت

جدول ۵- مقادیر پارامتری به همراه خطای معیار و ۹۵ درصد فاصله اطمینان برای فرم گامپرتز
Table 5. Parametr values to standard error and %95 confidence distance for Gmperts forme

پارامتر Parametr	مقدار تخمین	خطای معیار مجانبی Standard error	فاصله اطمینان ۹۵٪ مجانبی Confidence distance %95	
			حد پایین down limit	حد بالا upper limit
A	1.0125	0.0937	0.7715	1.2535
B	0.6951	0.4210	-0.3874	1.7777
K	0.0410	0.0346	-0.0481	0.1301

$$Y = A \exp(-B \exp(-KT))$$

Y = عملکرد (درصد از شاهد فاقد رقابت)

A = مجانب عملکرد (درصد از شاهد فاقد رقابت)

exp = تابع نمایی

T = روزهای پس از کاشت

B, K = مقادیر ثابت

رقابت علف‌های هرز از شاهد (عاری از علف‌هرز در تمام فصل رشد) به مرحله R_1 تقلیل یافت، کاهش معنی‌داری در عملکرد محصول مشاهده نشد. هنگامی که این دوره به مرحله V_{11} رسید، عملکرد به طور معنی‌دار کاهش یافت. یعنی حداقل مجاز دوره عاری از علف‌هرز مرحله R_1 تعیین شد و عملکرد مشاهده شده نسبت به شاهد از $99/93$ درصد در مرحله R_1 به $80/68$ درصد در مرحله V_{11} رسید (جدول ۴). از طرف دیگر هنگامی که دوره رقابت علف‌های هرز از شاهد (عاری از علف‌هرز در تمام فصل رشد) به مرحله V_3 افزایش یافت کاهش معنی‌داری در عملکرد محصول مشاهده نشد اما موقعی که این دوره به مرحله V_7 رسید کاهش عملکرد معنی‌دار بود. به طوری که در تیمارهای رقابت عملکرد مشاهده شده نسبت به شاهد از $98/09$ درصد در مرحله V_3 به $72/2$ درصد در مرحله V_7 رسید (جدول ۵).


وقتی دوره عاری از علف‌هرز از تمام فصل رشد (شاهد) به مرحله R_1 تقلیل یافت، کاهش معنی‌داری در عملکرد محصول مشاهده نشد. هنگامی که این دوره به مرحله V_{11} رسید، عملکرد به طور معنی‌دار کاهش یافت. یعنی حداقل مجاز دوره عاری از علف‌هرز مرحله R_1 تعیین شد و عملکرد مشاهده شده نسبت به شاهد از $99/93$ درصد در مرحله R_1 به $80/68$ درصد در مرحله V_{11} رسید (جدول ۴). از طرف دیگر هنگامی که دوره

جدول ۶- مقادیر مشاهده شده، پیش‌بینی شده و ۹۵٪ حدود اطمینان برای زمان بحرانی حذف علف‌های هرز

(فرم لجستیک) و دوره بحرانی عاری از علف‌هرز (فرم گامپرتز)

Table 6. Observed values, predicted values and 95% confidence intervals for critical time of weeds control (logestic form) and critical period of weed control (Gampertz form)

دوره‌های تداخل تا مرحله رشدی (فرم لجستیک)					دوره‌های تداخل از مرحله رشدی (فرم گامپرتز)					
Interference period of growth stage (Logestic form)					Interference period of growth stage (Gampertz form)					
روزهای پس از کاشت	رقابت از مرحله	عملکرد مشاهده شده (%)	عملکرد پیش‌بینی شده (%)	حدود اطمینان حد پایین	۹۵٪ حد بالا	رقابت از مرحله	عملکرد مشاهده شده (%)	عملکرد پیش‌بینی شده (%)	حدود اطمینان حد پایین	۹۵٪ حد بالا
days after planting	of stage	observed yield (%)	predicted yield (%)	considence intervals Down limit	95% upper limit	of stage	observed yield (%)	predicted yield (%)	considence intervals upper limit	95% upper limit
18	CV ₁	98.66	97.53	92.04	103.03	FV ₁	68.57	72.63	56.13	89.12
25	CV ₃	98.59	93.34	84.67	102.01	FV ₃	87.60	78.91	68.36	89.45
37	CV ₇	72.2	77.83	69.22	86.45	FV ₇	84.14	86.94	76.49	97.39
45	CV ₁₁	70.14	68.94	61.82	76.05	FV ₁₁	80.76	90.72	80.62	10.82
52	CR ₁	69.9	65.35	60.14	70.55	FR ₁	99.93	93.24	84.07	102.42
63	CR ₃	64.22	63.68	58.14	69.21	FR ₃	100.27	96.08	87.68	104.47
75	CR ₅	62.78	63.37	57.28	69.45	FR ₅	95.10	98.06	78.97	108.14
94	CH	60.42	63.32	57.08	69.55	FH	100	99.77	84.91	114.64



نمودار ۱۴- تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز سویا
Determination of critical weed control period in soybean

در صورتی که هیچ کنترلی روی علف‌های هرز صورت نگیرد، عملکرد دانه ۵۱/۰۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و در نهایت بین تجمع ماده خشک علف‌های هرز و تجمع ماده خشک سویا، رابطه معکوس مشاهده می‌شود و با افزایش یکی دیگری کاهش می‌یابد و علف‌های هرز تاج خروس، گاوپنبه و تاج ریزی سه علف هرز غالب منطقه از نظر تجمع ماده خشک تعیین گردیده‌اند.

بنابراین حداکثر مجاز دوره رقابت علف‌های هرز مرحله V_3 تعیین شد. از مجموع مطالب بالا می‌توان دریافت که دوره بحرانی از مرحله V_3 شروع شده و در مرحله R_1 خاتمه می‌یابد یعنی دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در سویا در شرایط منطقه بین مرحله فنولوژیکی V_3 (ظهور سومین برگچه) تا R_1 (شروع گل دهی) است (شکل ۱۵).

References

منابع مورد استفاده

- راشد محصل، ح.، ح. رحیمیان و م. بنایان. ۱۳۷۲. علف‌های هرز و کنترل آن‌ها. ترجمه. انتشارات جهاد دانشگاهی فردوسی مشهد. ۵۷۵ صفحه.
- نصیری، محلاتی، م. ۱۳۸۲. مدلسازی رشد محصولات زراعی. انتشارات دانشگاه مشهد.
- هادیزاده، م. ح. ۱۳۷۵. دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در سویا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۰۴ صفحه.
- Duke, S. O. 1985.** Weed physiology. Vol. 1: Reproduction and ecophysiology. CRC press, Inc. Boca Raton, FL, U.S.A.
- Hagood, E. S., J., T. T. Bauman, J. L. Williams and M. M. Schreiber. 1980.** Growth analysis of soybeans (*Glycine max*) in competition with velvetleaf (*Abutilon theophrasti*). Weed Sci. 28: 729- 734.
- Hall, M. R., C. J. Swanton and G. W. Anderson. 1992.** The critical period of weed control in grain corn (*Zea mays*). Weed Sci. 40: 441-447.
- Harrison, S. K., and C. S. Williams. and L. W. Wax. 1985.** Interference and control of giant foxtail (*Setaria faberi L.*) in soybeans (*Glycine max*). Weed Sci. 33: 203- 208.
- Jackson, L. A, G. Kapusta, and D. J. S. Mason. 1985.** Effect of duration and type of natural weed infestation on soybean yield. Agron. J. 77: 725-729.
- Lindquist, J. L., D. A. Mortensen, P. Westra, et al. 1999.** Strability of corn (zea mays)- foxtail (setaria spp.) interference relationships. Weed Sci.H 7: 195-200.
- Martin, S. G., R. C. Van Acker. And L. F. Fviesen 2001.** critiacl Period of weed control in spring canola weed Sci 49: 326-333.
- Mones, D. W. and L. R. Oliver. 1998.** Interaction between soybean (*Glycine max*) cultivars and selected weeds. Weeds. 36: 770-774.
- Ross, S. J., 0. C. Burnside, J. E. Specht, and B. A. Swisher. 1983.** Competition and allelopathy between soybeans and weeds. Agron. J. 76: 523-528.
- Rushing, G.S. and L.R. Oliver. 1998.** Influence of planting date on common cocklebur (*Xanthium Strumarium*) interference in early-maturing soybean (*Glycine max*). Weed Sci. 46: 99-104.

- Sultan Ahrnad, M. A., M. A. Islam, and S. M. A. Hossein. 1987.** Critical period of weed competition in transplant rice. *Weed Abstr.* 36: P 326.
- Taylor, H. M. 1980.** Soybean growth and yield as affected by row spacing and by seasonal water supply. *Agron. J.* 72: 543-547.
- Van acker, R. C., C. J. Swanton, and S. F. Weise. 1993.** The critical period of weed control in soybean [*Glycine max* (L.) Merr]. *J. weed Sci.* 41: 194-200.
- Woolley, B. L., T. E. Michaels, M. R. Hall, and C. J. Swanton. 1993.** The critical period of weed control in white bean (*Phaseolus vulgaris*). *Weed , Sci.* 41: 180-184.
- Zimdahl, R. L. 1993.** Fundamentals of weed science. Acaemic Press, Inc. San 1. Diago, California. PP: 128.

Determining of critical period of weeds control in Soybean (*Glycine max* L.) in Sari region

Eftekhari¹, A. H. Shriani Rad², A. M. Rezai³, H. Salehian⁴, M. R. Ardakani⁵

ABSTRAC

In order to determine critical period of weeds control in soybean a field experiment was carried out in Agricultural research station, Dashtenaz, Sari in 2003 cropping season. The experimental design was a complete Randomized block with 3 replications with 16 treatments. The treatment were included different stages without weeds, weeds competition during different plant phenological stages. The control treatment were weeds free and with weeds competition during growing season. Among recognized weeds species, *Amaranthus retroflexus* and *Convolvulus arvensis* had the maximum and minimum dry matter, at the rate of 47.2% and 2.3%, respectively. Weeds dry matter also decreased significantly with increasing weeds free period. The weeds free period did not significantly affect on the stem nodules, seed dry weight and the number of grain per pods. The maximum number of pods per plant (85) was recorded in the control plot (weeds free). The minimum number of pods per plant (40) was recorded in the control plot (with weeds competition during growing season). The number of unfilled pods per plant, biological yield, seed yield and the number of sub branches per plant decreased significantly with increasing the period of weed interference. Therefore seed yield (570g/m²) in the control plot (weeds free) decreased (185g/m²) in the control plot (with weeds competition). It can be concluded that significant decrease in grain yield can be prevented by control of weeds between phenological stages V3 (25days after seeding) and R1 (52days after seeding). The trends of variation of seed yield in comparison to the controls, in this period (V3 to R1) showed that it has decreased from 99.3 % in FR1 80.76 % in FV11 treatment and from 98.59% in CV3 to 72.2% in CV7.

Key words: Weeds, Soybean, Critical period, Control, Interference.

Received: February, 2005

1- Lecturer, Azad University, Ghaemshahr, Iran (Corresponding author)

2- Assist. Prof. S. P. I. I., Karaj, Iran.

3- Prof. University of Esfahan, Iran.

4- Asssit. Prof, Azad University, Ghaemshahr, Iran.

5- Assist. Prof, Azad University, Karaj, Iran.