

ویژگی‌های فضای $C(X)$ با m - توپولوژی

سوسن افروز* و منیره پیمان

*دانشکده علوم پایه - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

گروه ریاضی - دانشگاه شهید چمران اهواز

پست الکترونیکی: safrooz@kmsu.ac.ir

چکیده

در این مقاله خواهیم دید که فضای $C(X)$ همراه با m - توپولوژی؛ یعنی $C_m(X)$ یک فضای هاسدروف و منظم است و نشان می‌دهیم که $C_m(X)$ شمارای نوع اول است اگر و تنها اگر فضای X شبه فشرده باشد. ثابت می‌کنیم که $C_m(X)$ بسیار دور از تقریباً P - فضا است و شبه فشرده نیست. همچنین مجموعه توابع مقسوم‌علیه صفر در $C_m(X)$ بسته است اگر و تنها اگر فضای X تقریباً P - فضا باشد. مجموعه عناصر یک $C_m(X)$ را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با کمک این مجموعه خواهیم دید که $C_m(X)$ هرگز ناهمبند شدید نمی‌باشد. سرانجام ثابت می‌کنیم که $C_\infty(X)$ در $C_m(X)$ بسته است و بستار $C_K(X)$ بر حسب ایدال‌های ماکسیمال $C(X)$ شناسایی می‌شود.

واژه‌های کلیدی: یکه مثبت، m - توپولوژی، تقریباً P - فضا، شمارای نوع اول، شبه فشرده، مقسوم‌علیه

صفر، $C_K(X)$ ، $C_\infty(X)$ ، ناهمبند شدید

۱- مقدمه

گردایه همه صفر - مجموعه‌های $Z(f)$ می‌گیریم که $f \in I$ در صورتی که $Z(f) \in Z[I]$ نتیجه بدهد $f \in I$ ، آن‌گاه I را یک Z - ایدال می‌نامیم. اگر $Z(f) = \emptyset$ ، آن‌گاه f را یکه می‌گوییم که در این صورت $\frac{1}{f}$ نیز تابعی پیوسته است. هرگاه هر G - مجموعه ناتهی در X دارای درون ناتهی باشد، فضای X تقریباً P - فضا نامیده می‌شود و در صورتی که هر G -

در این مقاله $C(X)$ ($C^*(X)$) حلقه توابع پیوسته و حقیقی (کراندار) روی فضای کاملاً منظم و هاسدروف X می‌باشد. آشکارا $C^*(X) \subseteq C(X)$ و هنگامی که این دو حلقه بر هم منطبق شوند، فضای X را شبه فشرده نامیم. برای هر $f \in C(X)$ ، مجموعه $Z(f) = \{x \in X : f(x) = 0\}$ را صفر - مجموعه f می‌گوییم و برای هر ایدال I در $C(X)$ ، $Z[I]$ را

مجموعه در فضای X باز باشد، فضا را P - فضا می‌گوییم. هنگامی که بستار هر مجموعه باز در X یک مجموعه باز باشد، فضای X را ناهمبند شدید می‌نامیم. مراجع [۱ و ۲] را برای آگاهی از ویژگی‌های بیش‌تر این مفاهیم ببینید.

ایدال I در $C(X)$ را آزاد گوییم، هرگاه $\bigcap_{f \in I} Z(f) = \emptyset$ و در غیر این صورت ثابت نامیده می‌شود. $C_k(X)$ از همه توابع $f \in C(X)$ تشکیل می‌شود که بستار $Z(f)$ در X فشرده باشد. $C_k(X)$ یک ایدال در $C(X)$ است و برابر با اشتراک همه ایدال‌های آزاد در $C(X)$ می‌باشد. همچنین $C_\infty(X)$ عبارت از گردایه توابع پیوسته چون f است که برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، مجموعه $\left\{x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}$ فشرده باشد. $C_\infty(X)$ در $C^*(X)$ یک ایدال است و برابر با اشتراک همه ایدال‌های ماکسیمال آزاد در $C^*(X)$ می‌باشد. آشکارا دیده می‌شود که $C_k(X) \subseteq C_\infty(X)$ ؛ برای آگاهی بیش‌تر در خصوص این دو ایدال، خواننده را به مراجع [۲ و ۳] ارجاع می‌دهیم.

برای هر $f \in C(X)$ و هر یک مثبت u در $C(X)$ ، تعریف می‌کنیم:

توپولوژی نسبی روی آن یکی است. $C^*(X)$ همراه با m - توپولوژی نسبی، یک حلقه توپولوژیکی است و این توپولوژی شامل توپولوژی نرم یکنواخت روی $C^*(X)$ است، مرجع [۲]، $2M$ را ببینید. در مرجع [۴] ثابت شده است که این دو توپولوژی روی $C^*(X)$ یکی است اگر و تنها اگر فضای X شبه فشرده باشد. از این پس فضای $C(X)$ همراه با m - توپولوژی را همان‌گونه که در مرجع [۵] نمایش داده شده با $C_m(X)$ نشان می‌دهیم.

همان‌گونه که از عنوان مقاله پیداست، هدف ما بررسی ویژگی‌های این فضا می‌باشد. تا حدود زیادی در برقراری ارتباط میان $C_m(X)$ و X موفق شده‌ایم و با مطالعه زیرمجموعه‌های خاصی از این فضا، از قبیل مجموعه یک‌ه‌های $C(X)$ و مجموعه مقسوم علیه‌های صفر $C(X)$ توانسته‌ایم برخی از ویژگی‌های $C_m(X)$ را آشکار کنیم.

۲- ویژگی‌های فضای $C_m(X)$

اگر چه معرفی این فضا در مرجع [۴] نخست به خاطر به دست آوردن بعضی از خواص $C(X)$ و ارتباط آن با توپولوژی‌های دیگر روی $C(X)$ بوده است، ولی بعدها این فضا خود مورد توجه بیش‌تری قرار گرفت و بسیاری از خواص این فضا توسط ریاضی‌دانان دیگر بررسی شد. مثلاً در مرجع [۵] نشان داده شده است که $C_m(X)$ هرگز فشرده موضعی نیست و چند ویژگی $C_m(X)$ با ویژگی‌های معادل آن در فضای X در مراجع [۵ و ۶] مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در مرجع [۷] انواع توابع کاردینالی در فضای $C_m(X)$ ، مانند چگالی، وزن و غیره در ارتباط با نظایر آن در فضای X مقایسه و ارزیابی شده است. نخستین پرسشی که در این فضا مطرح شد، شناسایی ایدال‌های بسته در این فضا بود که سال‌ها بعد به

ایدال I در $C(X)$ را آزاد گوییم، هرگاه $\bigcap_{f \in I} Z(f) = \emptyset$ و در غیر این صورت ثابت نامیده می‌شود. $C_k(X)$ از همه توابع $f \in C(X)$ تشکیل می‌شود که بستار $Z(f)$ در X فشرده باشد. $C_k(X)$ یک ایدال در $C(X)$ است و برابر با اشتراک همه ایدال‌های آزاد در $C(X)$ می‌باشد. همچنین $C_\infty(X)$ عبارت از گردایه توابع پیوسته چون f است که برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، مجموعه $\left\{x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n}\right\}$ فشرده باشد. $C_\infty(X)$ در $C^*(X)$ یک ایدال است و برابر با اشتراک همه ایدال‌های ماکسیمال آزاد در $C^*(X)$ می‌باشد. آشکارا دیده می‌شود که $C_k(X) \subseteq C_\infty(X)$ ؛ برای آگاهی بیش‌تر در خصوص این دو ایدال، خواننده را به مراجع [۲ و ۳] ارجاع می‌دهیم.

برای هر $f \in C(X)$ و هر یک مثبت u در $C(X)$ ، تعریف می‌کنیم:

$$N_u(f) = \{g \in C(X) : |f - g| < u\}.$$

گردایه متشکل از عناصر $N_u(f)$ که $f \in C(X)$ و u یک مثبت در $C(X)$ است، یک پایه برای یک توپولوژی روی $C(X)$ خواهد بود. این توپولوژی را m - توپولوژی روی $C(X)$ می‌نامیم. در صورتی که یک مثبت u را کراندار فرض کنیم، آن‌گاه توپولوژی مشابه‌ای را می‌توان روی $C^*(X)$ نیز تعریف کرد. بدیهی است m - توپولوژی روی $C^*(X)$ با m -

مثبت Ψ را در $C(X)$ چنان می‌یابیم که $N_\Psi(\circ)$ شامل هیچ یک از عناصر خانواده $\{N_{\pi_n}(\circ)\}_{n \in \mathbb{N}}$ نباشد. برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، قرار می‌دهیم $b_n = \frac{1}{\pi_n(x_n)}$. بدیهی است $\sigma \in C(\mathbb{R})$ وجود دارد به طوری که برای هر $x > 0$ ، $\sigma(x) > 0$ ، و برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، $\sigma(a_n) = \frac{1}{b_n}$. حال قرار می‌دهیم $\Psi = \frac{1}{\sigma \circ g}$. در این صورت Ψ در $C(X)$ یکه مثبت می‌باشد و برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، داریم:

$$\Psi(x_n) = \frac{1}{\sigma(g(x_n))} = \frac{1}{\sigma(a_n)} = b_n \leq \frac{1}{\pi_n(x_n)}$$

در نتیجه $N_\Psi(\circ)$ شامل هیچ یک از $N_{\pi_n}(\circ)$ ها نیست؛ یعنی $C(X)$ در $f \equiv 0$ دارای یک پایه‌ی باز شمارا نیست. به این ترتیب $C_m(X)$ یک فضای شمارای نوع اول نخواهد بود. به عکس، اگر X شبه فشرده باشد، آن‌گاه m -توپولوژی روی $C(X)$ همان توپولوژی نرم یکنواخت است و به این ترتیب فضا متریک است و در نتیجه شمارای نوع اول می‌باشد. ■

لازم به ذکر است که در هر حلقه‌ی توپولوژیکی (گروه توپولوژیکی) بین همسایگی‌های هر دو نقطه یک تناظر دوسویی و حافظ شمول وجود دارد. بنابراین قضیه‌ی فوق نشان می‌دهد که اگر X شبه فشرده نباشد، آن‌گاه هیچ نقطه‌ای از آن دارای پایه باز شمارا نیست.

قبل از این که به قضیه‌ی بعدی پردازیم، از این پس برای سادگی، بستار و درون یک مجموعه A در فضای $C_m(X)$ را به ترتیب با $cl_m A$ و $int_m A$ نشان می‌دهیم.

۲-۲ قضیه: $C_m(X)$ یک فضای هاسدروف و منظم است.

دو روش مختلف در مراجع [۸ و ۹] انجام شد. در واقع بستار یک ایدال I در $C_m(X)$ چیزی جز اشتراک همه‌ی ایدال‌های ماکسیمال شامل I نیست و به این ترتیب یک ایدال در $C_m(X)$ بسته است اگر و تنها اگر به صورت اشتراک ایدال‌های ماکسیمال باشد. مسلماً با شناخت بیش‌تر ویژگی‌های این فضا می‌توان بهتر به واقعیت‌های موجود در این فضا و همچنین در حلقه‌ی توابع پیوسته حقیقی روی این فضا پی برد. در این بخش نشان می‌دهیم فضای X شبه فشرده است اگر و تنها اگر $C_m(X)$ شمارای نوع اول باشد. علاوه بر آن در این بخش می‌بینیم که این فضا هرگز شبه فشرده و P -فضا نمی‌باشد.

۲-۱ قضیه: فضای $C_m(X)$ شمارای نوع اول است اگر و تنها اگر فضای X شبه فشرده باشد.

اثبات: ابتدا نشان می‌دهیم که اگر X شبه فشرده نباشد، آن‌گاه $C(X)$ شمارای نوع اول نیست. برای این منظور، تابع ثابت صفر را در $C(X)$ در نظر می‌گیریم و نشان می‌دهیم برای هر خانواده‌ی شما را از همسایگی‌های باز تابع ثابت صفر در $C_m(X)$ ، یک همسایگی باز از این تابع وجود دارد که شامل هیچ یک از عناصر این خانواده نیست. چون X شبه فشرده نیست، یک تابع بی‌کران f در $C(X)$ وجود دارد. در نتیجه $g = f^2 + 1$ یکه مثبت بی‌کران در $C(X)$ است. پس دنباله‌ی اکیداً صعودی

$$\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ از اعداد حقیقی مثبت و همچنین دنباله‌ی } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ در } X \text{ وجود دارد به طوری که } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty \text{ و برای هر } n=1,2,3,\dots \text{ } g(x_n) = a_n$$

حال فرض کنیم $\{N_{\pi_n}(\circ)\}_{n \in \mathbb{N}}$ خانواده‌ای شمارش پذیر و دلخواه از همسایگی‌های باز شامل تابع ثابت صفر است که در آن هر π_n تابع یکه مثبت می‌باشد. اکنون یکه

منفرد است بلکه حتی شامل تقریباً P - نقطه هم نیست و بنابراین فضای $C_m(X)$ بسیار دور از تقریباً P - فضا می‌باشد.

۲-۳ قضیه: هیچ نقطه از $C_m(X)$ ، تقریباً P - نقطه نیست.

اثبات: فرض کنیم $f \in C(X)$ و برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، تابع

ثابت u_n را که برای هر $x \in X$ به صورت $u_n(x) = \frac{1}{n}$

تعریف می‌شود، در نظر می‌گیریم. نشان می‌دهیم

$\bigcap_{n=1}^{\infty} N_{u_n}(f) = \{f\}$ چون برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم،

$f \in N_{u_n}(f)$ پس $\{f\} \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} N_{u_n}(f)$ اکنون

فرض کنیم $g \in \bigcap_{n=1}^{\infty} N_{u_n}(f)$ و $f \neq g$ در نتیجه

$x_0 \in X$ وجود دارد که $f(x_0) \neq g(x_0)$ علاوه بر این

برای هر $n \in \mathbb{N}$ و هر $x \in X$ داریم

$|f(x) - g(x)| < u_n(x)$ پس برای هر $n \in \mathbb{N}$

$|f(x_0) - g(x_0)| < \frac{1}{n}$ یعنی $f(x_0) = g(x_0)$ که یک

تناقض است و در نتیجه $\bigcap_{n=1}^{\infty} N_{u_n}(f) = \{f\}$ اکنون نشان

می‌دهیم $\{f\}$ باز نیست. برای این منظور، کافی است

نشان دهیم برای هر یک مثبت u ، $N_u(f) \neq \{f\}$ چون

$\left| f - \left(\frac{u}{2} + f \right) \right| = \frac{u}{2} < u$ پس $\frac{u}{2} + f \in N_u(f)$ و

بنابراین $N_u(f) \neq \{f\}$ ؛ یعنی $\{f\}$ در $C_m(X)$ باز

نیست. در نتیجه $\text{int}_m \{f\} = \emptyset$ اما از آن جا که

$\bigcap_{n=1}^{\infty} N_{u_n}(f)$ اشتراک شمارایی از مجموعه‌های باز در

فضای $C_m(X)$ می‌باشد، یک G_δ - مجموعه است. پس

G_δ - مجموعه $\{f\}$ که شامل f می‌باشد، درون تهی

است. به این ترتیب f یک تقریباً P - نقطه نخواهد بود. ■

اثبات: گیریم $f, g \in C(X)$ و $f \neq g$. پس $x_0 \in X$

وجود دارد که $f(x_0) \neq g(x_0)$ اکنون یک مثبت u را

در $C(X)$ چنان در نظر می‌گیریم که

$u(x_0) = \frac{1}{2} |f(x_0) - g(x_0)|$ و نشان می‌دهیم

$N_u(f) \cap N_u(g) = \emptyset$ برای این منظور، فرض

کنیم $h \in N_u(f) \cap N_u(g)$ در این صورت،

$|f - h| < u$ و $|g - h| < u$ و بنابراین $|f - g| < 2u$.

پس $|f(x_0) - g(x_0)| < 2u(x_0) = |f(x_0) - g(x_0)|$

و این یک تناقض است. در نتیجه مجموعه‌های باز و

مجزای $N_u(f)$ و $N_u(g)$ به ترتیب شامل f و g

وجود دارد؛ یعنی $C_m(X)$ یک فضای هاسدروف است.

برای این که نشان دهیم $C_m(X)$ منظم است،

فرض کنیم G یک مجموعه باز در $C_m(X)$ است و

$f \in G$ پس یک مثبت u در $C(X)$ وجود دارد که

$N_u(f) \subseteq G$ اکنون نشان می‌دهیم

$cl_m(N_{\frac{u}{2}}(f)) \subseteq N_{\frac{u}{2}}(f)$ برای این منظور، فرض

می‌کنیم $g \in cl_m(N_{\frac{u}{2}}(f))$ پس

$N_{\frac{u}{2}}(g) \cap N_{\frac{u}{2}}(f) \neq \emptyset$ اگر تابع h را متعلق به این

اشتراک ناتهی در نظر بگیریم، آن‌گاه خواهیم داشت

$|h - f| < \frac{u}{2}$ ، $|g - h| < \frac{u}{2}$ و در نتیجه

$|g - f| < u$ یعنی $g \in N_u(f)$ به این ترتیب

$f \in N_{\frac{u}{2}}(f) \subseteq cl_m(N_{\frac{u}{2}}(f)) \subseteq G$

■ $C_m(X)$ منظم است.

گرچه $C_m(X)$ فاقد بعضی از ویژگی‌های

توپولوژیکی است ولی آن هم خود از ویژگی‌های

$C_m(X)$ محسوب می‌شود. در این قسمت نشان

می‌دهیم $C_m(X)$ هیچ‌گاه شبه‌فشرده نیست. همچنین

مشاهده خواهیم کرد که $C_m(X)$ نه تنها فاقد نقطه

در $C(\mathbb{R})$ که یک Z -ایدال است و به سادگی دیده می‌شود که بسته نیست. از آنجا که عناصر یکه در ایدال‌های $C(X)$ وجود ندارند، درون هر ایدال سره از $C_m(X)$ تهی است. زیرا اگر I یک ایدال سره در $C_m(X)$ باشد و $f \in \text{int}_m I$ ، آن‌گاه بایستی یکه مثبت u وجود داشته باشد که $N_u(f) \subseteq \text{int}_m I \subseteq I$. اما $f + \frac{u}{2} \in N_u(f) \subseteq I$ که $u \in I$ و این تناقض است. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ ایدال سره‌ای از $C_m(X)$ باز نیست. در این بخش وضعیت برخی از زیرمجموعه‌های مهم $C_m(X)$ را به لحاظ بسته، باز و چگال بودن بررسی خواهیم کرد. بستار بعضی از ایدال‌های $C_m(X)$ مانند $C_k(X)$ را شناسایی می‌کنیم و سرانجام نشان می‌دهیم $C_m(X)$ هرگز ناهمبند شدید نیست.

۳-۱ گزاره: $C^*(X)$ در $C_m(X)$ هم باز و هم بسته است.

اثبات: فرض می‌کنیم $f \in C_m(X)$ نقطه حدی $C^*(X)$ باشد. همسایگی $N_1(f)$ را برای f در $C_m(X)$ در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم $h \in N_1(f) \cap C^*(X)$. در این صورت $|f - h| \leq 1$ نتیجه می‌دهد که $|h| + 1 \leq |f|$ و بنابراین $f \in C^*(X)$ ؛ یعنی $C^*(X)$ در $C_m(X)$ بسته است. اکنون فرض می‌کنیم $f \in C^*(X)$ و یکه $u = 1$ را در نظر می‌گیریم. در این صورت $N_1(f) \subseteq C^*(X)$ ، چرا که اگر $g \in N_1(f)$ ، آن‌گاه $|f| + 1 \leq |g|$ نتیجه می‌دهد g کراندار است و بنابراین $C^*(X)$ باز نیز هست. ■

۳-۲ نتیجه: اگر X شبه‌فشرده نباشد، آن‌گاه $C_m(X)$ ناهمبند است. ■

۲-۴ نتیجه: فضای $C_m(X)$ بسیار دور از تقریباً P -فضا و در نتیجه بسیار دور از P -فضا است. ■

۲-۵ قضیه: $C_m(X)$ هرگز یک فضای شبه فشرده نخواهد بود و از این رو $C_m(X)$ هرگز شمارا فشرده نیست.

اثبات: فرض کنیم $x_0 \in X$. تابع $\varphi: C_m(X) \rightarrow \mathbb{R}$ که برای هر $f \in C(X)$ به صورت $\varphi(f) = f(x_0)$ ، تعریف شده در نظر می‌گیریم. نشان می‌دهیم $\varphi \in C(C_m(X))$. برای این منظور، فرض کنیم $\varepsilon > 0$ و $g \in N_\varepsilon(f)$ در این صورت،

$$|g(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$$

و در نتیجه $\varphi(g) \in (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ ؛ یعنی $\varphi(N_\varepsilon(f)) \subseteq (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ و بنابراین φ پیوسته است. اکنون نشان می‌دهیم φ کراندار نیست. برای این منظور، دنباله یکه‌های ثابت $\{u_n\}$ ، که برای هر $x \in X$ به صورت $u_n(x) = n$ تعریف شده‌اند را در نظر می‌گیریم. چون برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، $\varphi(u_n) = u_n(x_0) = n$ پس φ کراندار نیست و در نتیجه $C_m(X)$ شبه‌فشرده نخواهد بود. به طور مشابه، می‌توان دید که فضای $C^*(X)$ با m -توپولوژی نیز شبه‌فشرده نیست. ■

۳-۲ زیرمجموعه‌های باز، بسته و چگال در $C_m(X)$

در هر فضای توپولوژی شناسایی مجموعه‌های باز، بسته و چگال اهمیت دارد. بسیاری از ایدال‌ها در $C_m(X)$ بسته‌اند. در واقع بستار یک ایدال در $C_m(X)$ عبارت است از اشتراک ایدال‌های ماکسیمال شامل آن و بنابراین یک Z -ایدال است، مرجع [۲]، $\forall P$ و مراجع [۸] و [۹] را ببینید. ولی هر Z -ایدالی در $C_m(X)$ لزوماً بسته نیست، مانند $O_0 = \{f \in C(\mathbb{R}) : 0 \in \text{int}_{\mathbb{R}} Z(f)\}$

از زیرمجموعه‌های مهم دیگر $C_m(X)$ ، مجموعه اعداد حقیقی \mathbb{R} ، مجموعه D متشکل از عناصر مقسوم علیه صفر و مجموعه U شامل عناصر یکه است. به سادگی دیده می‌شود که \mathbb{R} زیر فضای گسسته $C_m(X)$ است. نشان می‌دهیم U در $C_m(X)$ باز است و $cl_m D = C_m(X) \setminus U$ ، سپس با استفاده از این واقعیت‌ها، خواهیم دید که بسته بودن مجموعه عناصر مقسوم علیه صفر در $C_m(X)$ معادل است با این که X یک تقریباً P -فضا باشد.

۳-۳ گزاره: مجموعه U در $C_m(X)$ باز است.

اثبات: اگر $u \in U$ ، آن‌گاه یکه مثبت $\pi = \frac{|u|}{2}$ را در نظر می‌گیریم. در این صورت $N_\pi(u) \subseteq U$ ، زیرا اگر $f \in N_\pi(u)$ ، آن‌گاه $|f - u| < \frac{|u|}{2}$ نشان می‌دهد که $Z(f) = \emptyset$ ؛ یعنی f یکه است. ■

۳-۴ قضیه: $cl_m D = C_m(X) \setminus U$.

اثبات: از آن‌جا که بنا به گزاره ۳-۳، U باز است، پس $C_m(X) \setminus U$ بسته می‌باشد و بنابراین $cl_m D \subseteq C_m(X) \setminus U$. اکنون فرض می‌کنیم $f \in C_m(X) \setminus U$ یک مثبت باشد. نشان می‌دهیم $N_\pi(f) \cap D \neq \emptyset$. تابع h را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) + \frac{\pi(x)}{2} & , f(x) \leq -\frac{\pi(x)}{2} \\ 0 & , |f(x)| \leq \frac{\pi(x)}{2} \\ f(x) - \frac{\pi(x)}{2} & , f(x) \geq \frac{\pi(x)}{2} \end{cases}$$

آشکار است که $h \in C(X)$ و $|f - h| < \pi$ ؛ یعنی $h \in N_\pi(f)$ از طرفی مجموعه

۳-۵ نتیجه: D در $C_m(X)$ بسته است اگر و تنها اگر X یک تقریباً P -فضا باشد. ■

در صورتی که فضای X یک P -فضا باشد، آن‌گاه مجموعه عناصر یکه $C(X)$ نقش پررنگ‌تری در $C_m(X)$ دارد.

۳-۶ قضیه: اگر X یک P -فضا باشد، آن‌گاه مجموعه U در $C_m(X)$ چگال است. اثبات: فرض کنیم $f \in C(X)$ و π یکه مثبت در $C(X)$ باشد. تعریف می‌کنیم:

$$u(x) = \begin{cases} f(x) + \frac{\pi(x)}{2} & , f(x) \geq 0 \\ f(x) - \frac{\pi(x)}{2} & , f(x) < 0 \end{cases}$$

چون X یک P -فضاست، صفر-مجموعه $\{x \in X : f(x) \geq 0\}$ در X باز است، در نتیجه هر دو مجموعه $E = \{x \in X : f(x) \geq 0\}$ و $F = \{x \in X : f(x) < 0\}$ در X باز و بسته خواهند بود و از آن‌جا که $u|_E$ و $u|_F$ پیوسته می‌باشند، روی X پیوسته است. علاوه بر این $|f - u| < \pi$ ؛ یعنی $u \in N_\pi(f)$ و بنابراین $u \in U \cap N_\pi(f) \neq \emptyset$ ؛ یعنی $u \in U \cap N_\pi(f)$ در نتیجه $f \in cl_m U$. ■

(۲) با استفاده از قسمت (۱)، اثبات آشکار است.

(۳) فرض می‌کنیم $u \in U^+$ ، نشان می‌دهیم

$N_{\frac{u}{2}}(u) \subseteq U^+$. اگر $f \in N_{\frac{u}{2}}(u)$ ، آن‌گاه

$|f - u| < \frac{u}{2}$ در این صورت $Z(f) = \emptyset$ ، زیرا اگر

$x_0 \in Z(f)$ ، آن‌گاه $u(x_0) < \frac{u(x_0)}{2}$ که غیرممکن

می‌باشد، پس f یکه است. اکنون نشان می‌دهیم $f > 0$.

اگر $x_0 \in X$ و $f(x_0) < 0$ ، آن‌گاه

$|f(x_0) - u| < \frac{u}{2}$ که باز هم تناقض است و به این

ترتیب $f \in U^+$ برای این که نشان دهیم $C^+(X)$ باز

نیست، $f \in C^+(X)$ را به گونه‌ای در نظر می‌گیریم

که $Z(f) \neq \emptyset$. اگر π یکه مثبت باشد، آن‌گاه

$f - \frac{\pi}{2} \in N_{\pi}(f)$ ولی $f - \frac{\pi}{2} \notin C^+(X)$ ، چرا که اگر

$x \in Z(f)$ ، آن‌گاه $f(x) - \frac{\pi(x)}{2} < 0$ این نشان

می‌دهد که $cl_m U^+ = C^+(X)$ باز نیست. ■

با استفاده قسمت‌های (۱) و (۳) در قضیه ۳-۷،

نتیجه زیر آشکار است.

۳-۸ نتیجه: $C_m(X)$ ناهمبند شدید نیست. ■

از آن‌جا که $C_{\infty}(X)$ برابر با اشتراک ایدال‌های ماکسیمال

آزاد در $C^*(X)$ است، مطابق ۶A در [۲]، $C_{\infty}(X)$ در

$C^*(X)$ با توپولوژی نرم یکنواخت بسته است. همچنین

مطابق ۷P در [۲]، ایدال‌های بسته در $C^*(X)$ با m -

توپولوژی برابر با اشتراک ایدال‌های ماکسیمال در

$C^*(X)$ است اگر و تنها اگر X شبه فشرده باشد. ولی

$C_{\infty}(X)$ ، حتی اگر X شبه فشرده نباشد، در $C_m(X)$

بسته است.

۳-۹ قضیه: $C_{\infty}(X)$ در $C_m(X)$ بسته است.

اگر U^+ و U^- را به ترتیب مجموعه عناصر

یکه مثبت و منفی در نظر بگیریم، آن‌گاه بستر این

مجموعه‌ها نیز به لحاظ نتایج حاصل از آن اهمیت دارد.

در قضیه زیر مجموعه $C^+(X)$ و $C^-(X)$ را به ترتیب

مجموعه توابع پیوسته نامنفی و نامثبت می‌گیریم.

۳-۷ قضیه: گزاره‌های زیر برقرار هستند.

$$1- \quad cl_m U^+ = C^+(X) \quad \text{و} \quad cl_m U^- = C^-(X)$$

$$2- \quad C^+(X) \cup C^-(X) \subseteq cl_m U$$

۳- $C^+(X)$ در $C_m(X)$ باز نیست ولی U^+ در

$C_m(X)$ باز است.

اثبات: (۱) فرض کنیم $f \in C^+(X)$ و $u \in U^+$ در

این صورت $f + \frac{u}{2} \in U^+$ و از آن‌جا که

$$\left| f - \left(f + \frac{u}{2} \right) \right| = \frac{u}{2} < u$$

$$f + \frac{u}{2} \in N_u(f).$$

در نتیجه $f + \frac{u}{2} \in U^+ \cap N_u(f)$ ؛ یعنی

$$U^+ \cap N_u(f) \neq \emptyset \quad \text{و بنابراین} \quad f \in cl_m U^+.$$

حال اگر $g \in C(X)$ و

$x_0 \in X$ موجود باشد به طوری که $g(x_0) < 0$ و قرار

دهیم $r_0 = \frac{1}{2} |g(x_0)|$ ، آن‌گاه تابع ثابت r_0 یکه مثبت در

$C(X)$ است؛ یعنی $r_0 \in U^+$ و به علاوه

$$N_{r_0}(g) \cap U^+ = \emptyset$$

در این صورت $u \in N_{r_0}(g) \cap U^+$

$$r_0 > r_0 \geq |g(x_0) - u(x_0)| \geq |g(x_0)| \quad \text{؛ یعنی}$$

$u \notin N_{r_0}(g)$ که یک تناقض است. در نتیجه

$$N_{r_0}(g) \cap U^+ = \emptyset \quad \text{و بنابراین} \quad g \notin cl_m U^+ \quad \text{؛ یعنی}$$

$$cl_m U^+ = C^+(X)$$

$$. \quad cl_m U^- = C^-(X)$$

برای این منظور تابع $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ را به شرح زیر تعریف می‌کنیم:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + \frac{u(x)}{2} & , f(x) \leq -\frac{u(x)}{2} \\ 0 & , |f(x)| \leq \frac{u(x)}{2} \\ f(x) - \frac{u(x)}{2} & , f(x) \geq \frac{u(x)}{2} \end{cases}$$

پیداست که $g \in C(X)$ و

$$H = \left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{u(x)}{2} \right\}$$

یک صفر-مجموعه در X است. قرار می‌دهیم

$H = Z(h)$ که $h \in C(X)$ و نشان می‌دهیم

$Z(f) \subseteq X \setminus Z(h) \subseteq Z(g)$ برای این منظور،

فرض می‌کنیم $f(x) = 0$ ، در نتیجه $x \notin H$ و بنابراین

$x \in X \setminus Z(h)$ همچنین اگر $x \in X \setminus Z(h)$ ، آن‌گاه

$|f(x)| < \frac{u(x)}{2}$ و بنابراین $x \in Z(g)$. اکنون بنابر

۷.۱۴ در [۲]، $cl_{\beta X} Z(g)$ یک هم‌سایگی از

$cl_{\beta X} Z(f)$ است و از این رو داریم

$\beta X \setminus X \subseteq cl_{\beta X} Z(f) \subseteq int_{\beta X} cl_{\beta X} Z(g)$ در نتیجه

$g \in \bigcap_{p \in \beta X \setminus X} O^p = C_k(X)$ برای هر

$x \in X$ ، $|f(x) - g(x)| < u(x)$ ؛ یعنی

$|f - g| < u$. پس $g \in N_u(f)$ و بنابراین

$$\blacksquare . g \in N_u(f) \cap C_k(X)$$

تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از آقای

دکتر فریبرز آذرپناه برای راهنمایی‌های ارزشمندشان در

مورد محتوی این مقاله ابراز می‌دارند.

اثبات: فرض می‌کنیم $f \in cl_m C_\infty(X)$ ، نشان می‌دهیم

برای هر $n \in \mathbb{N}$ ، مجموعه $\left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n} \right\}$

X فشرده است. بنا به فرض، برای هر $n \in \mathbb{N}$ داریم

$N_{\frac{1}{2n}}(f) \cap C_\infty(X) \neq \emptyset$. اگر $N_{\frac{1}{2n}}(f) \cap C_\infty(X) \neq \emptyset$

آن‌گاه $|f - g| < \frac{1}{2n}$ و مجموعه

$\left\{ x \in X : |g(x)| \geq \frac{1}{2n} \right\}$ در X فشرده است. پس

$|g| \geq |f| - \frac{1}{2n}$ و بنابراین

$\left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n} \right\} \subseteq \left\{ x \in X : |g(x)| \geq \frac{1}{2n} \right\}$.

در نتیجه مجموعه $\left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n} \right\}$ نیز در X

فشرده است و از این رو $f \in C_\infty(X)$. \blacksquare

۳-۱۰ نتیجه: $cl_m C_k(X) \subseteq C_\infty(X)$.

اثبات: چون $C_k(X) \subseteq C_\infty(X)$ و $C_\infty(X)$ بسته

است، نتیجه مطلوب آشکار است. \blacksquare

اکنون بستار $C_k(X)$ را در $C_m(X)$ به

صورت اشتراک ایدآل‌های ماکسیمال شناسایی می‌کنیم.

۳-۱۱ قضیه: $cl_m(C_k(X)) = \bigcap_{p \in \beta X \setminus X} M^p$

اثبات: بنابر 7E در [۲]، داریم $C_k(X) = \bigcap_{p \in \beta X \setminus X} O^p$

پس $C_k(X) \subseteq \bigcap_{p \in \beta X \setminus X} M^p$ از آن‌جا که هر ایدآل

ماکسیمال بسته و در نتیجه اشتراک ایدآل‌های ماکسیمال

بسته است، از این رو،

$cl_m C_k(X) \subseteq \bigcap_{p \in \beta X \setminus X} M^p$

اکنون فرض کنیم $f \in \bigcap_{p \in \beta X \setminus X} M^p$ ؛ یعنی

$\beta X \setminus X \subseteq cl_{\beta X} Z(f)$ برای هر یک مثبت u در

$C(X)$ ، باید نشان دهیم $N_u(f) \cap C_k(X) \neq \emptyset$.

مراجع

- [6] Van Douwen, E., Nonnormality or hereditary paracompactness of some spaces of real functions, *Topology Appl.* 39, 1 (1991) 3-32.
- [7] DiMaio, G., Holá, L., Holý, D. and Macoy, R.A., Topologies on the space of continuous functions, *Topology Apply.*, 86, 2 (1998) 105-122.
- [8] Gillman, L., Henriksen, M. and Jerison, M., On a theorem of Gelfand and Kolmogoroff concerning maximal ideals in rings of continuous functions, *Proc. Amer. Math. Soc.*, 5, 3 (1954) 447-455.
- [9] Shirota, T., On ideals in rings of continuous functions, *Proc. Japan. Acad.*, 30 (1954) 85-89.
- [10] Willard, S., *General Topology*, Addison wesley, Reading Mass., (1970).
- [1] Azarpanah, F., On almost P -space, *Far East J. Math. Sci. (FJMS)*, Special Volume Part I (Geometry and Topology), (2000) 121-132.
- [2] Gillman, L. and Jerison, M., *Rings of continuous function*, Springer-Verlag, (1976).
- [3] Azarpanah, F. and Sondararajan, T., when the family of functions vanishing at infinity is an ideal of $C(X)$, *Rocky Mountain J. Math.* 31, 4 (2001) 1133-1140.
- [4] Hewitt, E., Rings of real-valued continuous function I, *Tranc. Amer. Math. Soc.*, 64 (1948) 45-99.
- [5] Gomez-perez, J. and McGovern, W.W., The m -topology on $C_m(X)$ revisited, *Topology Appl.*, 153 (2006) 1838-1848.