



## تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس $^{67}\text{Ga}$ -Oxine برای نشان‌داری سلول‌های سفید خون

امیررضا جلیلیان<sup>۱\*</sup>، آریندخت وکیلی<sup>۲</sup>، سونا نظری<sup>۲</sup>، فاطمه بلوری‌نوبین<sup>۱</sup>، سعید رجیبی‌فر<sup>۱</sup>

۱- پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۳۱۴۸۵-۴۹۸، کرج- ایران  
۲- دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: ۱۴۵۱۵-۷۷۵، تهران- ایران

**چکیده:** هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تهیه‌ی کمپلکس  $^{67}\text{Ga}$ -oxine برای مقاصد نشان‌داری گلبول‌های سفید خون می‌باشد.  $^{67}\text{Ga}$  تولید شده در سیکلوترون (۳۰ MeV) پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج از طریق بمباران پروتونی هدف روی غنی شده و با استفاده از واکنش  $^{68}\text{Zn}(p,2n)^{67}\text{Ga}$  به شکل  $^{67}\text{GaCl}_3$  در شرایط بهینه برای تهیه‌ی کمپلکس  $^{67}\text{Ga}$ -oxine به کار گرفته شد. مخلوطی از  $^{67}\text{GaCl}_3$  با فعالیت  $200\mu\text{Ci}$  و  $100\mu\text{l}$  از محلول اتانولی اکسین  $1\text{mg/ml}$  تبخیر شده و در مجاورت بافر استات با  $\text{pH}=5.5$  به مدت ۱ ساعت در دمای  $25^\circ\text{C}$  واکنش داده شد. ITLC<sup>(۱)</sup> با فاز متحرک آمونیم استات  $10\%+$  متانول (۱:۱) و کاغذ واتمن انجام و فعالیت با استفاده از دستگاه RTLC scanner (AR-2000) با هدف کنترل کیفی خوانده شد. در این شرایط خلوص رادیوشیمیایی  $95.18\%$  و فعالیت ویژه  $1432\text{GBq/mmol}$  حاصل شد. سپس تخلیص گلبول‌های سفید خون تازه تهیه شده از داوطلبان انسانی و نشان‌داری آن در دمای  $37^\circ\text{C}$  درجه انجام شد.  $^{67}\text{Ga}$ -oxine به دلیل چربی دوستی و گسیل پرتوهای گاما مناسب می‌تواند ماده‌ای ارزان و قابل دسترس برای مقاصد نشان‌داری سلول‌های خونی، بنیادین و هم‌چنین موجودات ذره‌بینی باشد.

**واژه‌های کلیدی:** گالیوم-۶۷، کمپلکس اکسینات، بهینه‌سازی، نشان‌داری سلولی

## Optimization of [ $^{67}\text{Ga}$ ]-Oxinate Complex Formation Conditions for white Blood Cell Labeling

A.R. Jalilian<sup>1\*</sup>, A. Vakili<sup>2</sup>, S. Nazari<sup>2</sup>, F. Bolourinovin<sup>1</sup>, S. Rajabifar<sup>1</sup>

1- Agricultural Medical and Industrial Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOL, P.O. Box: 31485-498, Karaj-Iran  
2- Department of Engineering and Technology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, P.O. Box: 14515-775, Tehran-Iran

**Abstract:** In this work, the effective factors on the preparation of  $^{67}\text{Ga}$ -oxinate complex for white blood cell labeling were determined. Gallium-67 was produced at AMIRS 30MeV cyclotron via  $^{68}\text{Zn}(p,2n)^{67}\text{Ga}$  reaction in the form of  $^{67}\text{GaCl}_3$ , and was used for radiolabeling of oxinate complex at optimized conditions. A mixture of  $^{67}\text{GaCl}_3$  (3uL, 200uCi) and ethanolic oxine solution (1mg/ml, 100uL) was evaporated and reacted at  $25^\circ\text{C}$  for 1 h in the presence of NaOAc solution (pH. 5.5). ITLC was performed using a mixture of ammonium acetate and methanol solution (1:1) followed by recording the activity using radio thin layer chromatography scanner. The radiochemical purity of 95.18% at these conditions was obtained (specific activity of 1432 GBq/mmol). Freshly prepared white blood cells were separated from human volunteers and used for labeling by the above mentioned complex at  $37^\circ\text{C}$ .  $^{67}\text{Ga}$ -oxinate complex due to its lipophilicity and suitable gamma rays is a suitable cell labeling agent and available for blood stem cell and microorganism studies.

**Keywords:** Gallium-67, Oxinate Complex, Optimization, Cell Labeling

\*email: [ajalilian@nrcam.org](mailto:ajalilian@nrcam.org)




## ۱- مقدمه


در بین مواد پرتوزای مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای برای تصویربرداری از تومور،  $^{67}\text{Ga}$  به علت دارا بودن خصوصیات ارزشمند بالینی استفاده‌ی گسترده‌ای پیدا کرده است. سینتی گرافی با  $^{67}\text{Ga}$  جهت مشخص نمودن مواضع توموری در بدن قدمت تقریباً ۳۰ ساله در پزشکی هسته‌ای تشخیصی دارد [۱].

رادیونوکلید  $^{67}\text{Ga}$  نوکلیدی با نیم-عمر ۷۸٫۲۶ ساعت است که در الگوی واپاشی خود دارای پنج حالت گیراندازی الکترون می‌باشد و گاماهاهایی با انرژی ۹۳٫۳، ۱۸۴، ۳۰۰، ۳۹۳keV گسیل می‌کند. روش‌های مختلفی برای تولید  $^{67}\text{Ga}$  در شتاب‌دهنده‌های ذرات باردار مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش‌ها هدف‌هایی مانند  $^{65}\text{Cu}$ ،  $^{68}\text{Zn}$  و  $^{69}\text{Zn}$  توسط ذرات باردار چون پروتون، دوترون، ذرات  $\alpha$  و He تا انرژی‌های حدود ۷۰MeV بمباران می‌شوند. جداسازی محصولات تولید شده به صورت عمده با روش‌هایی مثل تعویض یونی انجام می‌گیرد [۲ و ۳]. دو روش عمده‌ی زیر برای تولید رادیونوکلید  $^{67}\text{Ga}$  استفاده می‌شود [۴].

- بمباران پروتونی هدف روی غنی شده



- بمباران هدف‌های مس طبیعی با ذرات آلفا



تولید رادیونوکلید  $^{67}\text{Ga}$  از طریق بمباران پروتونی روی غنی شده توسط سیکلوترون ۳۰MeV پژوهشکده کرج انجام می‌گیرد. دو رادیوایزوتوپ دیگر گالیم،  $^{68}\text{Ga}$  و  $^{66}\text{Ga}$  که هر دو پوزیترون گسیل هستند، قبلاً تهیه شده‌اند و با استفاده از  $^{68}\text{Ga}$ -هیدروکسی کینولین (اکسین) در نشان‌دارسازی گلوبول‌های خون مورد استفاده قرار گرفته‌اند.  $^{68}\text{Ga}$  دارای خواص فیزیکی بهتری نسبت به  $^{66}\text{Ga}$  در مطالعات تصویربرداری می‌باشد.  $^{67}\text{Ga}$ -oxine پیش از این برای نشان‌دارسازی گلوبول‌های قرمز خون مورد استفاده قرار گرفته است [۵]. از آن جایی که براساس جستجوی نویسندگان در بررسی‌های کتابخانه‌ای روش‌های مستدلی برای تعیین شرایط بهینه‌ی نشان‌دارسازی این ترکیب موجود نبود بر آن شدیم شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس  $^{67}\text{Ga}$ -oxine را، که یک ترکیب مناسب برای SPECT می‌باشد، بررسی نماییم.

## ۲- روش‌های تجربی

### ۲-۱ مواد و وسایل

رادیوکروماتوگرافی لایه‌ی نازک به وسیله‌ی کاغذ واتمن با ابعاد  $10\text{cm} \times 1\text{cm}$  و با استفاده از حلال آمونیم استات ۱۰٪ متانول (۱:۱) به عنوان فاز متحرک انجام پذیرفت. با استفاده از دستگاه خوانش کاغذهای کروماتوگرافی (AR-2000) ساخت کشور فرانسه، هر یک از کاغذها اسکن شده و میزان خلوص رادیوشیمیایی تعیین گردید.

### ۲-۲ تهیه‌ی $^{67}\text{Ga}$ ، گالیم [ $^{67}\text{Ga}$ ] کلرید از هدف روی-۶۸ غنی شده

$^{67}\text{Ga}$  از طریق بمباران پروتونی هدف روی-۶۸ غنی شده و با استفاده از واکنش هسته‌ای  $^{68}\text{Zn}(p,2n)^{67}\text{Ga}$  تولید شد. مقدار ۴۰۰ تا ۵۰۰mg از  $^{68}\text{Zn}$  به طریق آب کاری روی هدفی از مس نشانده شد. هدف با استفاده از باریکه‌ای از پروتون‌های ۲۴MeV تحت بمباران قرار گرفت. ناخالصی‌های عمر- کوتاه تولید شده در هدف پس از زمان خنک‌سازی حدود ۲ ساعت از بین رفتند و سایر ناخالصی‌ها در خلال روند جداسازی گالیم از روی توسط رزین‌های تبادل یونی حذف شدند. برای انجام این عمل، ابتدا ۲۵ سانتی‌متر مکعب کلریدریک اسید ۹ نرمال برای آماده‌سازی رزین استفاده شد. محلول حاصل از انحلال هدف در هیدروکلریک اسید از رزین عبور داده شد تا ناخالصی‌های موجود در آن حذف شود. این ناخالصی‌ها که شامل دیگر ایزوتوپ‌های روی چون  $^{66}\text{Zn}$  است وارد محول خروجی رزین شد در حالی که گالیم جذب رزین گردید. سپس رزین با ۲۵ سانتی‌متر مکعب از محلول هیدروکلریک اسید ۹ نرمال شسته شد تا دیگر ناخالصی‌ها شسته شوند و تنها گالیم در رزین باقی بماند. در نهایت گالیم توسط هیدروکلریک اسید ۴ نرمال از رزین خارج گردید.

### ۲-۳ تهیه‌ی کمپلکس $^{67}\text{Ga}$ -Oxine


حدود  $200\mu\text{Ci}$  گالیم [ $^{67}\text{Ga}$ ] کلرید به یک ویال بوروسیلیکات منتقل و با استفاده از گاز ازت  $\text{N}_2$  تبخیر گردید. سپس به ویال‌های مجزا مقادیر ۲ml، ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ $\mu\text{l}$  از محلول اکسین اتانولیک با غلظت ۱mg/ml اضافه شده و تبخیر گردید. پس از تبخیر کامل اکسین، و اضافه نمودن حدود ۱ml بافر استات با pH=۵٫۵ به ویال و هم‌زدن به مدت ۱۰ ثانیه در دمای  $25^\circ\text{C}$  (دمای محیط) در حمام آب گرم با دمای  $80^\circ\text{C}$  نگه‌داشته شد و




ماند. این pH برای تهیه‌ی رادیوداروها مناسب است. pHهای بالاتر از ۷ به دلیل تشکیل ژل‌های اکسیدی گالیم مورد بررسی قرار نگرفت.

### ۳-۲-۵۵

به منظور بهینه‌سازی دما، آزمایش‌ها در دو دمای ۲۵ و ۸۰°C انجام شدند. در این دو دما پس از گذشت ۳۰ دقیقه میزان نشان‌دارسازی در هر دو حدود ۸۳ تا ۸۷٪ بود، بنابراین با توجه به این که نشان‌دارسازی در دمای اتاق انجام می‌شود و درصد نشان‌دارسازی با دما به طور محسوسی تغییر نمی‌کند، دمای ۲۵°C (دمای محیط) به عنوان دمای مطلوب و مناسب برای این منظور در نظر گرفته شد (شکل ۲).



شکل ۱- ساختار مولکولی گالیم-۶۷ (III) اکسینات.



شکل ۲- تغییرات بازده رادیوشیمیایی <sup>67</sup>Ga-Oxine در مدت زمان ۳۰ دقیقه برحسب دما.

در زمان‌های ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه و ۲۴ ساعت اندازه‌گیری‌های RTLC تکرار گردید.

در ادامه، با بررسی ترکیب نشان‌دار با استفاده از روش کروماتوگرافی با کارآیی بالا، نتایج روش کروماتوگرافی لایه‌ی نازک تأیید شد.

### ۲-۴-تهیه‌ی گلبول سفید انسان از نمونه‌های خونی

تهیه‌ی گلبول سفید از خون کامل داوطلب سالم براساس یک پروتکل مورد تأیید اداره‌ی بهداشت ایالات متحده انجام شد [۶]. برای این منظور، ۱۰ میلی‌لیتر از خون یک داوطلب مرد سالم ۲۵ ساله در شرایط استریل از راه ورید بازویی تهیه و به لوله‌های محتوی ماده‌ی ضد انعقاد (ترجیحاً سدیم ادنات) منتقل گردید. سپس به مدت ۱۵ دقیقه در سانتریفوژ با قدرت ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰g و در دمای اتاق قرار داده شد. گلبول‌های قرمز در بخش پایینی، سرم در بالا و گلبول‌های سفید در بین این دو قرار گرفت. پلاسمای رویی با پیت تا ۱ میلی‌متری سطح گلبول‌های قرمز برداشته شد. باقی‌مانده شامل گلبول‌های سفید با دقت توسط یک میکروپیت تا حجم بیشینه‌ی ۰/۵ میلی‌لیتر برداشته شد.

### ۲-۵-نشان‌دارسازی گلبول سفید انسان با گالیم-۶۷ (III) اکسینات

به گلبول‌های سفید حاصل از فرایند فوق بلافاصله مقدار ۳ میلی‌لیتر محلول مقاوم حاوی گالیم-۶۷ (III) اکسینات (با فعالیت ۲۰۰ تا ۵۰۰ میکروکوری) اضافه شد و مخلوط در دمای ۳۷ درجه با آهنگ هم‌زنی بسیار ملایم قرار گرفت. در زمان‌های ۳۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه مقدار یک میلی‌لیتر از مخلوط به مدت ۵ دقیقه در سانتریفوژ با تندی ۳۰۰۰ دور در دقیقه قرار گرفت. با جداسازی محلول رویی و بخش سلولی باقی‌مانده هر بخش به طور جداگانه در یک دزیمتر نوع چاهی شمارش شد. هر آزمون ۵ بار تکرار و میانگین‌گیری شد.

### ۳- یافته‌ها و بحث


به منظور تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه کمپلکس <sup>67</sup>Ga-Oxine (شکل ۱) بهینه‌سازی عواملی چون دما، زمان، pH و میزان اکسین انجام شد.

### ۳-۱- اسیدیته


در زمان تهیه کمپلکس اکسین با گالیم-۶۷ به علت اضافه نمودن بافر استات با pH=۵/۵، همواره ثابت و برابر ۵/۵ باقی




### ۳-۳ مقدار اکسین



شکل ۳- کروماتوگرام (RTLC) ماده‌ی نشان‌دار با مقدار  $100\ \mu\text{g}$  پس از ۲ ساعت در دمای اتاق ( $25^\circ\text{C}$ ).



شکل ۴- تأثیر مقدار اکسین بر محصول رادیوشیمیایی  $^{67}\text{Ga-Oxine}$  در  $25^\circ\text{C}$  و در زمان ۱h.



شکل ۵- کروماتوگرام (HPLC) ماده‌ی نشان‌دار با مقدار  $100\ \mu\text{g}$  اکسین پس از ۲ ساعت در دمای اتاق  $25^\circ\text{C}$ .

مقدار اکسین مورد استفاده در اولین آزمایش‌ها بیش از مقدار لازم و در حدود  $5\text{mg}$  در نظر گرفته شد، تا محل دقیق قله‌های رادیوشیمیایی حاصل شود. میزان نشان‌دارسازی در این حالت حدود ۹۰٪ به دست آمد. به علت اشباع بودن محیط از اکسین، تقریباً تمامی  $^{67}\text{Ga}$  موجود واکنش داده بود. اگر چه با استفاده از مقدار  $5\text{mg}$  اکسین، نتیجه‌ی مطلوب به دست آمد. ولی به علت سمی بودن ماده‌ی اکسین، در صورتی که از این ترکیب برای نشان‌دارسازی گلوبول‌ها، پلاکت و سلول‌های بنیادین استفاده شود، مرگ سلولی مشکل‌آفرین خواهد بود. در نتیجه لازم بود که کمینه مقدار اکسین که در آن بهترین درصد نشان‌دارسازی حاصل می‌شود تعیین گردد. بنابراین مقدار اکسین تا میزان  $10^3$  برابر کاهش یافت و با مقادیر ۵۰، ۸۰،  $100\ \mu\text{g}$  آزمایش تکرار شد.

شکل ۳ کروماتوگرام لایه‌ی نازک را در شرایط بهینه نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، در زمان یک ساعت با افزایش مقدار اکسین درصد نشان‌دارسازی افزایش می‌یابد. پس از گذشت ۲ ساعت درصد خلوص رادیوشیمیایی با مقدار اکسین برابر با  $100\ \mu\text{g}$  به حدود ۹۵٪ رسید. کروماتوگرافی HPLC نیز نتایج مشابهی را ارایه کرد (شکل ۵).

در دمای  $25^\circ\text{C}$  میزان نشان‌دارسازی در زمان‌های ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه و پس از ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، با افزایش زمان مقدار بازده رادیوشیمیایی افزایش می‌یابد، به طوری که پس از گذشت ۲ ساعت میزان خلوص رادیوشیمیایی به بیشینه مقدار رسیده است. البته نکته‌ی قابل توجه این است که ترکیب نشان‌دار پس از گذشت ۲۴ ساعت هم‌چنان به میزان ۸۵٪ نشان‌دار شده باقی می‌ماند در نتیجه می‌توان حتی پس از گذشت این مدت از این ترکیب جهت نشان‌دارسازی گلوبول‌ها، لیپوزوم و حتی سلول‌های بنیادین استفاده نمود (شکل ۶). نشان‌دارسازی سلول‌های سفید خون در شرایط آزمایشگاهی برون تنی در بازه‌ی زمانی ۱۲۰ دقیقه و در دمای بدن انجام شد. همان‌طور که در شکل ۷ مشاهده می‌شود روند تقریباً خطی برداشت فعالیت در سلول‌ها به چشم می‌خورد. این روند از نظر سینتیک بیوشیمیایی نمایان گر یک برداشت براساس پدیده‌ی انتشار می‌باشد که برای بسیاری از مواد نشان‌دارکننده‌ی سلول‌های خونی قبلاً ملاحظه شده است.




**پی‌نوشت:**

۱- ITLC: Instant Thin Layer Chromatography

**References:**

1. C. Bekerman, P.B. Hoffer, J.D. Bitran, "The rules of gallium-67 in the clinical evaluation of cancer," *Semin. Nucl. Med.* **14**, 296-323 (1984).
2. J. Ruhlmann, P. Oehr, H.J. Biersach, "Cost effectiveness of PET in oncology," 195-97 in: *PET in oncology 1st edition Springer-Verlage Press, New York (1999).*
3. C.M. Lederer, V.S. Shirly, "Table of Isotopes," 7<sup>th</sup> Edition. 211, John Willy and Sons Press. New York (1978).
4. A.R. Jalilian, P. Rowshanfarzad, M. Sabet, A. Rahiminejad-Kisomi A.A. Rajamand, "Development of [<sup>66</sup>Ga]oxine complex; a possible PET tracer," *Nukleonika* **51**, 155-159 (2006).
5. L. Kostakoglow, J. Leonardo, I. Kujh, "Comparision of fluorine -18 fluorodeoxy glucose positron emission tomography and Ga-67 scintigraphy in evalution of lumphoma," *Cancer* **94**, 879-888 (2002).
6. <http://www.ambion.com/techilb/append/supp/wbc/html>.



شکل ۶- تغییرات بازده رادیوشیمیایی <sup>67</sup>Ga-Oxine بر حسب زمان در ۲۵°C.

جدول ۱ - خواص فیزیکی مهم‌ترین رادیوایزوتوپ‌های گالیم.

<sup>68</sup> Ga	<sup>67</sup> Ga	<sup>66</sup> Ga	خواص
۵۱۱	۳۹۳، ۳۰۰، ۱۸۴، ۹۳	۲۷۵۲، ۱۰۲۹، ۸۳۴، ۵۱۱	انرژی گاما (KeV)
۱۹۰۰	—	۴۱۵۳	انرژی پوزیترون
B <sup>+</sup> %۹۰، EC(%Zn) %۱۰	EC %۱۰۰	B <sup>+</sup> %۵۷، EC(%Zn) %۴۳	طریقه واپاشی
۶۸ Min	۷۸ h	۹،۵ h	نیم- عمر
<sup>68</sup> Zn(p,n) <sup>68</sup> Ga	<sup>67</sup> Zn(p,n) <sup>67</sup> Ga	<sup>66</sup> Zn(p,n) <sup>66</sup> Ga	روش تولید
<sup>68</sup> Ge	<sup>67</sup> Ga	<sup>66</sup> Zn	ناخالصی
۲۲-۱۲	—	۱۵-۶	انرژی پروتون (MeV)

**۴- نتیجه‌گیری**

در این کار پژوهشی، میزان تولید کمپلکس اکسین و <sup>67</sup>Ga از طریق روش کروماتوگرافی در زمان‌های پس از نشان‌دارسازی مورد بررسی قرار گرفت. میزان pH به علت استفاده از بافر استات با ۵/۵ = pH تغییر نکرده. پس از گذشت ۱ ساعت از آماده‌سازی محلول، با انجام تست RTLC نتیجه‌ی مطلوب حاصل گردید. دمای اتاق دمای مناسب فرض شد. مقدار بهینه‌ی کمینه‌ی اکسین ۱۰۰ μg تعیین شد. در شرایط بهینه، خلوص رادیوشیمیایی <sup>67</sup>Ga-Oxine بیش از ۹۵٪ با فعالیت ویژه ۱۴۳۲ GBq/mmol تعیین گردید. متعاقب آن تخلیص گلبول‌های سفید خون تازه تهیه شده از داوطلبان انسانی، و نشان‌دارسازی آن در دمای ۳۷ درجه و شرایط بهینه انجام شد. از آن جا که <sup>67</sup>Ga رادیونوکلیدی است که گسیلنده‌ی گامای خالص می‌باشد، کمپلکس <sup>67</sup>Ga-Oxine می‌تواند کاربرد تشخیصی در نشان‌دارسازی گلبول‌های خون سلول‌های بنیادین و موجودات ذره‌بینی داشته باشد.