

قلمرو و محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان از دیدگاه زمین شناختی

سعید چوپانی^۱، محمد خسرو شاهی^۲، محمد غلامپور^۳ و خسرو میرآخورلو^۴

۱ و ۳- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان S_choopani@yahoo.com

۲ و ۴- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور khosro@rifr-ac.ir

* این مقاله حاصل بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان است

تاریخ پذیرش: ۸۴/۱۰/۳۰

تاریخ دریافت: ۸۴/۴/۲۰

چکیده

هر چند واژه بیابان برای اغلب دست‌اندرکاران، واژه آشنایی به نظر می‌رسد، اما محققان علوم محیطی از جنبه تخصصی خود تعاریف و ویژگیهای متفاوتی برای آن بر شمرده‌اند. در این مقاله قلمرو بیابانهای استان هرمزگان از جنبه زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ویژگیهای زمین شناسی که در ایجاد و توسعه آنها موثر بوده‌اند، محدوده آنها نیز تعیین شده است. برای این کار ابتدا با استفاده از نقشه‌های زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰، ۱:۱۰۰،۰۰۰ و ۱:۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱ سازمان زمین شناسی کشور و شرکت ملی نفت ایران، سازندهای زمین شناختی شور و تبخیری در محدوده استان شناسایی و در محیط GIS رقومی شده‌اند و تحت عنوان بیابانهای اولیه معرفی شده‌اند. با ترسیم شبکه زهکشی حوضه‌های آبخیز رودخانه‌هایی که حاوی سازندهای تبخیری بوده و سپس تعیین مناطق پایین دست سازندهای تبخیری که از طریق جریانهای سطحی به گچ و نمک آلوده شده‌اند، بیابانهای ثانویه استان تعیین گردیده است. از تلفیق دو لایه مذکور گسترش بیابانهای استان هرمزگان مشخص شده است. نتایج حاصل نشان داد که ۳۶۵۷۱/۸ کیلومتر مربع، (۵۳/۱ درصد) از مساحت کل استان را بیابانهای زمین شناختی به خود اختصاص داده‌اند که ۱۷۲۹۳/۳ کیلومتر مربع را بیابانهای اولیه و ۱۹۲۷۸/۵ کیلومتر مربع را بیابانهای ثانویه تشکیل می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: بیابان، بیابان اولیه و ثانویه، سازند تبخیری، کواترنر، هرمزگان

مقدمه

بیابانی شدن در ایران با دوره‌های رگرستازی که امکان ایجاد بیوماس به حد اقل می‌رسد منطبق می‌شود و در دوره بیوستازی که گسترش پهنه حیات در آن فراهم است تکامل حاصل می‌کند. با توجه به اهمیت سازندهای زمین شناختی که می‌توانند نقش عمده‌ای در بیابانی شدن منطقه داشته باشند و همچنین تعیین کننده سازوکار شوری و بیابان زایی بوده و یکی از عوامل اصلی در تعیین جغرافیایی محدوده بیابان محسوب می‌شوند، بررسی و ارزیابی آنها ضروری است. بنابراین در طرح تحقیقاتی تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده بیابانهای استان هرمزگان یکی از دیدگاههای تقسیم بندی نواحی بیابانی، تعیین محدوده بیابانها با استفاده از دیدگاه زمین شناختی بود. در این تحقیق از نقشه‌های زمین شناسی

به عقیده بیشتر زمین شناسان باید پیدایش بیابان را در شرایط زمین شناختی و موقعیت ناهمواریهای سطح زمین (ژئومورفولوژی) جستجو کرد که در طول زمان اثر عمده داشته و امروز ما وارث آن شرایط گذشته زمین شناسی می‌باشیم. بنابراین مسأله بیابان و بیابانی شدن مربوط به امروز و دیروز نیست. این پدیده ریشه‌ای عمیق در تاریخی دور و گذشته‌ای طولانی در حد زمین شناسی و لاقط در حد نئوژن و کواترنر دارد.

بیابانی شدن می‌تواند علل و زمینه‌های گوناگون داشته باشد که تظاهرات آن می‌تواند باچهار پدیده اصلی فرسایش شدید، پیشروی شوری در آب و خاک، خشکی فیزیولوژیکی خاک و پیشروی ماسه ظاهر شود. قابلیت

قلمرو محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان
از دیدگاه زمین‌شناختی

طاهروی، فنوج، بندر عباس، حاجی آباد و غرب استان که توسط سازمان زمین‌شناسی کشور و شرکت ملی نفت ایران به چاپ رسیده استفاده شده است. به علت عدم وجود نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ محدوده بندر لنگه و محدوده جنوب نقشه طاهروی (ساحل شرقی استان) اطلاعات مورد نیاز از نقشه‌های ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰ سازمان زمین‌شناسی کشور استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه مراحل این تحقیق در محیط GIS و با استفاده از نرم افزار ILWIS انجام پذیرفته است. در مرحله زمین مرجع سازی علاوه بر سیستم مختصات Lat Lon (عرض و طول جغرافیایی) به منظور برآورد مساحت سازندها از سیستم مختصات متریک UTM نیز استفاده شده است.

مراحل انجام تحقیق

- رقومی سازی نقشه‌های زمین‌شناسی استان و نقشه‌های شبکه هیدروگرافی در محیط GIS با استفاده از نرم افزار ILWIS (شکل ۲ و ۳).
- بررسی واحدهای زمین‌شناسی استان هرمزگان و گسترش سازندهای تبخیری در آنها
- تهیه نقشه سازندهای تبخیری (سازندهای حاوی کانی‌های تبخیری از قبیل نمک، ژپس، انیدریت، و...) از روی نقشه زمین‌شناسی رقومی شده.
- تهیه نقشه سازندهای کواترنر از روی نقشه زمین‌شناسی رقومی شده و انطباق آن با نقشه سازندهای تبخیری
- تلفیق نقشه شبکه هیدروگرافی استان با نقشه سازندهای کواترنر و نقشه سازندهای تبخیری
- شناسایی سازندهای تبخیری و شور در محدوده مورد مطالعه (عنوان بیابانهای اولیه).
- تعیین بخشهایی از سازندهای کواترنر از طریق شبکه هیدروگرافی توسط کانی‌های تبخیری شور می‌شوند (بیابانهای ثانویه).


۱:۲۵۰۰۰۰، ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰۰ که توسط سازمان زمین‌شناسی کشور و شرکت ملی نفت ایران به چاپ رسیده، استفاده شده است. کلیه مراحل انجام این تحقیق در محیط GIS و با استفاده از نرم افزار ILWIS انجام پذیرفته است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی زمین‌شناسی و پراکندگی جغرافیایی سازندهای تبخیری و نقش پویای درونی و بیرونی در پیدایش و تحول شکل چاله‌های داخلی و تعیین قلمرو بیابانهای استان هرمزگان از دیدگاه زمین‌شناختی می‌باشد.

مواد و روشها

موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

استان هرمزگان با مساحت ۶۸۷۷۴ کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی طول شرقی ۵۲ درجه ۴۱ دقیقه تا ۵۹ درجه و ۱۵ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۵ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۲۸ درجه ۵۷ دقیقه شمالی واقع شده است. این استان از سمت مشرق و جنوب شرقی با استان سیستان و بلوچستان، از سمت شمال، شمال غرب و شمال شرق با استانهای کرمان و فارس، و از سمت غرب با استان بوشهر همسایه است.



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش تحقیق

در این تحقیق از نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ موجود شامل شش برگ نقشه چهار گوش میناب،

۱- منطقه ساختاری زاگرس


الف: منطقه زاگرس چین خورده

این منطقه در جنوب و جنوب غرب ایران قرار دارد و از قسمت شرق به گسل میناب محدود شده و در بعضی از قسمتها به زیر زاگرس رورانده کشیده شده است. روند عمومی این منطقه تقریباً شمال غربی - جنوب شرقی بوده که همان روند زاگرس است. در این منطقه رسوبهای دوران اول، دوم و سوم به طور هم شیب روی هم قرار دارند که در پلیوسن تغییر شکل یافته و چین خورده‌اند و در بخش جنوبی زاگرس چین خورده گنبدهای نمکی فراوانی دیده می‌شود که بسیاری از آنها به پرکامبرین بالا تعلق دارند چنانکه بیشتر جزایر میانی و جنوبی (جزیره هرمز) در نتیجه دیپایریسم همین نمکهای پرکامبرین بالا بوجود آمده‌اند (درویش‌زاده، ۱۳۷۰؛ تهرانی، ۱۳۷۰؛ مطیعی، ۱۳۷۲).


گنبدهای نمکی مزبور در حد فاصل گسله‌های میناب و کازرون گسترش دارند. تعداد این گنبدها در محدوده یاد شده به ویژه در شمال بندر کنگان و در شمال بندر لنگه به فرو نشینی حوزه در امتداد گسلها و شکستگیها و کمبود یا نبود گنبد در شرق گسل میناب در منطقه مکران و غرب گسل کازرون بوجود یک هورست احتمالی قدیمی مربوط می‌شود. به طور کلی در تمام دوره‌ها از پرمین تا اوایل میوسن دریای کم عمق در تمام منطقه خلیج فارس وجود داشته و در اواسط میوسن دریا پسروی کرده و کم‌کم رسوبهای تبخیری نمک و گچ سازند گچساران و سپس رسوبهای دریایی کم عمق و قاره‌ای آجاجاری رسوب کرده‌اند (احمدزاده، هروی و هوشمندزاده، ۱۳۶۹).

در قسمت غربی استان تقریباً از حوالی نصف النهار ۵۷ درجه شرقی به سمت غرب از میوسن پسین تا پلیوسن میانی بالا آمدگی توده نمکی (همزمان با رسوب گذاری سازند میشان و بخش عمده ای از سازند آجاجاری) به طور مرحله ای افزایش یافت و در نتیجه

- تلفیق نقشه بیابانهای اولیه و ثانویه و تعیین محدوده جغرافیایی بیابانهای استان هرمزگان
- انجام عملیات صحرایی، کنترل و اصلاح محدوده بیابانهای استان هرمزگان.



شکل ۲- نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ رقومی شده زمین شناسی (بر اساس برگ‌های ۱:۲۵۰۰۰۰ موجود) استان هرمزگان



شکل ۳- نقشه زمین شناسی رقومی شده با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰۰ استان هرمزگان

نتایج

واحدهای زمین ساختی استان هرمزگان و گسترش سازندهای تبخیری در آنها

استان هرمزگان از نقطه نظر ساختاری در دو منطقه ساختاری زاگرس در شمال، شمال غرب، شمال شرق و غرب و مکران در شرق و جنوب شرق واقع شده است (سوری نژاد، ۱۳۷۸). بنابراین در این بخش از پژوهش به بررسی ساختاری این دو منطقه و تقسیم بندیهای ارائه شده در آن دو پرداخته شده و ارتباط بین مناطق مزبور و سازندهای تبخیری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


قلمرو محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان
از دیدگاه زمین‌شناختی

۱۳۶۹). قسمت‌های محدودی در منتهی‌الیه شمال استان
هرمزگان در محدوده نقشه چهار گوش حاجی آباد در این
منطقه واقع می‌گردد.

۲- منطقه مکران

امتداد شرقی منطقه که از شرق تنگه هرمز شروع
شده و تا مرز کشور پاکستان ادامه می‌یابد مکران نامیده
می‌شود. منطقه مکران و زاگرس در تمام جهات
جغرافیایی با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت ناگهانی در
محلی صورت می‌گیرد که به آن خط عمان گفته می‌شود.
این خط در سابق گسله زندان نامیده می‌شد که بعدها
توسط بربریان (۱۹۷۶) گسله میناب نامیده شد (سوری
نژاد، ۱۳۷۸).

منطقه مکران در مقایسه با منطقه زاگرس از نظر زمین
ساخت و چینه‌شناسی از ویژگیها و پیچیدگیهای خاصی
برخوردار است که آن را کاملا از مناطق مجاور متمایز
می‌سازد. از جمله عدم وجود گنبد‌های نمکی در این
محدوده که در غرب گسل میناب یکی از رسوب‌های
تبخیری و مخرب بحساب می‌آید.



شکل ۴ - نقشه شماتیک تقسیمات ساختمانی ایران از نظر

اشتوکلین و روتنر

(اقتباس از علوی نائینی ۱۹۷۲)

پیدایش پاره‌ای از گنبد‌های نمکی در این دوره تحقق
یافته است (صمدیان، ۱۳۶۹).

آخرین حرکت از نوع اپیروژنی بوده و باعث بوجود
آمدن حوزه‌های کوچک میان کوهی که بیشتر با ردیف‌های
کنگولومرا ماسه سنگ و نهشته‌های پلیوسن پوشانده شده
است. این نهشته‌ها تراسهای مرتفع و کم ارتفاع،
نهشته‌های مخروط افکنه‌ای، کف دره‌ها و پهنه‌های
پایکوهی را فرا گرفته‌اند. ردیف سنی این نهشته‌های
سطحی پلیوسن تا عصر حاضر است. نهشته‌های مربوط
به کفه‌های رسی و شن‌های روان نیز وجود دارد (سوری
نژاد، ۱۳۷۸).

ب: منطقه زاگرس مرتفع


نوار چین خورده زاگرس به تدریج در سمت شمال
شرقی به یک منطقه رورانده منتهی می‌شود (تراست یا
راندگی زاگرس) در نتیجه منطقه‌ای به شدت خرد شده و
گسل خورده پدید می‌آید که به صورت نوار باریک و کم
عرضی (۱۰ تا ۷۰ کیلومتر) بین منطقه سنندج - سیرجان و
زاگرس چین خورده قرار می‌گیرد. این منطقه که بخش
محدودی از آن در شمال استان هرمزگان در نقشه زمین
شناسی چهار گوش حاجی آباد گسترش دارد، عمیق‌ترین
قسمت فرو رفتگی زاگرس را طی مزوزویک و اوایل
ترشیر تشکیل می‌داده است. حد شرقی این منطقه به
وسیله گسل میناب محدود می‌شود (تهرانی، ۱۳۷۰).

ج: منطقه سنندج - سیرجان

حد شمال شرقی کوه‌های زاگرس را گسل معروف
زاگرس محدود می‌کند که با راستای شمال غربی - جنوب
شرقی و تقریبا به صورت یک خط مستقیم این ناحیه را از
کمر بند سنندج - سیرجان جدا می‌کند. منطقه سنندج -
سیرجان از نظر ویژگیهای زمین‌شناختی تفاوت اساسی با
منطقه زاگرس دارد و گسترش سنگ‌های دگرگونی در این
منطقه زیاد می‌باشد (احمدزاده هروی و هوشمندزاده،

تهیه نقشه سازندهای تبخیری

پس از بررسی واحدهای زمین ساختی و شناخت دقیق سازندهای تبخیری (سازندهای حاوی کانی‌های تبخیری از قبیل نمک، ژپس، انیدریت، و ...) و ثبت علائم اختصاری هر سازند از نقشه زمین‌شناسی رقومی شده اقدام به تهیه نقشه سازندهای تبخیری با استفاده از نرم افزار ILWIS گردید (شکل ۵).



شکل ۵- نقشه پراکنش سازندهای تبخیری در استان هرمزگان

بررسی وسعت و پراکندگی سازندهای تبخیری در استان هرمزگان

در طول زمان زمین شناسی همزمان با رویداد فرآیندهای تکتونیکی و کاهش عمق حوضه‌های موجود سازندهای تبخیری مختلفی تشکیل گردیده‌اند. با توجه به خصوصیات ساختاری و روند تکامل ساختاری مختلف مناطق زاگرس و مکران طی فرآیندهای مختلف سازندهای متفاوتی تشکیل شده‌اند که در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان (شکل ۵) تعدادی از آنها رخنمون یافته‌اند. با توجه به اهمیت سازندهای تبخیری و بررسیهای زمین ساختی در این پژوهش استان هرمزگان به دو منطقه با خصوصیات مختلف تقسیم و مورد بررسی قرار گرفته است.

الف: بررسی سازندهای تبخیری در غرب گسل میناب (زاگرس)

این بخش، بیشتر استان هرمزگان را شامل شده و شامل نقشه‌های زمین‌شناسی چهار گوش بندرعباس، حاجی آباد، غرب استان (جنوب شرقی و جنوب غربی فارس) و

قسمتی از نقشه چهارگوش میناب بوده و در ضمن محدوده بندر لنگه فاقد نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ زمین شناسی می‌باشد که برای بررسی سازندهای تبخیری موجود در این محدوده از نقشه‌های ۱:۱۰۰۰۰۰۰ سازمان زمین شناسی کشور (شکل ۳) و مطالعات طرح جامع استان هرمزگان استفاده شده است. سازندهای تبخیری موجود در این بخش به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند (جدول ۱):

پالئوزوئیک

سازند هرمز (SPH): قدیمیترین سازند تبخیری موجود در استان هرمزگان سازند نمکی هرمز است که نام آن از جزیره هرمز در مدخل خلیج فارس گرفته شده است. این سازند فاقد برش نمونه است و ردیف کاملی از آن در هیچ منطقه‌ای از استان و حتی کوههای زاگرس رخنمون ندارد (مطیعی، ۱۳۷۲).

سنگ شناسی این سازند مشتمل بر سنگ نمک به رنگهای مختلف، انیدریت و ژپس و بلوکهایی از سنگهای رسوبی مانند آهکهای نازک لایه سپاهرنگ و دولومیت‌های متعفن چرتی، ماسه سنگهای قرمز، شیل‌های رنگارنگ، رسهای قرمز رنگ و سنگهای آذرین مانند بازالت، تراکیت، ریولیت و.... به همراه این نمک می‌باشد. مطابق نقشه تشکیلات تبخیری و بر اساس بررسیهای انجام یافته نزدیک به ۷۰ گنبد نمکی بزرگ و کوچک در استان هرمزگان وجود دارند که سطحی بالغ بر ۱۰۴۰ کیلومترمربع و ۱/۵ درصد از سطح کل استان را اشغال نموده‌اند و علاوه بر آن میلیونها هکتار دشتهای پایین دست و منابع آب موجود را مورد هجوم قرار داده‌اند. این گنبدهای نمکی در قسمت‌های غربی و شمال غربی دارای بیشترین تراکم بوده و به سمت شرق و شمال از تراکم آنها کاسته می‌گردد، به طوری که در قسمت‌های شرقی بعد از گسل میناب، آثاری از این گنبدها دیده نمی‌شود. برخی از این گنبدها که از اهمیت بیشتری برخوردارند و یا آنکه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند از جمله می‌توان به

سازند آغاچاری (Ma): سنگ‌شناسی این سازند شامل ماسه سنگهای خاکستری تا قهوه‌ای روشن همراه با لایه‌های نازک گچ است. این سازند در قسمت‌های غربی و شمالی استان گسترش داشته و در شمال غرب بندرعباس به طور هم‌شیب بر روی سازند میشان قرار می‌گیرد. در نوشته‌ها و نقشه‌های موجود سن این سازند میوسن پسین در نظر گرفته شده است (تهرانی، ۱۳۷۰؛ مطیعی ۱۳۷۲). مساحت این سازند در استان بالغ بر ۳۱۴۴ کیلومتر مربع و ۴/۶ از سطح کل استان را در بر می‌گیرد.

ب: بررسی سازندهای تبخیری در شرق گسل میناب (مکران)

از کرتاسه پسین تا پالئوسن ارتفاعات شرقی-غربی، شمال مکران بوجود آمده‌اند که از تخریب سریع آن رسوبهای نوع فلیش در حوزه‌های دریایی مجاور انباشته شد. رسوبگذاری فلیش مکران تا زمان اولیگوسن ادامه داشته است در این زمان با عقب نشینی دریا، رسوبهای شیلی ماسه سنگی پر ضخامتی بوجود آمد. رسوبهای نئوژن بیشتر از نوع مولاسی و دلتائی بوده، در زیر و میان رسوبهای دلتایی مذکور نهشته‌های مارنی و مادستون ژیبس دار ضخیم به سن میوسن در حوضه ای کم عمق و در حال فرو نشینی تشکیل شد (سوری نژاد، ۱۳۷۸). که در این مبحث به عنوان رسوبهای تبخیری در منطقه مکران به شرح ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت (شکل ۵):

واحد سبز (Ms2): یک واحد چینه ای غیر رسمی است که نام آن از کوه سبز در محدوده نقشه چهار گوش میناب گرفته شده است سنگ‌شناسی این واحد متشکل از رخساره‌های مادستون ژیبسی و ردیف فلیش مانند و به طور پراکنده ژیبس می‌باشد. سن این واحد به اواخر میوسن پیشین تا حداقل آغاز میوسن پسین تعلق دارد. وسعت این واحد ۱۱۵۰ کیلومتر مربع و ۱/۷ درصد از سطح استان را به خود اختصاص داده است.

گنبد‌های نمکی نمکدان در جزیره قشم با مساحت تقریبی ۴۲ کیلومتر مربع، گنبد نمکی گچین در ۴۰ کیلومتری غرب بندرعباس با وسعت تقریبی حدود ۲۵ کیلومتر مربع، گنبد نمکی انگوران در یال جنوبی طاقدیس انگوران واقع در شمال بندرعباس، گنبد نمکی پل در ۴۵ کیلومتری غرب بندرعباس و با مساحت تقریبی ۵۰ کیلومتر مربع، گنبد نمکی شیخ حضور، گنبد‌های نمکی کوه جناح، گنبد نمکی سیاهو در ۷۰ کیلومتری شمال بندرعباس، گنبد نمکی تنگ زاغ در ۱۱۵ کیلومتری شمال بندرعباس، گنبد نمکی گهکم در ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان حاجی آباد و ۴ کیلومتری جنوب روستای گهکم به وسعت حدود سه کیلومتر مربع اشاره نمود (سوری نژاد، ۱۳۷۸).

سنوزوئیک:

گروه فارس (F): این گروه شامل سازندهای گچساران، رازک، میشان و آغاچاری است. در نقشه چهار گوش بندرعباس این تشکیلات به صورت تفکیک نشده وجود دارد که مساحت آن بالغ بر ۲۲۲۳ کیلومتر مربع می‌باشد و ۳/۲ درصد از سطح کل استان را به خود اختصاص داده است.

سازند گچساران (Mg): این سازند به‌طور عمده شامل ژیبس، تداخل‌های بین‌انگشتی از مارن قرمز، خاکستری و آهک‌های فسیل دار می‌باشد. در بسیاری از نقاط انیدریت جانشین ژیبس می‌شود و حاوی لایه ضخیم نمک نیز می‌باشد. این سازند از نظر پوشش سنگ مخازن نفت سازند آسماری بسیار حائز اهمیت است (احمدزاده هروری و هوشمندزاده، ۱۳۶۹). گچساران در قسمت‌های غربی استان هرمزگان بعد از سازند آسماری و جهرم بیشترین گسترش را دارد و بیشتر پوشش خارجی طاقدیس‌های غربی و شمالی را تشکیل می‌دهد. وسعت این سازند در استان هرمزگان بالغ بر ۳۸۹۶/۲ کیلومتر مربع و ۵/۷ درصد از سطح استان را اشغال نموده است.

در نواحی شرقی استان در محدوده بین میناب تا جاسک در ارتفاعات و در حاشیه جلگه‌های ساحلی به موازات آنها گسترش دارند. مساحت این سازند ۳۴۶۰ کیلومتر مربع و ۵/۰۳ درصد از سطح کل استان را شامل می‌شود. سازندهای تبخیری مزبور معرف بیابانهای اولیه هستند (نقشه ۵). چرا که به دلیل شور بودن خاک سطحی آنها تنها گیاهان بیابانی در آن رشد کرده و امکان کشت و کار در بیشتر آنها (در بیشتر موارد) وجود ندارد. سازندهای مزبور ۱۷۲۹۳/۳ کیلومتر مربع از سطح کل استان را به خود اختصاص می‌دهند. بدین ترتیب ۲۵/۱ درصد از مساحت استان هرمزگان را بیابانهای اولیه تشکیل داده‌اند.

واحد در پهن (Mdp): رسوبهای این واحد شامل طبقات مکرر ماسه سنگ و شیل و کمی کنگلومرا، ماسه سنگ رسی و گل سنگ ژئوپس دار و شیل در بالا می‌باشد. ژئوپسها اغلب منشا دیاژنیک دارند، ولی بی‌تردید مقداری از آنها در رخساره‌های تبخیری ابتدایی احتمالاً در سبخاهای مناطق جذر و مدی تحت شرایط آب و هوای گرم تشکیل شده‌اند. این واحد بیشتر در قسمتهای مرکزی نقشه چهار گوش طاهروبی گسترش دارد. سن این سازند میوسن و مساحت آن بالغ بر ۲۳۸۰/۳ کیلو متر مربع و ۳/۴۶ درصد از سطح استان را شامل می‌شود.


مارن گوشه (Mm1): شامل ردیفی از گل سنگ ژئوپس دار خاکستری تا خاکستری تیره، مارن و شیل با میان لایه‌های نازک ماسه سنگ و سیلتستون و گاهی کنگلومرا می‌باشد. که

جدول ۱- موقعیت مکانی سازندهای تبخیری استان هرمزگان

| نام منطقه | دوران | نام سازند تبخیری | علامت مشخصه در نقشه زمین شناسی | موقعیت مکانی رخنمون سازند |
|--------------|-------|------------------------|--------------------------------|--|
| ص ۱، ۶، ۷، ۸ | | گنبد های نمکی سری هرمز | Sph | بیش از ۷۰ گنبد نمکی در قسمتهای شمال، شمال غرب و غرب استان گسترش دارند که به تعدادی از آنها در متن اشاره شده است. در شمال، شمال غرب و غرب استان گسترش دارند |
| ص ۳ | | گروه فارس (تفکیک نشده) | F | در شمال، شمال غرب و غرب استان گسترش دارند |
| | | گچساران | Mg | در شمال، شمال غرب و غرب استان گسترش دارند |
| | | آغاچاری | Ma | در شرق استان در محدوده نقشه چهار گوش میناب و طا هروبی |
| | | واحد سبز | Ms2 | در شرق استان در محدوده نقشه چهار گوش میناب و طا هروبی |
| | | واحد درپهن | Mdp | دز شرق استان در محدوده بین رودخانه گز تا رودخانه سدیح در منتهی |
| | | مارن گوشه | Mm1 | الیه شرق شهرستان جاسک به موازات جلگه‌های ساحلی |

تهیه نقشه سازندهای کواترنر

پس از بررسی واحدهای زمین ساختی و شناخت دقیق سازندهای کواترنر و ثبت علائم اختصاری هر سازند از نقشه زمین شناسی رقومی شده، اقدام به تهیه نقشه سازندهای کواترنر با استفاده از نرم افزار ILWIS گردید (شکل ۶).



شکل ۶- نقشه پراکنش سازندهای کواترنر در استان هرمزگان (بر اساس نقشه‌های موجود)

گسترش سازندهای کواترنر در استان هرمزگان

به دلیل استفاده از مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ در طرح تحقیقاتی تعیین محدوده بیابانی استان هرمزگان سعی شد تا نقشه‌ها بر اساس مقیاس مورد نظر تهیه شوند و برای تعیین مساحت و محدوده سازندها از نقشه‌های با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰ رقومی نیز استفاده شد. بر اساس نقشه‌های زمین‌شناسی مذکور و جدول ۲، آبرفتها و جلگه‌های ساحلی با ۹۱۳۴/۳ کیلومتر مربع ۱۳/۳۸ درصد از سطح کل استان را به خود اختصاص داده است. رسوبهای بادی و تپه‌های ماسه ای با سطحی معادل ۲۸۹۰/۸ کیلومتر مربع ۴/۲ درصد از سطح کل استان را به خصوص در قسمتهای شرقی و در محدوده شهرستان جاسک به خود اختصاص می‌دهند که به صورت تپه‌های ماسه ای فعال دیده می‌شوند و از نوار ساحلی تا ارتفاعات کشیده شده‌اند و حاصل رسوبهای قدیمی و بسیار فرسایش پذیر می‌باشند.

پادگانه‌های آبرفتی که در نتیجه تغییر سطح اساس رودخانه‌ها تشکیل شده‌اند. به طور عام جنبش گسل‌های فعال، بالا آمدگی کوه‌ها و فرو نشینی گودالها (رانده شدن کوهها بر روی دشتهای) باعث می‌شود که در امتداد جنبشها سطح اساس رودخانه به سرعت تغییر کند. در نتیجه این تغییر و تحول سطوح فرسایشی در ارتفاعات مختلف در استان ایجاد شده‌اند و فرسایش و سپس رسوبگذاری به صورت پادگانه‌های آبرفتی صورت گرفته است (سوری نژاد، ۱۳۷۸). این پادگانه‌ها با سطحی بالغ بر ۳۱۶۷/۷ کیلومتر مربع ۴/۶ درصد از سطح استان را پوشش می‌دهند.

آبرفتهای بستر رودخانه‌ها که به صورت سست قابل مشاهده بوده که از سمت بالادست به سمت دشت به طور عام ریز دانه تر می‌گردد. جور شدگی در رسوبها به طور عام در حد ساب مچور می‌باشد. آبرفتهای مزبور در بستر رودخانه‌های بزرگ استان دارای گسترش نسبتا زیادی

است به طوری که این آبرفتها سطحی معادل ۸۶۰/۳ کیلومتر مربع از سطح استان را پوشش می‌دهند. فلاتهای گلی که در نقشه چهار گوش حاجی آباد در قسمتهای شمالی استان قابل مشاهده هستند و دارای مساحتی بالغ بر ۶۴۱ کیلومتر مربع در سطح استان می‌باشند. این فلاتها شامل نواحی پست و کم ارتفاع و دارای شیب کم بوده و بیشتر از رسوبهای ریز دانه تشکیل یافته و سطح آب زیر زمینی در قسمتهای انتهایی بسیار بالا و شوری در این خاکها رو به افزایش است و بیشتر توسط آبهای سطحی بالا دست به طور ثانوی شور شده‌اند. مخروط افکنه‌ها و پادگانه‌های کم ارتفاع، اراضی ساحلی مرتفع، اراضی ساحلی کم ارتفاع، اراضی ساحلی مرتفع و کم ارتفاع، نوار ماسه ای بین جزر و مدی، برآمدگیهای ساحلی و جزایر و بالاخره فلاتهای گلی بین جزر و مدی از رسوبهای کواترنر هستند که در سطح استان گسترش دارند (جدول ۲).

جدول ۲- گسترش و توسعه سازندهای کواترنر در استان هرمزگان

| نام سازند | علامت اختصاری | مساحت km^2 | مساحت (درصد) |
|--|---------------|--------------|--------------|
| آبرفتها و جلگه‌های ساحلی | All | ۹۱۳۴/۳ | ۱۳/۲۸ |
| فلاتهای گلی | Qal2 | ۶۴۱/۴ | ۰/۹۳ |
| رسوبهای بادی و تپه‌های ماسه ای | Qs | ۲۸۹۰/۸ | ۴/۲ |
| رسوبهای رودخانه ای | Qal1 | ۸۶۰/۳ | ۱/۲۵ |
| خورها و فلاتهای ماسه ای بین جزر و مدی | Qts | ۵۷ | ۰/۸۰ |
| فلاتهای گلی بین جزرومدی | Qtm | ۱۲۲ | ۰/۱۸ |
| نوار ماسه ای بین جزر و مدی، برآمدگیهای ساحلی و جزایر | Qtr | ۸۴/۵ | ۰/۱۲ |
| اراضی ساحلی مرتفع و کم ارتفاع | Qt2a | ۱۹۰ | ۰/۲۸ |
| اراضی ساحلی کم ارتفاع | Qc2 | ۳۲۲/۵ | ۰/۴۷ |
| اراضی ساحلی مرتفع | Qc1 | ۴۰۶ | ۰/۵۹ |
| مخروط افکنه‌های کم ارتفاع و پادگانه‌های دره ای | Qc2 | ۱۴۰۰ | ۰/۲ |
| مخروط افکنه‌ها و پادگانه‌های آبرفتی | Qt | ۳۱۶۷/۷ | ۴/۶ |

تعیین محدوده بیابانهای ثانویه


تپه‌های شنی و آبرفت‌های بستر رودخانه مشخص گردیده‌اند. سپس با رسم مسیر شبکه هیدروگرافیکی استان محدوده‌ای از سازندهای کواترنر که در اثر عبور آب‌های گذری از سازندهای تبخیری شور شده‌اند تحت عنوان محدوده بیابانهای ثانویه (نقشه ۷) معین شده‌اند. سپس نقشه سازندهای تبخیری نیز به آن اضافه گردیده و محدوده سازندهای مزبور تحت عنوان بیابانهای اولیه معرفی شده‌اند. بدین ترتیب مجموع سازندهای کواترنر شور شده توسط سازندهای تبخیری و سازندهای تبخیری (بیابانهای اولیه) قلمرو بیابانهای استان هرمزگان را تشکیل داده‌اند (نقشه ۸).

بحث

مطابق نقشه بیابانهای استان هرمزگان ۱۷۲۹۳/۳ کیلومتر مربع و ۲۵/۱ درصد از مساحت استان را بیابانهای اولیه و ۱۹۲۷۸/۵ کیلومتر مربع از استان را بیابانهای ثانویه به خود اختصاص داده‌اند. بیابانهای اولیه (سازندهای تبخیری) در قسمتهای شمال و غرب استان بیشترین گسترش را نسبت به قسمتهای شرقی دارا می‌باشد. اما در منتهی الیه شمال استان که در محدوده منطقه سندرگ - سیرجان قرار گرفته و محدوده آمیزه رنگین در قسمتهای شمال شرقی و شرق استان که تا بلندیهای بشاگرد در مجاورت منطقه مکران ادامه دارد فاقد هر گونه تشکیلات تبخیری بوده و از نقطه نظر زمین شناسی در محدوده بیابان قرار نمی‌گیرند. از طرفی در طول زمان بیابانهای اولیه موجب توسعه و گسترش بیابانهای ثانویه شده و به شدت بیابانی شدن این مناطق افزوده خواهد شد.

مطابق پژوهش صورت پذیرفته (نقشه ۷ و جدول ۳) ۳۶۵۷۱/۸ کیلومتر مربع، ۵۳/۱ (درصد) از کل مساحت استان را بیابانهای زمین شناسی به خود اختصاص داده‌اند. گسترش بیابانهای مزبور در جنوب، شرق و غرب استان

برای تعیین محدوده بیابانهای ثانویه نقشه شبکه هیدروگرافیکی استان هرمزگان با نقشه سازندهای کواترنر و نقشه سازندهای تبخیری با استفاده از نرم افزار ILWIS انطباق داده شد (شکل ۶). به طور عام سازندهایی از قبیل دشتهای گلی، جلگه‌های ساحلی، پادگانه‌های آبرفتی، رسوبهای بادی و تپه‌های ماسه ای و آبرفت‌های بستر رودخانه هستند که تحت تاثیر آب‌های آلوده به گچ و نمک قرار گرفته و کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهند و در بعضی موارد علاوه بر تغییر کیفیت خاکهای سطحی سبب تغییر در کیفیت آب‌های زیر زمینی نیز می‌گردند. سپس با انطباق نقشه شبکه هیدروگرافیکی استان محدوده‌ای از سازندهای کواترنر که در اثر عبور آب‌های گذری از سازندهای تبخیری شور شده‌اند تحت عنوان محدوده بیابانهای ثانویه (شکل ۷) معین شدند.



شکل ۷- محدوده بیابانهای ثانویه

تعیین محدوده بیابانی از دیدگاه زمین شناسی در استان هرمزگان


در طول این پژوهش سازندهای تبخیری استان هرمزگان (شکل ۵) از قبیل گنبد‌های نمکی، سازندهای گروه فارس (تفکیک نشده)، سازند گچساران، آغاچاری، کلیه سازندها و یا واحدهای همراه با ژئیس و نمک و کانی‌های دیگر تبخیری شناسایی شده (شکل ۳ و ۲) و سازندهای کواترنر (شکل ۶) از قبیل دشتهای گلی، جلگه‌های ساحلی، پادگانه‌های آبرفتی، رسوبهای بادی و

قلمرو محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان
از دیدگاه زمین‌شناختی

- ۱- احمد زاده هروی، م و هوشمند زاده ن. ۱۳۶۹، مفاهیم جدیدی از چینه‌شناسی سازند هرمز و مسئله دیاپیریسم در گنبد‌های نمکی جنوب ایران. مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به ایران، ناشر سازمان زمین‌شناسی کشور.
- ۲- تهرانی خ. ۱۳۷۰، چینه‌شناسی ایران " مقاطع تیپ و تشکیلات. چاپ اول، ۱۳۶۵، دانشگاه تهران.
- ۳- سوری نژاد ع. ۱۳۷۸، طرح جامع توسعه استان هرمزگان، مطالعات زمین‌شناسی، جلد دوم، وزارت کشور، استانداری هرمزگان.
- ۴- درویش زاده ع. ۱۳۷۰، زمین‌شناسی ایران، چاپ اول، ۱۳۷۰، نشر دانش امروز.
- ۶- شرکت ملی نفت ایران، سری ۱:۲۵۰۰۰۰۰، نقشه جنوب شرق فارس، جنوب غرب فارس و نقشه زمین‌شناسی چهار گوش بندرعباس.
- ۷- صمدیان م. ر، ۱۳۶۹، جنبش‌های گنبد‌های نمکی زاگرس در سنوزوئیک پسین، مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به ایران؛ ناشر سازمان زمین‌شناسی کشور.
- ۸- مطیعی ه. ۱۳۷۲، زمین‌شناسی ایران، چینه‌شناسی زاگرس، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۲، سازمان زمین‌شناسی کشور.

بیشتر بوده و به صورت مجموعه‌ای واحد و یکپارچه دیده می‌شوند.

بدین ترتیب و با استناد به نقشه قلمرو محدوده جغرافیایی بیابان‌های استان هرمزگان (شکل ۸)، بالغ بر ۷۸ درصد از سطح استان هرمزگان در این قلمرو واقع شده است.



شکل ۸- نقشه قلمرو محدوده جغرافیایی بیابان‌های استان هرمزگان

جدول ۳- گسترش بیابانهای زمین‌شناسی در استان هرمزگان

| درصد | مساحت (Km ²) | بیابانها |
|------|--------------------------|----------------------------|
| ۲۵/۱ | ۱۷۲۹۳/۳ | بیابانهای اولیه |
| ۲۸ | ۱۹۲۷۸/۵ | بیابانهای ثانویه |
| ۵۳/۱ | ۳۶۵۷۱/۸ | مجموع بیابانهای زمین‌شناسی |

منابع مورد استفاده

Determination of desert areas of Hormozgan province from geological aspect

S. Choopani¹, M. khosroshahi², M. Gholampoor¹ and kh. Mirakhorlo²

1- Agricultural and natural resources research center. hormozgan province

2- Academic member of research institute of forests and rangelands

The country of Iran is situated in an arid and semi-arid zone, with an average precipitation of about 250 mm per year. Hormozgan province in southern Iran, is one of the most arid parts of Iran with an average annual rainfall of only 170mm. The study area is located in the Zagros and Makran geological zones. In the study area the oldest formations are of Palaeozoic age. Another characteristic of the Zagros zone are diapirs. Diapirs rise up from the deepest part of sedimentary rocks, and after cutting through the upper layers, they may appear at the surface, which seriously affect groundwater quality and land use. Desertification; in Iran has occurred from Neosene and Quaternary. Geological formation have important effect on salinisation and desertification. Thus, the geographical investigation of desert area is very important. This investigation is based on GIS method Applications, geological map (1:250000) and supported by, fieldwork. At the first, prepared and digitizing of geological maps by Ilwis program and was carefully checked and corrected where possible. The next step prepared evaporation formation and Quaternary maps and its overlying. Prepared cross map of Quaternary and Hydrographic network and determination of primary and secondary deserts area. The final step was prepared a cross map of primary and secondary desert area map and checked by fieldwork. To comparison between units of desert area map, can be result, more than 78 percent of study area is situated in the deserts area.

Key words: Hormozgan Province, Evapo formation, Quaternary formation, primary desert, secondary desert