

ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده از مدل I. C. D (مطالعه موردي: منطقه خضرآباد- همت آباد یزد)

سعید قره چلو^{*} ، محمدرضا اختصاصی^۳ ، مجتبی زارعیان جهرمی^۴ و محمد باقر صمدی^۵

نویسنده مسئول، مریب دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، پست الکترونیک: sgharachelo@yahoo.com

- دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

- دانش آموخته، کارشناسی ارشد بیابان‌زایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

- مرکز آموزش عالی ملاصدرا یزد

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۱/۲۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۹/۲۶

چکیده

یکی از بحران‌های اکولوژیکی که جهان امروزه با آن درگیر شده است پدیده بیابان‌زایی می‌باشد. اما برای مهار این بحران نیاز به شناخت و درک صحیح از عوامل و فرایندهای آن می‌باشد. بهمنظور ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده از مدل ICD محدوده‌ای به وسعت حدود ۲۴۲ کیلومتر مربع در منطقه خضرآباد- همت آباد یزد در نظر گرفته شد. روش طبقه‌بندی شدت بیابان‌زایی در ایران (ICD) توسط محمدرضا اختصاصی و سعید مهاجری در سال ۱۳۷۴ ارائه شد. در این تحقیق ابتدا اقدام به جمع‌آوری داده‌های موجود و انجام مطالعات پایه گردید. داده‌های جمع‌آوری شده وارد محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی^۶ شدند و به روش تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و با استفاده از نرم‌افزارهای آرک ویو^۷ و ایلویس^۸ نقشه‌های پایه برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. براساس مطالعات انجام شده با تلفیق نقشه‌های ژئومورفولوژی، کاربری اراضی و پوشش گیاهی^۹ واحد همگن بیابانی در منطقه مورد مطالعه تفکیک شد. در مرحله بعد در هر واحد بیابانی عوامل مؤثر در بیابان‌زایی شامل سه عامل محیطی، سه عامل انسانی و دو عامل شاخص فرسایش خاک و توان برگشت‌پذیری و بازسازی اکوسيستم، به روش امتیازدهی در دامنه (۰-۱۰) مورد بررسی قرار گرفت. سپس براساس جمع امتیازات بدست آمده و مقایسه آن با جدول شاخص شدت بیابان- زایی، نقشه نهایی بیابان‌زایی تهیه گردید. نتایج بدست آمده نشانگر آیینه ۱۱/۵۳ درصد منطقه دارای شدت بیابان‌زایی متوسط و ۱۸/۴۷ درصد بقیه از وضعیت بیابان‌زایی شدید برخوردار می‌باشد. بنابراین عامل اصلی بیابان‌زایی در سطح ۸۱/۵۳ درصد سطح منطقه مورد مطالعه عامل محیطی^{۱۰} و ۱۸/۴۷ درصد سطح منطقه تحت تأثیر عامل انسانی^{۱۱} می‌باشد. اصلی‌ترین معیار موجود در این منطقه که در روند بیابان‌زایی مؤثر است فرایند تخریب منابع آب^{۱۲} (W.d) می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: بیابان، وضعیت فعلی بیابان‌زایی، مدل ICD، عامل محیطی، عامل انسانی، عامل غالب.

1-Iranian Classification of Desertification(ICD)

2- Geographic Information System(GIS)

3- Arcview 3.2

4-Ilwiss 3.1

5- Environmental Causes

6- Anthropogenic Causes

7 - Water Degradation

مقدمه

و کاربردی و شرایط محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی حاکم بر بیابانهای ایران تدوین شده است. در این روش عوامل مؤثر در بیابان‌زایی اعم از انسانی، محیطی و شاخصهای بیابان‌زایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به صورت ترازوی وزنی عامل اصل مؤثر در بیابان‌زایی مشخص می‌گردد و شدت بیابان‌زایی ارزیابی و در نهایت نقشه وضعیت فعلی بیابان‌زایی ترسیم می‌شود. عمدتاً بدلیل نبود اطلاعات کافی در مقاطع زمانی گذشته و مقایسه زمان کنونی با مقاطع گذشته منحصراً نمی‌توان جنبه‌هایی نظری سرعت، وضعیت، استعداد طبیعی (پتانسیل بالقوه) و خطر بیابان‌زایی را بررسی نمود (مشکوه، ۱۳۷۷). بنابراین در منطقه مورد مطالعه فقط جنبه وضعیت بیابان‌زایی (پتانسیل بالفعل) بیابان‌زایی مورد بررسی قرار گرفته و محصول این نهایی آن تهیه نقشه وضعیت بالفعل بیابان‌زایی است. روش مذکور در سطحی بالغ بر ۱۰ میلیون هکتار از اراضی ایران مرکزی از جنوب اصفهان تا جنوب سیرجان اجرا شده است (اختصاصی و مهاجری، ۱۳۷۴). به طورکلی این روش دارای چهار مرحله است: ۱- تعیین و تفکیک نوع محیط بیابانی ۲- تعیین عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی ۳- برآورد شدت بیابان‌زایی ۴- تهیه نقشه بیابان‌زایی.

تاکنون تعدادی از محققان کشور از این روش برای ارزیابی بیابان‌زایی در مناطق مختلف ایران استفاده کرده‌اند. عباس آبادی (۱۳۷۸) مدل منطقه‌ای را با استفاده از مدل ICD جهت ارزیابی کمی وضعیت فعلی و خطر بالقوه بیابان‌زایی در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دشت آق قلا گمیشان ارائه نمود (عباس آبادی، ۱۳۷۸). (جعفری، ۱۳۸۰) با استفاده از روش ICD و فائز یونپ^۱ در قالب

رشد فزاینده جمعیت از یک طرف و افزایش شدت بهره‌برداری از طرف دیگر روز به روز به وسعت مناطق بیابانی جهان می‌افزاید، از این رو تاکنون جامعه جهانی به هیچ وجه بصورت فعلی درگیر بحران‌های اکولوژیکی مربوط به بیابان‌زایی نبوده است (جعفری، ۱۳۸۰). بنابراین زمان آن رسیده که از گذشته پند گرفته و راه جدیدی برای مقابله با این معضل در پیش بگیریم، اما این عمل ملزم به شناخت و درک صحیحی از عوامل و فرایندهای بیابان‌زایی و ارزیابی کمی بیابان‌زایی است تا از نتایج این شناخت و درک در بخش برنامه‌ریزی، جهت مدیریت و کنترل بیابان‌زایی استفاده گردد (درویش، ۱۳۷۹). جستجو و بررسی در منابع قابل دسترس از کشورهای چین، ترکمنستان، هند و ... نشان می‌دهد که هر کدام از این کشورها با توجه به ساختارهای اکولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی خود الگوهای جداگانه‌ای برای طبقه‌بندی بیابانها و برآورد شدت بیابان‌زایی در آن مناطق طراحی نموده و مورد استفاده قرار می‌دهند ولی بیشتر آنها در درجه اول برای بررسی در همان کشور ارائه شده و با وضعیت آب و هوایی و زئومورفولوژی و شرایط زیستمحیطی همان منطقه مطابقت و سازگاری دارد (قره چلو و عبدالآبادی، ۱۳۸۳). همین موضوع باعث می‌شود که استفاده از این روشها در کشور ما و نیز کشورهایی که از این مدلها قصد دارند استفاده کنند به علت شرایط اکولوژیکی مختلف با مشکل مواجه شده و یا بصورت دقیق و کاربردی نتوان از آنها استفاده کرد، بر همین اساس روش طبقه‌بندی شدت بیابان‌زایی در ایران توسط محمدرضا اختصاصی و سعید مهاجری در سال ۱۳۷۴ ارائه شد (اختصاصی و مهاجری، ۱۳۷۴). روش ICD براساس نیازهای مطالعاتی، ساختاری

ارزیابی وضعیت فعلی بیابانزایی با استفاده از...

۴۰۴

ارتفاعی به میزان ۱۱۳۶ متر را دارا می‌باشد. میانگین بارندگی سالانه منطقه ۸۵/۵ میلی متر و اقلیم منطقه به روش دومارتمن اصلاح شده خشک و سرد می‌باشد. تنوع خاکها در منطقه کم و از نظر تکامل پروفیلی دارای خصوصیات کم و بیش مشابه هستند. بیشترین تغییرات خاک از قسمت جنوب (منطقه کوهستانی) به سمت شمال (منطقه دشتی) مشاهده می‌شود. به طور کلی خاکهای منطقه در قسمت ارتفاعات در رده (Entisols) و زیر رده (Orthents) قرار می‌گیرند. در دشتسر لخت خاکها به دلیل عمق کافی و دارا بودن رژیم حرارتی اریدیک در زیر گروه (Lithic Torriorthents) و در دشتسر اپاندائز به دلیل وجود افق‌های زیر سطحی در رده (Aridisols) و گروه بزرگ (Gypsic Haplosalids) طبقه‌بندی می‌شوند. خاکهای این منطقه در رده (Entisols) و بدلیل سبک بودن بافت سطحی در زیر رده (Psamments) قرار می‌گیرند (قره چلو و عبدالآبادی، ۱۳۸۳).

روش تحقیق


برای انجام این تحقیق مراحل زیر انجام گردیده است. ابتدا به کمک نقشه توپوگرافی و تصاویر ماهواره‌ای محدوده منطقه مطالعاتی مشخص و نقشه آن تهیه شد و سپس اقدام به جمع‌آوری اطلاعات پایه (هواشناسی، خاک‌شناسی، زمین‌شناسی، منابع آب و ...) و نقشه‌های موجود گردید. داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده وارد محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شدند و با استفاده از نرم‌افزارهای Arcview و ILWIS نقشه‌های پایه مورد نیاز با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه گردید.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد به تهیه نقشه بیابانزایی منطقه کاشان پرداخت. (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴) روش طبقه‌بندی بسط یافته بیابانزایی در ایران^۱ (MICD) را برای ارزیابی شدت بیابانزایی ناشی از فرسایش بادی در عرصه‌های با کاربری مختلف شامل اراضی جنگلی و مرتعی، اراضی کشاورزی، اراضی فاقد کاربری از دو جنبه وضعیت فعلی و وضعیت طبیعی ارائه کرد. (احمدی و همکاران، ۱۳۸۲) عوامل مؤثر در وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه بیجار را مورد بررسی قرار دادند و یک مدل منطقه‌ای ارائه نمودند و نتیجه گرفتند که عامل انسانی نقش مهمتری نسبت به عامل محیطی در وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه دارد. (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴) وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه مهریز یزد را با استفاده از مدل ICD و MICD مورد بررسی قرار دادند و نقشه بیابانزایی تهیه کردند. (چمن پیرا و همکاران، ۱۳۸۵) وضعیت فعلی بیابانزایی را در حوزه آبخیز کوه‌دشت با استفاده از مدل ICD مورد بررسی قراردادند. این تحقیق با هدف ارائه تصویری گویا و مشخص از وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه و تعیین معیارها و شاخصهای مؤثر در بیابانزایی در منطقه خضرآباد- همتآباد یزد انجام شده است.

مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه

منطقه خضرآباد - همتآباد از ۵ زیرحوزه مستقل و یک زیرحوزه غیرمستقل تشکیل شده است که مساحتی بالغ بر ۲۴۲/۴۵ km² را شامل می‌شود (شکل ۱). بالاترین ارتفاع این منطقه ۳۲۸۵ متر و پست‌ترین قسمت آن



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه

شدند. براساس روش برآورد تولید، نقشه تیپ‌بندی گیاهی و تراکم پوشش گیاهی با بازبینی‌های مکرر و ترانسکت‌گذاری تهیه گردید.

برای تهیه نقشه‌های شدت فرسایش آبی و بادی به عنوان عامل طبیعی مؤثر در بیابان‌زایی از روش‌های پسیاک^۲ و اریفر^۳ استفاده شد.


منطقه مورد مطالعه با تلفیق نقشه‌های ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی و سایر چشم‌اندازهای بیابانی به ۸ واحد همگن بیابانی تفکیک که عبارتند از: مناطق کوهستانی، دشت‌سر لخت، دشت‌سر اپانداز، اراضی رسی، تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای، مناطق صنعتی، اراضی کشاورزی دشتی، باغها و اراضی کوهستانی (شکل ۲).

2- PSIAC

3- IRIFR (Iranian Research Institute Forest and Range Lands)

نقشه زمین‌شناسی منطقه با کمک نقشه‌های سنگ‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ و فتوژئولوژی مجدد، توسط بازبینی‌های مکرر تصحیح و تهیه گردید. با استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی، مرفوولوژی مقدماتی، شب، جهت، ارتفاع، رخساره‌های ژئومورفولوژی و تصاویر ماهواره‌ای ETM^{۱+} سال ۲۰۰۲ میلادی نقشه ژئومورفولوژی منطقه تهیه گردید (شکل ۲). با استفاده از نقشه‌های ژئومورفولوژی و تفسیر تصاویر ماهواره‌ای بصورت بصری و دیگر اطلاعات پایه اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی گردید. در این نقشه واحد مناطق حفاظت شده، اراضی کشاورزی و روستایی، مناطق صنعتی، مراعع بیابانی، جنگلهای دست‌کاشت و اراضی فاقد کاربری به عنوان کاربریهای متفاوت در منطقه از یکدیگر تفکیک

1 - Enhanced Thematic Mapper (ETM+)



شکل ۲- تعدادی از واحدهای همگن بیابانی منطقه مورد مطالعه

(۱- اراضی رسی شلجمی شکل ۲- دشت سر لخت ۳- پهنه‌های ماسه‌ای به همراه کلوتکها ۴- دشت سر اپاندراز)

بیابانزایی در ۵ کلاس آرام، کم، متوسط، زیاد و شدید طبقه‌بندی می‌گردد (جدول ۲). درنهایت، با مشخص شدن فاکتورهای فوق در هر واحد بیابانی نقشه‌ای ترسیم می‌گردد که بیانگر وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه می‌باشد.

نتایج

در منطقه مورد مطالعه امتیازدهی ۸ واحد همگن بیابانی تغییک شده است. ویژگیهای مربوط به هر کدام و امتیاز حاصل از ارزیابی وضعیت بیابانزایی در جدولهای زیر خلاصه شده است.

- واحد همگن بیابانی اراضی کوهستانی^۱: اراضی با رخساره توده‌سنگی و سازندهای زمین‌شناسی گرانیت، آهک و به عبارتی کلیه سازندهای قبل از کوارترنر (Qt) هستند. مساحت این واحد برابر با $26/24 \text{ km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد (جدول ۳).

در مرحله بعد عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابانزایی در هر واحد همگن بیابانی مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت. در جدول ۱ عوامل اصلی و فرعی مؤثر در امتیازدهی و دامنه امتیاز آنها خلاصه شده است.

شاخصهایی همچون اشکال و شدت فرسایش و یا امکان برگشت‌پذیری و یا بازسازی اکوسیستم می‌تواند در برآورد دقیق‌تر شدت تخریب اراضی مؤثر باشد، در این مرحله نیز علاوه بر عوامل محیطی و انسانی با استفاده از مطالعات پایه فرسایش و رسوب و قابلیت اراضی دو شاخص مؤثر در تعیین شدت بیابانزائی شامل شدت فرسایش و رسوب‌دهی اراضی و امکان برگشت‌پذیری و بازسازی اکوسیستم یا بیابانزدایی براساس چهار سطح مختلف امتیازبندی شده در جدول ۵ مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت.

سپس با جمع کل امتیازهای کسب شده از عوامل طبیعی (E) و عوامل انسانی (A) مؤثر در بیابانی شدن منطقه و همچنین شاخصهای شدت بیابانزایی (I)، شدت

جدول ۱- برآورد امتیاز شدت بیابان‌زایی اراضی در ایران (اختصاصی و مهاجری، ۱۳۷۴)

امتیاز	۷-۱۰	۴-۷	۲-۴	۰-۲	عوامل اصلی	عوامل فرعی	عوامل محیطی مؤثر در بیابان‌زایی (Antropogenic causes of desertification)	
امتیاز	۷-۱۰	۴-۷	۲-۴	۰-۲	(۵) زئولوژی	(۴) توپوگرافی (t)	(۳) خشکسالی (dr)	(۲) بارندگی
- اقلیم فراخشک بارندگی سالانه کمتر از ۷۰ میلیمتر بازدید کاهش بیوماس کمبود بارندگی است	- اقلیم خشک، بارندگی سالانه بیشتر از ۷۰ میلیمتر و کمتر از ۲۵۰ میلیمتر و کمتر از ۵۰۰ میلیمتر	- اقلیم نیمه خشک، بارندگی سالانه بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر و کمتر از ۵۰۰ میلیمتر	- دوره خشکسالی نسبتاً زیاد و تأثیر آن منفی در پوشش گیاهی و محصولات دیم نسبتاً زیاد محسوس می‌باشد.	- دوره خشکسالی محدود و تأثیر آن در کاهش پوشش گیاهی و دیمزارها است.	- اراضی کوهستانی و تپه ماهوری با دامنه منظم و با شیب کمتر از ۲۰٪ فاقد محدودیت توپوگرافی استفاده‌های کشاورزی مرتعی و چنگلداری	- کوهستانی با دامنه نامنظم، (توده سنگی)، در صد فاقد محدودیت شیب ۱۰۰-۴۰٪ یا محدودیت توپوگرافی توپوگرافی مرتع داری و جنگل داری ولی دارای محدودیت کشاورزی	- کوهستانی با شیب بسیار تندری با محدودیت شدید توپوگرافی برای استقرار گیاه و افزایش بیوماس	- مناطق کوهستانی و صخره‌ای با شیب بسیار تندری با محدودیت شدید توپوگرافی برای استقرار گیاه و افزایش بیوماس
امتیاز	۷-۱۰	۴-۷	۲-۴	۰-۲	(۴) زئولوژی	(۳) توپوگرافی (t)	(۲) خشکسالی (dr)	(۱) بارندگی
- فاقد انباشته‌های مناسب خاکهای جوان و تحول خاک و رطوبت جهت استقرار گیاه محدودیت کمی (qt) مناطق صخره‌ای- ماسه‌ای و مخروط افکنه جوان و ...	- خاکهای جوان و تحول خاکهای با ذخیره رطوبتی محدود تپه‌ای، ماسه‌ای و واریزه‌های ثبت نشده روان و فعل	- خاکهای با ذخیره رطوبتی تکامل یافته با ذخائر رطوبتی مناسب	- خاکهای نسبتاً تکامل یافته با ذخائر محدودیت کمی (qt)	- خاکهای سنگ‌شناسی نسبتاً حساس و املاح دار (مارنی) و شیل و نهشته‌های رسوبی با محدودیت نسبتاً زیاد برای استقرار گیاه و افزایش بیوماس	- واحد سنگ‌شناسی بسیار حساس و املاح دار (مارنی) و شیل و نهشته‌های رسوبی با محدودیت شدید استقرار گیاه و افزایش بیوماس	- واحدهای سنگ‌شناسی نسبتاً حساس و املاح دار با محدودیت نسبتاً زیاد برای استقرار گیاه و افزایش بیوماس	- واحدهای سنگ‌شناسی نسبتاً حساس و املاح دار (مارنی) و شیل و نهشته‌های رسوبی با محدودیت نسبتاً زیاد برای استقرار گیاه و افزایش بیوماس	- واحدهای سنگ‌شناسی نسبتاً حساس و املاح دار (مارنی) و شیل و نهشته‌های رسوبی با محدودیت نسبتاً زیاد برای استقرار گیاه و افزایش بیوماس

امتیاز	۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰	عوامل اصلی	عوامل فرعی	عوامل محیطی مؤثر در بیابانزایی (Antropogenic causes of desertification) و چگونگی برآورد امتیاز هر یک
							- منابع آب و خاک بسیار شور و با خاک بسیار خاک و آب سطحی نسبتاً منابع آب و خاک فاقد منابع آب و خاک نسبتاً شور یا گچی شور همراه گونه های سنگین و رسی (اراضی) شور پسند - خاک های گچی آهکی با ذخائر رطوبتی هرگونه محدودیت کیفی جهت سنگفرشی و ... مانع اصلی آهکی با ذخائر رطوبتی متوسط استقرار گیاه و افزایش بیوماس متوسط عدم استقرار گیاه در حال حاضر
	۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰			محدودیت کیفی (qI)
							- وضعیت رویشگاه وضعیت رویشگاه فقیر، متوسط، گونه های مهاجم گونه های مهاجم ۵-۲۰ درصد ترکیب درصد ترکیب گیاهی گیاهی قطع بوته ها و درختان قطع بوته ها و درختها زیاد و کاملاً محسوس نسبتاً زیادتر از بیوماس سالانه چرای بیش از ظرفیت و بی برنامه چرا کمی زیادتر از تولید الگوهای کاشت در حال الگوهای کاشت با شرایط تغییر و غیر منطبق با الگوهای کاشت با شرایط نامناسب با شرایط منطقه و شرایط منطقه و افت تولید منطقه نسبتاً زیاد نسبتاً زیاد و افت تولید کم است
	۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰			- وضعیت رویشگاه خیلی قطع بوته ها و قطع بوته ها و درختان گونه های مهاجم بیش از ۵٪ ٪۵۰ ترکیب گیاهی قطع بی رویه و چندبرابر ظرفیت مرتع در حال حاضر بی برنامه چرا کمی زیادتر از تولید الگوهای کاشت در حال الگوهای کاشت با شرایط تغییر و غیر منطبق با الگوهای کاشت با شرایط نامناسب با شرایط منطقه و شرایط منطقه و افت تولید منطقه نسبتاً منطبق می باشد و افت تولید کم است
							- افت سفره آبی نسبتاً زیاد، - افت سفره آبی کمتر از - بین ۱۰-۲۰ سانتیمتر ۱۰ سانتیمتر در سال - افت سفره آبی در تغییر الگوی کاشت و کاهش شادابی و افت محصولات شادابی گونه های مرتعی شادابی آبیاری و موجب افزایش محصول می گردد. جنگل کاریها مؤثر بوده است شیوه های آبیاری و مناسب ولی نیاز به کترل آبهای سطحی نا مناسب و نیاز به کترول و اصلاحات دارد. اصلاح دارند.
	۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰			- افت شدید سفره های آبی به علت پمپاژ و مصرف بی رویه آب بیش از ۲۰ سانتیمتر در سال - افت سفره آبی در کاهش تولیدات مرتعی و کشاورزی بسیار مؤثر است. شیوه های استحصال آبهای سطحی و آبیاری غلط و نامناسب با شرایط محیطی اصلاح دارند.

عوامل فرعی	عوامل محیطی مؤثر در یابان‌زایی (Antropogenic causes of desertification) و چگونگی برآورد امتیاز هر یک	عوامل اصلی		
- تبدیل اراضی و توسعه شهری منطبق با نیازها جنگلی و مرتعی دیده نمی‌شود.	- تبدیل اراضی به منظور کشاورزی و یا توأم با کاهش بیوماس مراتع به سایر کاربریها	- تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به شهری و کشاورزی		
- آثاری از تبدیل اراضی شنگلی و مرتعی دیده نمی‌شود.	- تبدیل بی‌رویه جنگلها و شنگلی و مرتعی به منظور کشاورزی و یا توأم با کاهش بیوماس	- تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به شهری و کشاورزی		
- شخم و تناوب زراعی به خوبی رعایت می‌شود.	- تولید طبیعی شنگل و مرتعی - شخم بی‌رویه آیشهای نامناسب - آیشهای طولانی مدت	(Ch)		
- شخم غلط و آیش شخم غلط و بی‌رویه خاک	- شخم بی‌رویه آیشهای نسبتاً خوب	(PL)		
۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰	امتیاز
کم (نرمال) فاقد آثار فرسایش بادی فاقد آثار فرسایش بادی - شورشده قابل ملاحظه نمی‌باشد.	متوسط - آثار بادبردگی زیاد - آثار بادبردگی کم تا متوسط کلوتک و یارانگ بعضًا نکا دیده می‌شود - نبکاهای پراکنده - تپه‌های نیم فعل، تجمع سنگریزه‌ها خاک کاملاً سنگفرشی و در سطح خاک زیاد، گالی پایدار نیم فعل تا فعل، فرسایش فرسایش ورقه‌ای یا شیاری، شیاری و ورقه‌ای نسبتاً متوسط تا کم، آثار فرسایش زیاد، سور و قلیانی شدن آبی محدود	زیاد - آثار بادبردگی زیاد - آثار بادبردگی کم تا متوسط کلوت پارانگ بعضًا نکا دیده می‌شود - نبکاهای پراکنده - تپه‌های نیم فعل سنگریزه در سطح گالی‌های فعل و متراکم - ورقه‌ای و شیاری بشدت در حال شورشدن و قلیانی شدن	شدید - آثار بادبردگی شدید - کلوت پارانگ نیما - تپه‌های ماسه‌ای فعل تشدید سنگریزه در سطح افزایش شوری (Sa)	- شدت فرسایش - فرسایش بادی - فرسایش آبی - افزایش شوری (S.e)
۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰	امتیاز
- بیابان‌زدایی به کمک عمليات مکانیکی، بیولوژیکی و با هزینه زیاد - با اعمال مدیریت صحیح عملیات بیولوژیکی با هزینه بیابان‌زدایی خود به خود کم امکان پذیر است.	- بیابان‌زدایی (افزایش بیوماس گیاهی) بسیار مشکل و یا غیرممکن و غیرقابل توجیه اکولوژیکی	- اقدامات مورد نیاز بیابان‌زدایی (a.a)		
عملیات بیابان‌زدایی تاکنون - نیازی به عملیات بیابان‌زدایی نداشته است.	- امکان پذیر است. - عملیات انجام شده نسبتاً موفق بوده است.	- عملیات انجام شده - اقتصادی - عملیات بیابان‌زدایی (a.a)		
۰-۲	۲-۴	۴-۷	۷-۱۰	امتیاز

جدول ۲- دامنه امتیازات و کلاس‌بندی شدت بیابان‌زایی به روشن ICD

علامت	امتیاز	بیابان‌زائی
I	۰-۱۵	آرام (پنهان)
II	۱۵-۳۰	کم
III	۳۰-۴۵	متوسط
IV	۴۵-۶۰	زیاد
V	۶۰-۸۰	شدید (اوج)

جدول ۳- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی واحد همگن بیابانی (B(m)، در منطقه کوهستانی

جمع عددی عوامل	مقدار عددی	عوامل مؤثر		عامل اصلی	نوع عامل
		عامل فرعی	عامل اصلی		
14	6	Cu	p.d	عوامل انسانی	عوامل انسانی
	6	I	w.d		
	2	-	l.a		
17	7	r	C	عوامل محیطی	عوامل محیطی
	3	G	G		
	7	Qt	Q		
4	2	e.w	s.e	شاخص بیابان‌زایی	شاخص بیابان‌زایی
	2	-	a.a		
	35	III	متوسط		
		شدت تخریب			

جدول ۴- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی واحد همگن بیابانی (R.C)، در دشت سر لخت

جمع عددی عوامل	مقدار عددی	عوامل مؤثر		عامل اصلی	نوع عامل
		عامل فرعی	عامل اصلی		
15	8	cu	p.d	عوامل انسانی	عوامل انسانی
	3	Pu	w.d		
	4	-	l.a		
16	7	r	C	عوامل محیطی	عوامل محیطی
	6	T	G		
	3	qt	Q		
4	2	w.e	s.e	شاخص بیابان‌زایی	شاخص بیابان‌زایی
	2	-	a.a		
	35	III	متوسط		
		شدت تخریب			

طبقه‌بندی شده و دارای سازند رسوبی درشت (Qt2) و سنگفرش بیابانی می‌باشد. مساحت واحد برابر با $42/45 \text{ km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد (جدول ۴).

- واحد همگن بیابانی دشت سرلخت^۱: این واحد بیابان از نظر رخساره ژئومورفولوژی به عنوان دشت سر لخت

1 -Bareland. Reg.course

قرار گرفته و با واحدی به نام اراضی رسی و شلجمی شکل جدا شده است. این واحد دارای رسوبات آبرفتی جوان (Qt3) می‌باشد که بر روی آن آثار کلوتک مشاهده می‌شود، ولی در طی عملیات پروژه‌های بیابان‌زدایی و مبارزه با مناطق برداشت فرسایش بادی اقدام به تاغکاری شده است که هم‌اکنون در منطقه جنگلهای دست‌کاشت تاغ دیده می‌شود. مساحت این واحد برابر $18/21 \text{ km}^2$ می‌باشد (جدول ۶).

- واحد همگن بیابانی دشت سراپانداز^۱: این واحد بیابان با توجه به رخساره ژئومورفولوژی دشت‌سر اپانداز نامیده می‌شود، در نقشه کاربری اراضی در واحد مرتع بیابانی قرار گرفته و دارای سازند کوارتز (QtI) است و منطقه پوشیده از سنگفرش متوسط می‌باشد. مساحت این واحد $76/78 \text{ km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد (جدول ۵)

- واحد همگن بیابانی اراضی رسی^۲: این واحد بیابانی از نظر رخساره ژئومورفولوژی در اراضی دشت‌سر پوشیده

جدول ۵- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی واحد همگن بیابانی (B(R.m) در دشت‌سر اپانداز

جمع عددی عوامل	مقدار عددی	عوامل مؤثر		عامل اصلی	نوع عامل
		عامل اصلی	عامل فرعی		
18	7	Cu		p.d	عوامل انسانی
	8	Pu		w.d	
	3	—		l.a	
	8	r		C	
	2	—		G	عوامل محیطی
	6	Qt		Q	
	3	—		s.e	
5	2	—		a.a	شاخص بیابان‌زایی
39		III		متوسط	
					شدت تخریب

جدول ۶- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی واحد همگن بیابانی (C.B)، در اراضی رسی

جمع عددی عوامل	مقدار عددی	عوامل مؤثر		عامل اصلی	نوع عامل
		عامل اصلی	عامل فرعی		
13	2	cu		p.d	عوامل انسانی
	9	pu		w.d	
	2	pl		l.a	
	9	R		C	
18	2	—		G	عوامل محیطی
	7	ql		Q	
	9	w.e		s.e	
	6	—		a.a	شاخص بیابان‌زایی
15		IV		زیاد	شدت تخریب
46					

1- Bare land .Reg mediumB (R.m)

2- Bare land. clay

جدول ۷- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابانزایی در واحد همگن بیابانی تپه‌های ماسه‌ای (B.s.d)

نوع عامل	عامل اصلی	عوامل مؤثر		جمع عددی عوامل	مقدار عددی
		عامل فرعی	عامل اصلی		
عوامل انسانی	p.d	Pa	Pa	۷	۷
	w.d	Pu	Pu	۷	۷
	l.a	—	—	۶	۶
	C	R	R	۱۰	۱۰
عوامل محیطی	G	G	G	۸	۸
	Q	Qt	Qt	۶	۶
	s.e	w.e	w.e	۹	۹
شاخص بیابانزایی	a.a	—	—	۶	۶
	زیاد	IV	IV	۵۹	
شدت تخریب					

جدول ۸- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابانزایی واحد همگن بیابانی (B.II، مناطق صنعتی

نوع عامل	عامل اصلی	عوامل مؤثر		جمع عددی عوامل	مقدار عددی
		عامل فرعی	عامل اصلی		
عوامل انسانی	p.d	—	—	۱۴	۵
	w.d	—	—	۶	۶
	l.a	—	—	۳	۳
	C	—	—	۹	۹
عوامل محیطی	G	—	—	۱۶	۲
	Q	—	—	۵	۵
	s.e	—	—	۳	۳
شاخص بیابانزایی	a.a	—	—	۹	۶
	متوسط	III	III	۳۹	
شدت تخریب					

ارزش عددی ۲۴ و عامل فرعی (شاخص) عامل بارندگیست که بیشترین ارزش به میزان ۱۰ را کسب نموده است.

- واحد همگن بیابانی مناطق صنعتی^۳: این واحد در نقشه رخساره ژئومورفولوژی تحت عنوان مناطق صنعتی جدا و در نقشه کاربری اراضی تحت عنوان یک واحد یا

- واحد همگن بیابانی تپه‌ها و پهنه‌های ماسه‌ای^۱: این واحد دارای اراضی ماسه‌ای می‌باشد و بر روی پهنه‌های ماسه‌ای زیبارها و جنگلهای دست‌کاشت^۲ تاغ مشاهده می‌شود، وسعت این واحد برابر با $26/47 \text{ km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد. هر دو تیپ تپه‌های ماسه‌ای و پهنه‌های ماسه‌ای به عنوان یک واحد در نظر گرفته شده است (جدول ۷). در این جدول عامل اصلی (معیار) اقلیم، با

جوان (Qt3) می‌باشد که در نقشه‌های رخساره و کاربری تحت عنوان یک واحد مشترک هستند، ولی در مطالعات وضعیت بیابان‌زایی تحت دو واحد بیابانی جداگانه مجزا شده‌اند و مساحت واحد اراضی کشاورزی دشته برابر با $26/24 \text{ km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد. با توجه به اینکه این منطقه دارای امتیاز جداگانه‌ای از نظر وضعیت بیابان‌زایی می‌باشد؛ در طبقه متفاوتی نسبت به اراضی کشاورزی کوهستان قرار می‌گیرد (جدول ۹).

سایت صنعتی تفکیک شده است. منطقه صنعتی کارخانه فولاد آلیاژی با مساحت $1/45 \text{ km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد که در منطقه دشت‌سر اپانداز واقع شده است. این منطقه به صورت مجزا مطالعه شده و دارای یک امتیاز بیابان‌زایی است و در یک طبقه وضعیت بیابان‌زایی قرار می‌گیرد (جدول ۸).

- واحد همگن بیابانی اراضی کشاورزی دشته^۱: این واحد با واحد اراضی کوهستانی دارای سازند آبرفتی

جدول ۹- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی واحد همگن بیابانی (AP(I)، در اراضی کشاورزی دشته

جمع عددی عوامل	مقدار عددی	عوامل مؤثر		عامل اصلی	نوع عامل
		عامل فرعی	عامل اصلی		
17	4	pa	p.d	عوامل انسانی	عوامل انسانی
	7	pu	w.d		
	6	—	l.a		
	9	r	C		
18	4	—	G	عوامل محیطی	عوامل محیطی
	5	ql	Q		
	7	—	s.e		
11	4	—	a.a	شاخص بیابان‌زایی	شاخص بیابان‌زایی
46		IV	zیاد		
				شدت تخریب	

برابر با $2/84 \text{ Km}^2$ کیلومتر مربع می‌باشد و کلیه مناطق با شرایط مشابه این واحد دارای یک امتیاز بوده و در یک طبقه وضعیت فعلی بیابان‌زایی قرار می‌گیرند (جدول ۱۰).

تجزیه و تحلیل معیارها، عوامل و شدت بیابان‌زایی منطقه مورد مطالعه بصورت متوسط وزنی در جدول‌های ۱۱ و ۱۲ و شکل ۳ ارائه شده است.

درجه‌بندی و کلاس‌بندی عوامل بیابان‌زایی با استفاده از اطلاعات جدول ۱۲ به صورت زیر انجام گردیده است:

- واحد همگن بیابانی اراضی کشاورزی کوهستانی^۲: این واحد شامل اراضی کشاورزی و باغهای اطراف روستا در منطقه واحد کوهستانی حوزه است که در کنار رودخانه و آبرفت‌های جوان (Qt3) واقع شده است. این واحد در نقشه کاربری اراضی، با مناطق روستایی^۳ مشترک در یک سایت قرار گرفته‌اند، زیرا مناطق مسکونی به صورت پراکنده و در امتداد زمینهای کشاورزی قرار گرفته‌اند که در این مقیاس قابل تفکیک نیستند، بنابراین به عنوان یک واحد مشترک در کاربری تلقی شده‌اند. مساحت این واحد بیابانی در حوزه مورد مطالعه

1- Agricultural Irrigation plain

2- Agriculture irrigation Mountain

3-Rural Area

جدول ۱۰- امتیازدهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر در بیابان‌زایی واحد همگن بیابانی (Am(I)، در باغها و اراضی کوهستانی


نوع عامل	عامل اصلی	عوامل مؤثر	مقدار عددی	جمع عددی عوامل
		عامل فرعی		
عوامل انسانی	p.d	Cu	4	
	w.d	I	6	13
	l.a	—	3	
عوامل محیطی	C	—	5	
	G	g.t	6	16
	Q	Qt	5	
شاخص بیابان‌زایی	s.e	w.e	2	
	a.a		1	3
شدت تخریب	متوسط	III		32

جدول ۱۱ - تجزیه و تحلیل فرایندها، عوامل و شدت پیابانزایی در حوزه خضر آباد - همت آباد

واحد مکانی پیمانه	جلسه و آندر سنگ	فن کاربری	مؤثر در پیمانه انسانی	مؤثر در پیمانه محضی	شاخصهای مؤثر در	ارزش کمی	معیار غالب و شخص	ارزش عددی	قدرت پیمانه ازش	کلاس پیمانه ازش	(شدت)
۱- منطقه کوهستانی	آهک و گرانیت	واحد کوهستان و مناطق حفاظت شده	۱۵	۱۶	پیمانه ازش	۴	بوته کنی p.d(cu)	۸	۳۵	III متوسط	
۲- دشت سر لخت	آبرفت کواترنر	مراعع پیمانی	۱۴	۱۷	پیمانه ازش	۴	C(r) بارندگی و اقلیم	۷	۳۵	III متوسط	
۳- دشت سر اپاندراز	آبرفت کواترنر	مراعع پیمانی	۱۸	۱۶	پیمانه ازش	۵	بارندگی و اقلیم c(r)	۸	۳۹	III متوسط	
۴- اراضی رسی	آبرفت جوان	جنگل و مرتع بیانی و کشاورزی	۱۳	۱۸	پیمانه ازش	۱۵	w.d (pu) افت سفره و برداشت	۹	۴۶	IV زیاد	
۵- تپه های ماسه ای	رسویات کواترنر	اراضی متفرقه	۲۰	۲۴	پیمانه ازش	۱۰	بارندگی و اقلیم c(r)	۱۰	۵۹	IV زیاد	
۶- مناطق صنعتی	آبرفت کواترنر	مناطق صنعتی	۱۴	۱۶	پیمانه ازش	۹	بارندگی و اقلیم c(r)	۹	۳۹	III متوسط	
۷- اراضی کشاورزی دشتی	آبرفت کواترنر	کشاورزی دشتی	۱۷	۱۸	پیمانه ازش	۱۱	بارندگی و اقلیم c(r)	۹	۴۶	IV زیاد	
۸- اراضی کشاورزی کوهستانی	آبرفت جوان	باغها و اراضی کوهستان	۱۳	۱۶	پیمانه ازش	۳	افزایش سطح ایستابی و آبیاری غلط	۶	۳۲	III متوسط	

جدول ۱۲ - ارزیابی و کلاس‌بندی وضعیت فعلی بیابان‌زایی براساس میانگین وزنی عوامل در حوزه خضرآباد- همت‌آباد

واحد همگن بیابانی	مساحت Km^2	ارزش عوامل انسانی	ارزش عوامل محیطی	ارزش کمی شاخصهای بیابان‌زایی	ارزش کمی شدت بیابان‌زایی	ارزش کمی شاخصهای بیابان‌زایی	ارزش کمی شدت	ارزش کمی شاخص غالب
۱- منطقه کوهستانی	۴۷/۹	۱۵	۱۶	۴	۳۵	۳۵	۸	۸
۲- دشت‌سر لخت	۴۲/۴۵	۱۴	۱۷	۴	۳۵	۳۵	۷	۷
۳- دشت‌سر اپانداز	۷۶/۷۸	۱۸	۱۶	۵	۳۹	۴۶	۸	۸
۴- اراضی رسی	۱۸/۳۱	۱۳	۱۸	۱۵	۴۶	۴۶	۹	۹
۵- تپه‌های ماسه‌ای	۲۶/۴۷	۲۰	۲۴	۱۵	۵۹	۵۹	۱۰	۱۰
۶- مناطق صنعتی	۱/۴۵	۱۴	۱۶	۹	۳۹	۳۹	۹	۹
۷- اراضی کشاورزی دشتی	۲۶/۲۴	۱۷	۱۸	۱۱	۴۶	۴۶	۹	۹
۸- اراضی کشاورزی	۲/۸۴	۱۳	۱۶	۳	۳۲	۳۲	۶	۶
کوهستانی								
جمع	۲۴۲/۴۵							
متوسط وزنی ارزش عوامل و شدت بیابان‌زایی	۱۶/۳۷	۱۷/۳۹	۷/۱۲	۴۰/۹	۸/۲	-	-	-



شکل ۳- مقایسه عوامل و شاخصهای بیابان‌زایی در واحدهای همگن بیابانی در منطقه خضرآباد- همت‌آباد

جدول ۱۳- برآورد شدت بیابان‌زایی براساس میانگین وزنی عوامل محیطی و انسانی

شدید	زیاد	متوسط	کم	شدت بیابان‌زایی
۲۱/۱-۳۰	۱۲/۱—۲۱	۷/۱-۱۲	۰-۶	امتیاز
IV	III	II	I	کلاس
	۱۷/۳۹			ارزش عوامل محیطی
	۱۶/۳۷			ارزش عوامل انسانی

جدول ۱۴- برآورد شدت بیابان‌زایی براساس میانگین شاخصهای بیابان‌زدایی

شدید	زیاد	متوسط	کم	شدت بیابان‌زایی
۱۴/۱-۲۰	۸/۱-۱۴	۴/۱-۸	۰-۴	امتیاز
IV	III	II	I	کلاس
		۷/۱۲		ارزش شاخصهای بیابان‌زدایی


A (عامل انسانی) > (III - ۱۷/۳۹) (E) (عامل محیطی)
 (III - ۷/۱۲) I (III) (شاخص بیابان‌زایی) > (III - ۱۶/۳۷)
 براساس نتایج جدولهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، و ۱۴ عامل
 محیطی مؤثر در بیابان‌زایی منطقه با میانگین وزنی ۱۷/۳۹
 در کلاس III قرار گرفته است و عوامل انسانی موجود در
 منطقه با کسب میانگین وزنی ۱۶/۳۷ نیز در کلاس III
 قرار می‌گیرد. طبق امتیازهای بدست آمده عامل محیطی
 دارای تأثیر بیشتری در روند بیابان‌زایی در منطقه موردن
 مطالعه می‌باشد و عامل انسانی در درجه بعدی حائز
 اهمیت است. بنابراین اصلی‌ترین عامل بیابان‌زایی در
 منطقه خضرآباد - همت آباد، عامل محیطی است.

عوامل اصلی مؤثر در بیابان‌زایی منطقه خضرآباد - همت آباد
 برای تشخیص عوامل اصلی مؤثر در بیابان‌زایی از
 جدولهای ۱۱ و ۱۲ استفاده شد. داده‌های این جدولها و
 امتیازهای عوامل محیطی، عوامل انسانی و شاخصهای
 بیابان‌زایی موجود در منطقه در هر یک از واحدهای
 همگن بیابانی تجزیه و تحلیل و مقایسه شد. درنتیجه
 مشاهده گردید که عامل محیطی دارای تأثیر بیشتری در
 روند بیابان‌زایی در بیشتر واحدهای بیابانی منطقه خضرآباد
 می‌باشد (شکل ۳).

با توجه به امتیاز و میانگین وزنی عوامل مختلف مؤثر
 در بیابان‌زایی رابطه زیر مشخص می‌گردد:

جدول ۱۵- محاسبه متوسط وزنی عامل اصلی تخریب منابع آب (w.d)

کد واحد	ارزش کمی عامل اصلی	مساحت (Km ²)	ارزش کمی مساحت
۲	۷	۴۲/۴۵	۲۷۹/۱۵
۳	۸	۷۶/۷۸	۶۱۴/۲۴
۵	۱۰	۲۶/۴۷	۲۶۴/۷
۶	۹	۱/۴۵	۱۳/۰۵
۷	۹	۲۶/۲۴	۲۳۶/۱۶
جمع		۱۷۳/۳۹	۱۴۰/۷/۳
۱	۸	۴۷/۹	۳۸۳/۲
جمع		۴۷/۹	۳۸۳/۲
۴	۹	۱۸/۳۱	۱۶۴/۸
۸	۶	۲/۸۴	۱۷/۰۴
جمع		۲۱/۱۵	۱۸۱/۸۴




$$p.d = \sum A_i * M_i / \sum A_i: 383,2 / 47,9 = 8$$

$$w.d = \sum A_i * M_i / \sum A_i: 1047,3 / 173,39 = 8,12$$

$$(c) = \sum A_i * M_i / \sum A_i: 181,84 / 21,15 = 8,6$$

شکل ۴- مقایسه سهم عوامل اصلی مؤثر در فرایندهای غالب بیابان‌زایی در منطقه خضرآباد- همت‌آباد




شکل ۵- توزیع فراوانی کلاسهای شدت وضعیت فعلی بیابان‌زایی

مشخص می‌شود. به استناد نتایج بدست‌آمده معیار اصلی بیابان‌زایی در منطقه، معیار تخریب منابع آب (W.d) بوده و این فرآیند امتیاز ۸/۱۲ را به خود اختصاص می‌دهد (جدول ۱۵ و شکل ۴).

شناسایی معیارهای غالب در بیابان‌زایی منطقه خضرآباد- همت‌آباد

عامل اصلی یا معیار غالب در بیابان‌زایی منطقه، براساس محاسبه میانگین وزنی عوامل فرعی (شاخصها)



شکل ۶- نقشه وضعیت فعلی بیابانزایی منطقه خضرآباد- همت آباد

واحد کوهستان (m)، واحد دشتسرلخت (B.R.c)، واحد سرپاندشت (B.R.m)، واحد اراضی رسی (c)، واحد تپه‌های

ماسه‌ای (d)، واحد مناطق صنعتی (I)، واحد اراضی کشاورزی دشتی، (I) واحد اراضی کوهستانی (Am(I))

شده در همه واحدهای بیابانی که تمام سطح منطقه را پوشش می‌دهد، پدیده تخریب اراضی و بیابانزایی با درجات مختلف به وجود آمده است و نیز در حال حاضر فعالند (شکل ۶)، به طوری که در هیچ کدام از واحدها کلاس شدت بیابانزایی کمتر از متوسط (III) دیده نمی‌شود و این حکایت از روند بیابانی شدن منطقه در حال حاضر دارد. بنابراین براساس شکل زیر در این حوزه کلاسهای I، II و V مشاهده نشده است و در کل شدت بیابانزایی متوسط (III) غالب می‌باشد (شکل ۵).

بحث

تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج بدست آمده از روش ICD برای تعیین وضعیت بیابانزایی در حوزه

شدت بیابانزایی
براساس تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در این حوزه میانگین وزنی ارزش کمی شدت بیابانزایی (وضعیت فعلی تخریب اراضی) برای کل منطقه براساس عاملهای غالب، ۴۰/۹ برآورد شد که با توجه به جدول ۲ کلاس شدت بیابانزایی برای این حوزه III (متوسط) بدست آمد.

توزیع فراوانی کلاسهای شدت و وضعیت فعلی بیابانزایی

از بررسی توزیع فراوانی کلاسهای شدت وضعیت فعلی بیابانزایی که براساس عاملهای غالب امتیازدهی شده و با برآورد و کلاس‌بندی آن از روش ICD چنین برآمده است که در حال حاضر (در وضعیت فعلی) با مطالعات انجام

صرفه‌جویی در مصرف آب مورد توجه ویژه قرار گیرد.

منابع مورد استفاده

- احمدی، ح. ۱۳۷۸. ژئومورفولوژی کاربردی، جلد دوم (فسایش بادی)، انتشارات دانشگاه تهران، ۵۷۸ صفحه.
- احمدی، ح.، اختصاصی، م.ر. و همتی، ن. ۱۳۸۲. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در شدت بیابان‌زایی و ارائه مدل منطقه‌ای، مجله بیابان، جلد هشتم، شماره ۱۰۲۴-۱۳۴۶.
- احمدی، ح.، ابریشمی، ا. و اختصاصی، م.ر.، ۱۳۸۴. ارزیابی و تهیه نقشه وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده مدل ICD و MICD در منطقه فخرآباد مهریز. مجله بیابان جلد ۱۰.
- اختصاصی، م.ر. و مهاجری، س. ۱۳۷۴. روش طبقه‌بندی نوع و شدت بیابان‌زایی در ایران.
- جعفری، ر. ۱۳۸۰. ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی با تحلیل و بررسی روش UNEP – FAO و ICD پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- چمن پیراء، غ.، زهتابیان، غ. و احمدی، ح. ۱۳۸۵. کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت بیابان‌زایی در حوزه آبخیز کوهدهشت. مجله منابع طبیعی ایران، جلد ۵۹، شماره ۳.
- درویش، م. ۱۳۷۹. نگرشی تحلیلی بر مفاهیم و دانش واژه‌های حوزه ادبیات بیابانی، تحقیقات مرتع و بیابان، شماره ۲. مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور.
- عباس آبادی، م. ۱۳۷۸. ارزیابی کمی بیابان‌زایی در دشت آق‌قلاء جهت ارائه یک مدل منطقه‌ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
- قره چلو، س. و عبدالآبادی، م. ۱۳۸۳. ارزیابی وضعیت فعلی بیابان‌زایی با استفاده مدل ICD در حوزه خضرآباد- همت آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد.
- مجموعه مقالات دومین همایش بیابان‌زایی و روشهای مختلف بیابان‌زدایی. ۱۳۷۵. کرمان، شماره انتشارات ۷۵-۱۳۷۶.
- مشکوه، م. ۱۳۷۷. ارزیابی و تهیه نقشه بیابان‌زایی، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراعع کشور.

حضرآباد - همت آباد نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل مؤثر در بیابان‌زایی، تخریب منابع آب می‌باشد. این نتیجه با نتایج جعفری (۱۳۸۰) در دشت کاشان و چمن پیراء و همکاران (۱۳۸۵) در حوزه آبخیز کوهدهشت مطابقت دارد. بنابراین نتایج بدست‌آمده نشان می‌دهد که پدیده تخریب اراضی و بیابان‌زایی با درجات مختلف به وقوع پیوسته است، به‌طوری‌که در هیچ کدام از واحدها کلاس شدت بیابان‌زایی کمتر از متوسط (III) دیده نمی‌شود و این حکایت از شرایط نگران‌کننده منطقه در حال حاضر دارد. از این رو نتایج نشانگر آنست که ۸۱/۵۳ درصد منطقه دارای شدت بیابان‌زایی متوسط و ۱۸/۴۷ درصد در طبقه شدید بیابان‌زایی قرار دارد. عامل اصلی بیابان‌زایی در سطح ۸۱/۵۳ درصد منطقه مورد مطالعه، عامل محیطی^۱ با میانگین وزنی ۱۷/۳۹ و ۱۸/۴۷ درصد سطح منطقه، تحت تأثیر عامل انسانی^۲ با میانگین وزنی ۱۶/۳۹ می‌باشد. اصلی‌ترین عامل مؤثر در روند بیابان‌زایی منطقه، عامل تخریب منابع آب^۳ (W.d) و شاخص افت سفره می‌باشد که طی سالهای اخیر به‌علت افزایش جمعیت، توسعه صنعتی و تبدیل اراضی کم‌بازده کشاورزی، حفر چاه و بهره‌برداری بیش از حد آبهای زیرزمینی از مهمترین عوامل بیابان‌زایی در حوزه‌های مناطق خشک و کم‌آب از جمله منطقه مورد مطالعه تلقی می‌گردد.

بنابراین پیشنهاد می‌گردد بحث متعادل‌سازی بهره‌برداری از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر الگوهای آبیاری، تغییر الگوهای کشت و تناوب زراعی، کترول جمعیت تاغزارهای موجود، اجرای طرح بادشکن غیرزنده (گلی) به‌دلیل محدودیت منابع آب و به‌طور کلی

1- Environmental Causes

2- Anthropogenic Causes

3 - Water Degradation

Evaluation of current condition of desertification using I.C.D Model (case study: KHEZR ABAD, YAZD)

Gharachelo, S.^{1*}, Ekhtesasi, M.R.², Zareian Jahromi, M.³ and Samadi, M.B.⁴

1*- Corresponding Author, Research Instructor, Faculty Of Desert, University of Semnan, Semnan, Iran,
Email: sgharachelo@yahoo.com

2- Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Yazd, Yazd, Iran.

3- M.Sc of Combat Desertification, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

4- Instructor, higher education center of Mollasadra, Yazd, Iran.

Received: 15.12.2007

Accepted: 12.04.2010

Abstract

Nowadays, desertification is one of the ecological crises of the world. To control desertification, having a clear understanding of its factors and processes is necessary. Khezr Abad-Hemat Abad region of Yazd with area of 242 Km² was considered to evaluate current condition of desertification using ICD. Iranian Classification of Desertification (ICD) was presented by M. Ekhtesasi and S. Mohajeri in 1995. First of all, available data were collected and basic studies were done. The data were entered in GIS and basic maps were produced through interpretation of aerial photos and satellite images using Arcview and Ilwis software. Eight desert homogenous units were separated according to the studies and by overlaying geomorphology, land use and vegetation cover maps. In next stage, effective factors in desertification including three environmental factors, three anthropogenic factors, soil erosion index, resilience potential and reconstruction of ecosystem were scored in a range of 0-10. Afterward, according to the sum of scores and comparing with table of desertification severity index, final desertification map was produced. The result showed that 81.53% of the region was in middle class of desertification while 18.47 % was in severe class. The environmental factors were determined as the main factor in desertification of 81.53 % area of the studied region while 18.47 % of that was affected by anthropogenic factors. Most main criterion in desertification of this region was water degradation process.

Key words: Desert, Desertification, Current condition, ICD model, Environmental factor, anthropogenic factor