



Mineral chemistry and P-T estimation of formation of cummingtonite and coexisting minerals in the calc-silicate rocks from the Takht-e-Soleyman area, NW Iran

R. Hajjialioghli¹, M. Moazzen¹, A. Jahangiri¹, G.T.R. Droop², R. Bousquet³

1- Department of Geology, University of Tabriz, Tabriz, Iran


2- School of Earth, Atmospheric and Environmental Sciences, University of Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL, UK

*3- Institut für Geowissenschaften, Universität Potsdam, Postfach 601553, D-14415 Potsdam, Germany
Email: r_hajjialioghli@yahoo.co.uk*

(Received: 20/5/2007, in revised form: 22/12/2007)

Abstract: The calcareous rocks in the Takht-e-Soleyman area (NW Iran) crop out in association with a variety of metamorphic rocks including amphibolites, granitic gneisses, pelitic schists and meta-ultramafic rocks. Retrogressive metamorphism of these rocks occurred during decompressional cooling during exhumation. Cummingtonite-bearing rocks resulted from retrogression of the calc-silicates in the area. Their dominant mineral assemblage is plagioclase + garnet + calcic - amphibole + ferromagnesian - amphibole + quartz + calcite ± titanite ± epidote. Calcic - and ferromagnesian - amphiboles were determined by petrographical observations and EMPA analysis. Hornblende and cummingtonite compositions dominate the analysed amphiboles. Formation of Ca-poor cummingtonite coexisting with calcite and calcic - hornblende in the retrograde calc - silicates of the Takht-e-Soleyman area is a rare petrological occurrence. Thermometric estimates using mineral compositions of cummingtonite co-existing with hornblende is in the range of 550 - 600 °C. Al in hornblende barometry yields a pressure of 6.5 ± 0.6 kbar, corresponding to medium pressure amphibolite facies.

Keywords: *Takht-e-Soleyman area, retrograde metamorphism, calc-silicates, cummingtonite, P-T conditions.*



بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل کامینگتونیت و کانیهای همراه در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان، شمال غرب ایران

رباب حاجی علی اوغلی¹، محسن مؤذن¹، احمد جهانگیری¹، ج. دروپ²، ر. بوسکو³

1- دانشگاه تبریز، گروه زمین شناسی

2- دانشگاه منچستر، دانشکده علوم زمین

3- دانشگاه پتسدام، مرکز تحقیقات علوم زمین

پست الکترونیکی: r_hajialioghli@yahoo.co.uk

(دریافت مقاله: 1386/2/30، نسخه نهایی: 1386/10/1)

چکیده: سنگهای آهکی تخت سلیمان متشکل از مرمرها و کالک-سیلیکاتها در شمال غرب ایران به همراه انواع سنگهای دگرگون شامل آمفیبولیت، سنگهای متا-اولترامافیک، گنیس گرانیت و شیستهای پلیتی رخنمون دارند. سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت دار در منطقه مورد مطالعه حاصل فرایندهای دگرگونی پسروده به دلیل بالا آمدگی سنگها در شرایط کاهش فشار و دما هستند. مجموعه کانیهای دگرگونی پسروده در این سنگها عبارتند از پلاژیوکلاز + گارنت + آمفیبول کلسیک + آمفیبول فرومنیزین + کوارتز + کلسیت ± تیتانیت ± اپیدوت. ترکیب شیمیایی انواع کانیهای آمفیبول در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه با استفاده از تجزیه EMPA مشخص شد. هورنبلند و کامینگتونیت به ترتیب ترکیب اصلی کانیهای آمفیبول کلسیک و آمفیبول فرومنیزین را تشکیل می دهند. کامینگتونیت آمفیبول فقیر از کلسیم است و همزیستی آن با کلسیت و هورنبلند غنی از کلسیم در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان از پدیده‌های نادر و بسیار جالب در مطالعات سنگ شناختی در زمین شناسی است. دما سنجی براساس ترکیب شیمیایی کانیهای کامینگتونیت همزیست با گارنت دمای تشکیل $550-600^{\circ}\text{C}$ را نشان می دهد. فشار دگرگونی با استفاده از مقدار AI در ترکیب هورنبلند در حدود 6.5 ± 0.6 کیلوبار محاسبه شد. دما و فشار به دست آمده با شرایط رخساره آمفیبولیت با فشار متوسط سازگاری دارد.

واژه‌های کلیدی: شمال غرب ایران، منطقه تخت سلیمان، سنگهای کالک-سیلیکات، دگرگونی پسروده، کامینگتونیت، شرایط دما و فشار.

مقدمه

مجموعه دگرگونی کمپلکس تخت سلیمان، از انواع سنگهای دگرگون مرمر، کالک-سیلیکات، آمفیبولیت، گنیس و میکاشیست تشکیل شده است. این سنگها طی بالا آمدگی پوسته قاره‌ای در شرایط کاهش فشار و دما به صورت پسروده، دگرگون شده‌اند¹. پیدایش کامینگتونیت در سنگهای کالک-

منطقه تخت سلیمان در شمال شرق تکاب (شمال غرب ایران) و حد فاصل عرضهای جغرافیایی $37^{\circ} 30'$ و $36^{\circ} 30'$ شمالی و طولهای جغرافیایی $47^{\circ} 45'$ و $47^{\circ} 5'$ شرقی قرار گرفته است. این منطقه در تقسیم بندی ساختاری ایران بخشی از زون سندانج-سیرجان در نظر گرفته شده است [1].

1- Post-peak metamorphic condition

به صورت دگرشیب (با مرز گسله) با سنگهای ته نشستی و ته نشستی-آواری الیگو-میوسن پوشانیده شده است (شکل 1). منطقه تخت سلیمان به دلیل دارا بودن تنوع بالایی از سنگهای دگرگون و نیز ویژگیهای ساختاری پیچیده، توسط پژوهشگران مختلف به زونهای ساختاری متفاوتی نسبت داده شد. این منطقه در تقسیم بندی ارائه شده توسط [6]، بخشی از زون ایران مرکزی در نظر گرفته شد. [7] منطقه تکاب را به زون سلطانیه-میشو نسبت داده است. در نقشه زمین‌شناسی تخت سلیمان [8]، این منطقه در برخوردگاه زونهای ساختاری سندج-سیرجان، ایران مرکزی و البرز-آذربایجان واقع شده است. بر پایه مطالعات اخیر [1، 9] منطقه مورد مطالعه در زون سندج-سیرجان در نظر گرفته شده است (شکل 1).

سن تشکیل انواع سنگهای دگرگون و نفوذ توده‌های آذرین در مجموعه دگرگون تخت سلیمان تا کنون به طور دقیق مشخص نشده است. سنین قدیمی (پرکامبرین) [8] نسبت داده شده به انواع سنگهای دگرگون و آذرین منطقه تخت سلیمان بر پایه شواهد فسیل‌شناسی، چینه‌شناسی و سنگ شناسی است.

مطالعات صحرایی

مرمرها و سنگهای کالک-سیلیکات تخت سلیمان با یک روند شمال غرب-جنوب شرق به صورت میان لایه‌ای با سنگهای آمفیبولیت و متا-اولترامافیک، برنزد شده‌اند (شکل 1). مرمرها با رخنمون سفید رنگ و بیش از 90٪ حجمی سنگ از دانه‌های بلورین کلسیت با بافت گرانوبلاستیک متوسط دانه تا درشت دانه تشکیل شده است. موسکویت، فلوگوپیت، و بیوتیت در مقادیر فرعی در برخی از مرمرها مشاهده می‌شوند. سنگهای کالک-سیلیکات به رنگ خاکستری تا خاکستری تیره بوده و دارای ناخالصی‌هایی از Al و Si در قالب کانیهای سیلیکات آلومینیم (مانند پلاژیوکلاز و گارنت) هستند (جنوب روستای بنفشه دره سی، شکل 1). بلورهای درشت دانه گارنت تا اندازه 5 میلی متر، در نمونه‌های دستی این سنگها مشخص است. سمتگیری موازی کانیهای آمفیبول پیرامون پورفیروبلاست‌های گارنت، موجب بریدگی شده است. کانیهای اپیدوت و تیتانیت در مقادیر کم در این سنگها تشکیل شده‌اند.

سیلیکات حاصل فرایندهای دگرگونی پس‌رونده است. کامینگتونیت در سنگهای دگرگون به دلایل زیر دارای اهمیت است؛


(1) تشکیل کامینگتونیت در تعیین خاستگاه سنگزایی و ترکیب شیمیایی پروتولیت اولیه اهمیت دارد [2، 3]. خاستگاه کانیهای آمفیبول فرومنیزین سری کامینگتونیت-گرونریت، معمولاً پروتولیت‌های غنی از ترکیبهای Fe و Mg (مانند سنگهای آمفیبولیت فقیر از کلسیم، سنگهای پلیتی فقیر از پتاسیم، گابروهای اورالیته شده و سازندهای غنی از آهن یا تشکیلات آهن نواری) هستند [3].

(2) گستره پایداری کامینگتونیت توسط بسیاری از پژوهشگران (مثل [4، 5]) به طور معمول در گستره فشار پائین/ فشار متوسط تا فشار بالای رخساره آمفیبولیت² در نظر گرفته شده است.

در این کار پژوهشی روابط سنگ شناختی و بافتی کانی‌های دگرگون در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان بررسی، و نیز ترکیب شیمیایی آنها از تجزیه EMPA تعیین شده است. بر پایه دماسنجی با استفاده از ترکیب شیمیایی کامینگتونیت همزیست با گارنت، و فشار سنجی با استفاده از مقدار Al در ترکیب هورنبلند، شرایط تقریبی دما و فشار در تشکیل سنگهای مورد مطالعه تعیین شدند. نتایج حاصل از این بررسی (همراه با بررسیهای در دست انجام) در خصوص سنگ شناختی و سنگزایی سنگهای آمفیبولیت و متا-اولترامافیک در منطقه مورد مطالعه به بازسازی رویدادهای زمین‌شناسی در منطقه تخت سلیمان و مناطق مجاور در شمال غرب ایران کمک خواهد کرد.

زمین‌شناسی منطقه تخت سلیمان

مجموعه دگرگون تخت سلیمان از طیف سنگ شناختی گسترده از انواع سنگهای دگرگون درجه پائین تا درجه بالا شامل اسلیت، فیلیت، شیسست سبز، اکتینولیت شیسست، میکاشیسست، گنیس، آمفیبولیت، سنگهای کالک-سیلیکات، مرمر، و متا-پریدوتیت تشکیل شده است. نفوذ توده‌های گرانیتوئیدی نسبتاً جوان به درون سنگهای دگرگون قدیمی در مواردی باعث دگرگونی مجاورتی سنگهای دربرگیرنده متابازیک و متاپلیتی شده است. مجموعه دگرگون-آذرین تخت سلیمان



شکل 1 نقشه زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه، اقتباس از نقشه زمین‌شناسی 1/100000 تخت سلیمان [7] و نقشه زمین‌شناسی 1/100000 ماه نشان [23] با تغییرات. نقشه کوچک در سمت راست و بالا موقعیت منطقه مورد مطالعه بر اساس تقسیم‌بندی [1] را نشان می‌دهد.

مطالعات سنگ شناسی

سنگهای آهکی در منطقه مورد مطالعه را بر پایه فراوانی قیاسی کانی‌های کلسیت/دولومیت به دو گروه اصلی شامل مرمرها و سنگهای کالک-سیلیکات تقسیم کرده‌ایم. بیشتر از 90٪ حجمی سنگهای مرمر از کلسیت تشکیل شده است. سنگهای کالک-سیلیکات علاوه بر کلسیت دارای مقادیر بالایی از کانیهای سیلیکات آلومینیوم‌دار شامل گارنت، پلاژیوکلاز، آمفیبول، اپیدوت و تیتانیت هستند. جدول 1 مجموعه کانیهای دگرگون مرمر و کالک-سیلیکات در منطقه تخت سلیمان را نشان می‌دهد. علائم اختصاری استفاده شده برای کانیها از [10] اقتباس شده‌اند.


الف) مرمرها: کلسیت کانی اصلی تشکیل دهنده مرمرها در منطقه مورد مطالعه است. بافتهای گرانوبلاستیک و گرانوبلاستیک هم اندازه یا موزائیکی از انواع بافتهای معمول در اغلب مرمرها با درجه دگرگونی بالا هستند. کوارتز، اپیدوت، پلاژیوکلاز، زونیزیت، ترمولیت و کانی‌های کدر در مقادیر فرعی در این سنگها وجود دارند. زیرکن، تیتانیت و آپاتیت کانی‌های کمیاب‌اند. سنگهای مرمر در منطقه تخت سلیمان بر پایه مجموعه کانی‌های دگرگون در سه زیر گروه شامل فلوگوپیت-اپیدوت مرمر، ترمولیت-اپیدوت مرمر، و ترمولیت مرمر رده-بندی شده‌اند (جدول 1).

جدول 1 مجموعه کانیهای دگرگونی در سنگهای مرمر و کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان. X: کانی اصلی، O: کانی فرعی، A: کانی دگرگونی پسرونده. علائم اختصاری کانیها از [10] است.

شماره نمونه	Cal/Dol	Hbl	Qtz	Cpx	Scp	Ol	Grt	Ep	Zo	Ms/Phl	Ttn	Cum	Act/Tr	Pl	Zrn	Opa	Ap	نام سنگ
R52	X	X	X				X	O	O		O	O	A	O	O	O	O	کالک-سیلیکات کامینگتونیت دار
R22	X	O	O					O		A	O		O	O	O	O		ترمولیت-اپیدوت مرمر
R53	X		O					O	O		O		O	O				ترمولیت-اپیدوت مرمر
RA14-b	X		O					O	O?		O		O	O		O		ترمولیت-اپیدوت مرمر
RA15-c	X		O					O			O		X	X				ترمولیت-اپیدوت مرمر
RA6-c	X		O										O	O				ترمولیت مرمر
RA8-d	X									O								فلوگوپیت مرمر
R46	X		O					O		X				O	O	O		فلوگوپیت مرمر
RA6-a	X		O	O	O?			O					O	O	O	O		فلوگوپیت-اپیدوت مرمر
R15-c	X		O					O	O		O		O	O				ترمولیت-اپیدوت مرمر
R-44	X		O					O			O		O	O	O	O		اپیدوت-فلوگوپیت مرمر
R21-b	X		O					O	O	O				O	O	O	O	اپیدوت-فلوگوپیت مرمر
R68-5	X	X	O	O	O		X	O		O	O		O?	O				اسکاپولیت-کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات
R66	X	X	O	O	O		X	O		O	O		O	O	O	O	O	اسکاپولیت-کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات
R69-8	O	X	O	O?			X	O	O		O		O	O				اسکاپولیت-کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات
R88-28	O		O	O		O		O					O	O				کالک-سیلیکات البون دار
R88-30	O		O	O		O	X	O	O				O	O				کالک-سیلیکات البون دار
R88-5	O	O	O			O		O					O	O				کالک-سیلیکات البون دار
R69-10	O	O	O	X?	X		X		O	O	O,A		O	O		O	O	اسکاپولیت-کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات
R29-9	O	X	O	X	O		O	O		O	O		O	O	O	O	O	اسکاپولیت-کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات
R-Bo	O	O	O	O			O		O				O					کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات
R88-21	O		O	O?		O							O		O			کالک-سیلیکات البون دار
R96-33	O	X	X	X	X		X	O	O		A,O		X	X	O	O	O	اسکاپولیت-کلینوپیروکسن-گارنت کالک-سیلیکات

از لحاظ سنگ شناختی و بافتی به دقت مطالعه شده بود، با ریزپردازنده Geoscan در دانشکده علوم زمین دانشگاه منچستر به روش EDS تجزیه شد. برنامه ZAF/FLS برای تبدیل سیگنالهای پرتو X به آنالیزهای اکسیدی عناصر استفاده شد. همسنجی دستگاه با استفاده از مجموعه‌ای از استانداردهای طبیعی و مصنوعی انجام شده است.

آمفیبول: کانیهای آمفیبول تجزیه شده عبارتند از آمفیبول کلسیک و آمفیبول فرومنیزین. فرمول ساختاری کانیهای آمفیبول تجزیه شده در نمونه R52 به عنوان نمونه معرف در جدول 2 آورده شد.



شکل 2 (a) بافت پوئی کلیوبلاستیک در پورفیروبلاست گارنت. کانیهای کامینگتونیت، هورنبلند و کلسیت به صورت طویل شده برگرگی پیرامون پورفیروبلاست گارنت را تشکیل داده اند، PPL. (b) کانی های گارنت دانه ریز و بی شکل در زمینه گرانوبلاستیک، PPL

(ب) سنگهای کالک-سیلیکات: سنگهای کالک-سیلیکات علاوه بر کلسیت دارای مقادیر فراوانی از کانیهای سیلیکات آلومینیم شامل گارنت، اسکاپولیت، کلینوپیروکسن، پلاژیوکلاز، آمفیبول، ترمولیت، اپیدوت، و زوئیزیت هستند. کانیهای آمفیبول در برخی از نمونه‌ها به موازات بریدگیها سمت گیری کرده‌اند. نامگذاری انواع سنگهای کالک-سیلیکات پایه مجموعه کانیهای اصلی این سنگها انجام گرفته است (جدول 1). سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت دار در منطقه مورد مطالعه به صورت لایه‌هایی متناوب با سنگهای متا-اولترامافیک و آمفیبولیت تشکیل شده‌اند (نمونه R-52، شکل 1).

مجموعه کانی‌های دگرگون سنگهای کامینگتونیت دار عبارتند از گارنت (20٪)، هورنبلند (10٪)، کامینگتونیت (10٪)، کلسیت (25٪)، کوارتز (15٪)، پلاژیوکلاز (5٪) و اپیدوت (5٪). زیرکن و آپاتیت کانی‌های جزئی را تشکیل می‌دهند. کانیهای گارنت در این سنگها به دو صورت مشاهده می‌شوند: الف) گارنت بی‌شکل ریز دانه با بافت گرانوبلاستیک (GrtI) که احتمالاً باقیمانده‌هایی از گارنت تشکیل شده در شرایط اوج دگرگونی³ اند (شکل 2-b)، ب) گارنت پورفیروبلاست (GrtII) با اندازه تقریبی 5 میلی متر که دارای بافت پوئی کلیوبلاستیک با نفوذیهای فراوان و نسبتاً درشت دانه از کانیهای کوارتز، کلسیت و پلاژیوکلاز است (شکل 2-b). بر پایه روابط بافتی و مجموعه کانیهای دگرگون، معلوم شد که کانیهای گارنت با بافت پوئی کلیوبلاستیک در تعادل بافتی با کانیهای کلسیت، هورنبلند و کامینگتونیت بوده و حاصل دگرگونی پسرونده‌اند (شکل 2-a). کلسیت به طول 0,6 میلی متر و کامینگتونیت به طول 0,8 میلی متر به موازات بریدگیها، پیرامون پورفیروبلاست گارنت تشکیل شده‌اند (شکل 2-a). کامینگتونیت در نور طبیعی بی رنگ است و در مقاطع نازک با دو شکستی بالا و برجستگی شدید مشخص می‌شود. هورنبلند به صورت همزیست با کامینگتونیت با بافت گرانوبلاستیک تشکیل شده است.

ترکیب شیمیایی کانیهای دگرگون


ترکیب عناصر اصلی در کانیهای گارنت، آمفیبول کلسیک، آمفیبول فرومنیزین، پلاژیوکلاز و کلسیت در نمونه‌هایی که قبلاً

جدول 2 ترکیب نماینده از انواع کانیه‌های دگرگون تجزیه شده در سنگ کالک-سیلیکات کامینگتونیت دار منطقه تخت سلیمان (R52). علائم اختصاری کانیه‌ها از [10] است.


کانیه‌های تجزیه شده	Pl	Grt (retrograde)	Grt (relict)	Cum	Cum	Hbl	Hbl	Cal
SiO ₂	55,68	36,04	36,25	40	02	01	77	0,00
TiO ₂	0,00	0,14	0,08	50	50	41	42	0,00
Al ₂ O ₃	27,32	20,23	20,32	0,02	0,04	0,32	0,27	0,00
Cr ₂ O ₃	0,01	0,00	0,00	0,31	0,64	44	06	0,01
FeO	0,06	29,66	32,18	0,00	0,00	11	10	3,95
MnO	0,04	4,09	3,33	19	66	0,02	0,01	0,71
MgO	0,00	0,95	0,96	33	32	49	23	1,69
CaO	9,44	7,35	6,93	0,56	0,56	23	24	93
Na ₂ O	6,87	0,00	0,00	06	12	0,25	0,28	53
K ₂ O	0,29	0,00	0,00	11	11	6,38	7,03	0,00
Sum	50	99,56	99,71	0,57	0,99	23	9,81	0,00
(O)	100	12	12	0,05	0,06	10	1,19	34
Si	8	5,87	5,90	0,00	0,03	1,38	0,46	60
Al	2,54	3,88	3,90	17	11	0,51	0,09	1
Fe ³⁺	1,44	0,34	0,29	96	96	04	96	00
Fe ²⁺	0,00	3,81	4,00	23	23	95	23	0
Ti	0,00	0,02	0,01	7,90	7,84	23	6,67	00
Cr	0,00	0,00	0,00	0,06	0,12	6,49	1,85	0
Mn	0,00	0,56	0,46	0,00	0,00	2,13	0,28	00
Mg	0,00	0,22	0,23	4,35	4,28	0,29	2,84	0
Ca	0,00	1,28	1,21	0,00	0,00	2,78	0,03	05
Na	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0
K	0,60	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,04	00
Sum	0,02	16	16	2,58	2,60	0,04	1,64	0
Al ^[IV]	5,03	2,13	2,1	0,10	0,17	1,50	1,64	00
Al ^[VI]		1,75	1,80	0,01	0,02	1,73	0,36	0
Mg/Mg+Fe		0,05	0,05	0,00	0,00	0,42	0,09	01
Al/Al+Fe ³⁺ +Cr ³⁺		0,92	0,93	15,08	15,11	0,10	15,45	0
(K+Na) _A						15,53	1,33	0,04
Na ₂ Na+K+Ca						1,51	0,52	90
K ₂ Ca+K+Na	0,56			0,37	0,38	0,62	0,37	0
Ca ₂ K+Na+Ca	0,02					0,35	0,87	00
Alm	0,42	64,70	67,80			0,88	0,45	0
Prp		9,60	7,80			0,53	0,17	00
Sps		3,90	4,00			0,19	0,05	0
Grs		20,00	19,0			0,04	0,78	1,00
And		1,80	1,40			0,77		

محاسبه شده است. بر پایه رده‌بندی [11] ترکیب کانیهای آمفیبول فرومنیزین تجزیه شده کامینگتونیت است (شکل d-3). مقادیر $Mg (= Mg/Fe + Mg)$ برابر با 0,4 تا 0,35 است. ترکیب شیمیایی کانیهای آمفیبول کلسیک و آمفیبول فرومنیزین در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان در نمودارهای مثلثی $Mg-Ca-(Fe + Mn)$ و $Mg-Al-(Fe + Mn)$ نشان داده شده است (شکل 4). گارنت: ترکیب گارنت بی‌شکل و ریز دانه در زمینه گرانولاستیک تقریباً متفاوت از ترکیب گارنت پورفیرولاست با بافت پوئی کیلوبلاستیک (گارنت دگرگون پسروده) است. مقادیر Ca (1,30 ppm) و Mn (0,56 ppm) در گارنت پورفیرولاست بیشتر از گارنت ریز دانه ($Ca = 1,2$ ppm و $Mn = 0,46$ ppm) در زمینه گرانولاستیک بوده ولی مقادیر Mg در این کانیها در مقادیر جزئی تغییر نشان می‌دهد (جدول 2).

آمفیبول کلسیک: مقدار Fe^{3+} بر پایه روش موازنه باری محاسبه شد. ترکیب کانیهای آمفیبول کلسیک در نمودار رده‌بندی [11] بیشتر در گستره هورنبلند قرار می‌گیرد (شکل a-3). ترکیب کانیهای هورنبلند از هسته به سمت حاشیه دارای تغییرات بسیار جزئی است. مقدار Ca در ترکیب هسته (1,76 a.p.f.u.) بیشتر از مقدار آن در ترکیب حاشیه (1,50 a.p.f.u.) است. مقادیر Na در ترکیب هسته (0,27 a.p.f.u.) در مقایسه با حاشیه (0,22 a.p.f.u.) نسبتاً بیشتر است. نمودارهای Ti بر حسب Si و Al بر حسب Si [12] ویژگیهای فشار و دمای میانگین کانیهای هورنبلند در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان را نشان می‌دهد (شکل b, c-3). آمفیبول فرومنیزین: جدول 2 ترکیب کانیهای آمفیبول فرومنیزین در منطقه تخت سلیمان را نشان می‌دهد. فرمول ساختاری بر پایه 15 کاتیون و 23 اکسیژن با فرض نبود Fe^{3+}



شکل 3 (a) ترکیب کانیهای آمفیبول کلسیک تجزیه شده در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه بر پایه رده‌بندی [13] (b,c) ترکیب کانیهای هورنبلند تجزیه شده در نمودارهای $Ti-Si$ و $Ti-Al$ [14] (d) ترکیب کانیهای آمفیبول فرومنیزین در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه در نمودار [13].



شکل 4 ترکیب کانیهای آمفیبول فرومنیزین و آمفیبول کلسیک در نمودار ترکیبی $Mg-Ca-(Fe+Mn)$ و $Mg+Al_2O_3-(Fe+Mn)$

تشکیل دهنده‌هایی که فقط در تعداد محدودی از فازها وجود دارند، و نیز تشکیل دهنده‌هایی که مقادیر آنها در فازهای دگرگونی بسیار کم است، از سیستم حذف کرد بدون اینکه تغییری در روابط فازهای باقیمانده ایجاد شود. بنابراین با نظر گرفتن قانون فاز برای ساده شدن سیستم شیمیایی سنگهای مورد مطالعه، به صورت زیر عمل کرده‌ایم:

1- TiO_2 در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه در فازهای تیتانیوم‌دار اصلی مانند تیتانیت و ایلمنیت ذخیره شده است و مقادیر آن در ترکیب کانیهای تجزیه شده کم است. لذا از مقدار TiO_2 در سیستم چشم پوشی کردیم.

2- Fe_2O_3 به صورت اصلی در اپیدوت وجود دارد و مقادیر آن در کانیهای آمفیبول و گارنت تجزیه شده کم است. Cr_2O_3 در کانیهای تجزیه شده وجود ندارد. با فرض جانشینی یونی Fe_2O_3 و Al_2O_3 می‌توان تشکیل دهنده‌های سه ظرفیتی Fe_2O_3 و Al_2O_3 را در نمودار سازگاری با هم در نظر گرفت.

3- تشکیل دهنده‌های Mg و Fe در فازهای آمفیبول، و گارنت حضور دارند با فرض جانشینی یونی Mg و Fe می‌توان این دو تشکیل دهنده را با هم در نظر گرفت. MnO در مقادیر کم در کانیهای فرومنیزین گارنت و آمفیبول حضور دارد. تشکیل دهنده‌های دو ظرفیتی MgO ، FeO ، MnO را می‌توان با هم در نمودار سازگاری نشان داد.


4- Na_2O در مقادیر کم به صورت جانشینی با CaO در تشکیل برخی از کانی‌ها مانند پلاژیوکلاز و آمفیبول، شرکت کرده است. با توجه به اینکه پلاژیوکلاز در تمامی مجموعه کانی‌ها، در سنگهای مورد مطالعه وجود دارد، می‌توان تشکیل دهنده Na_2O را به صورت عضو پایانی آلایت به عنوان فاز اضافی برای این سیستم در نظر گرفت.

شواهد سنگ‌شناختی و بافتی نشان می‌دهد که گارنت بی-شکل و ریز دانه در زمینه گرانوبلاستیک بقایایی از کانیهای گارنت اولیه است ولی گارنت پورفیروبلاست طی فرایندهای دگرگونی پسرورنده تشکیل شده‌اند. ترکیب شیمیایی کانیهای گارنت پسرورنده به صورت $Grs_{16.9-24.0}Alm_{58.3-68.6}Sps_{7.0}$ است. آندرادیت دارای مقادیر برابر با $1/4 - 2/6$ $Py_{2.5-5.0}$ است. ترکیب شیمیایی کانیهای گارنت در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان در نمودارهای مثلثی $Prp-Alm-Sps$ و $Prp-Grs-Sps$ نشان داده شد (شکل 5).


پلاژیوکلاز: ترکیب کانیهای پلاژیوکلاز تجزیه شده یکنواخت، و مقدار K_2O بسیار پائین ($0.01 - 0.02$ a.p.f.u.) است. ترکیب پلاژیوکلاز در نمودار $An-Or-Ab$ دیده می‌شود (شکل 6).

کلسیت: کلسیت فاز کربنات اصلی در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه است. فرمول کلسیت بر پایه 2 کاتیون و 3 اکسیژن به دست آمده است. مقادیر Mg و Fe در کانیهای کلسیت تجزیه شده به ترتیب در حدود $2.1 - 4.0$ wt% و $1.0 - 1.8$ wt% است. جدول 2 ترکیب کانیهای تجزیه شده در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان را نشان می‌دهد.

انتخاب سیستم شیمیایی مناسب برای نمایش ترکیب شیمیایی کانیهای تجزیه شده در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان و نمایش ترکیب جمعی کانیهای سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار در نمودار ترکیبی متشکل از اجزای CaO ، Na_2O ، Fe_2O_3 ، FeO ، MnO ، MgO ، SiO_2 ، TiO_2 ، H_2O ، CO_2 ، Al_2O_3 پیچیده است. برای ساده‌تر شدن سیستم می‌توان بر پایه قانون فاز




شکل 5 ترکیب کانیهای گارنت تجزیه شده در نمودارهای Prp-Alm-Sps و Prp-Grs-Sps.




شکل 6 ترکیب کانیهای پلاژیوکلاز تجزیه شده بر روی نمودار ترکیبی Or-Ab-An.

کامینگتونیت در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه حاصل واکنشهای شکست گارنت است. واکنش پیشنهادی برای تشکیل کامینگتونیت در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه عبارت است از؛



واکنش بالا به سمت راست با کاهش دما همراه است. پلاژیوکلاز، کلسیت، و کامینگتونیت با تعادل بافتی در زمینه گرانوبلاستیک تشکیل شده است و بقایای گارنت به صورت بی-شکل و ریز دانه به صورت باقیمانده در آن مشاهده می‌شود. گارنت با بافت پوئی کیلوبلاستیک دارای اینکلوزن‌های فراوان از کانیهای کلسیت، کوارتز و پلاژیوکلاز نسبتاً درشت دانه است. واکنش برگشتی تشکیل گارنت با بافت پوئی کیلوبلاستیک به صورت زیر پیشنهاد می‌شود؛



این واکنش در شرایط کاهش فشار و دما رخ داده است. حضور کانیهای آبدار آملفیبول در مقادیر بالا، کلسیت فراوان همراه با

5- برای اینکه کانیهای CO₂ دار مانند کلسیت و کانیهای آبدار مانند آملفیبول را در نمودار نمایش دهیم فرض می‌کنیم که ترکیب اصلی فاز شاره‌های دگرگون H₂O و CO₂ بوده‌اند.

6- سنگهای دگرگون مورد مطالعه دارای کوارتز و کلسیت فراوان‌اند بنابراین SiO₂ و کلسیت را می‌توان به صورت فازهای اضافی در سیستم نشان داد.

بنابراین با در نظر گرفتن موارد بالا مجموعه کانیهای دگرگون و ترکیب شیمیایی کانیها در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت‌دار منطقه تخت سلیمان را می‌توان با سیستم شیمیایی CAF با تصویر برداری از کانیهای کوارتز، آلبیت، H₂O و CO₂ نمایش داد (شکل 7).

متغیرهای تشکیل دهنده در سیستم مطالعاتی سنگهای کالک-سیلیکات عبارتند از؛

C: CaO

A: AlO_{3/2} + FeO_{3/2} - NaO_{1/2}


F: FeO + MgO + MnO

همسنجی [15] دمای 550°C را به دست می‌دهد که تقریباً مشابه مقادیر محاسبه شده برای مقدار تیتانیوم در ترکیب هورنبلند همزیست است (T = 570 °C).

استفاده از فشارسنج آمفیبول بر پایه همسنجی‌های [16] تا [18] به ترتیب با شرایط فشار P = 5,7 kbar، 6,79 kbar و 5,03-6,07 kbar همخوانی دارد. شرایط P-T دگرگونی پسرورنده در همان نمونه نیز بر پایه واکنش‌های تعادلی، و با استفاده از برنامه THERMOCALC [19] با داده‌های ترمودینامیکی [20]، محاسبه شد. مقادیر فعالیت برای کانیهایی پلاژیوکلاز، گارنت و هورنبلند با استفاده از برنامه AX [21] عبارتند از؛

$$\text{Grs} = 0,06, \text{Py} = 0,001, \text{Alm} = 0,22, \text{Tr} = 0,018, \\ \text{Prg} = 0,01, \text{Ts} = 0,001, \text{An} = 0,65, \text{Ab} = 0,57$$

فعالیت Cum = 0,03 و Gru = 0,001 بر پایه فرمول a-X [22] محاسبه شد. رابطه کسر مولی و فعالیت در اعضای نهائی تشکیل دهنده‌های آمفیبول فرومنیزین به صورت زیر است:



فعالیت کلسیت و کوارتز برابر با واحد در نظر گرفته شد. در محاسبات فشار و دما برای چشم پوشی از مقادیر خطای ناشی از ترکیب احتمالی پیچیده فاز شاره دگرگون، مقادیر $X_{\text{H}_2\text{O}}$ و X_{CO_2} به صورت فازهای دو تائی فرض شده‌اند.

شرایط P-T در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه نیز با فرض $X_{\text{H}_2\text{O}} = 0.5$ و $X_{\text{CO}_2} = 0.5$ با برنامه ترموکالک محاسبه شد. واکنشهای تعادلی با تشکیل دهنده‌هایی از گارنت، آمفیبول، پلاژیوکلاز، کلسیت و کوارتز برای مجموعه کانیهایی با تعادل بافتی و ترکیبی محاسبه شد. برخوردگاه واکنش‌های تعادلی در نمودار، مقادیر فشار و دما را مشخص می‌کند. مقادیر دما در گستره 450-500 °C تغییر می‌کند (شکل 8).

نتایج نشان می‌دهد که مقادیر محاسبه شده برای شرایط دما با استفاده از برنامه ترموکالک اغلب کمتر از مقادیر محاسبه شده بر پایه زمین دماسنجی گارنت-کامینگتونیت و مقدار Ti در ترکیب کامینگتونیت و هورنبلند است.

تشکیل کانیهای اپیدوت و تیتانیت در مجموعه کانیهای کالک-سیلیکات‌های مورد مطالعه، نشان دهنده نفوذ شارهای غنی از H_2O طی فرایندهای دگرگونی پسرورنده در منطقه مورد مطالعه است.

دما- فشارسنجی


به دلیل نبود کانیهای همزیست باقیمانده از شرایط اوج دگرگونی، میانبارها مناسب از فازهای باقیمانده در کانیهای پورفیروبلاست و منطقه‌بندی شیمیایی در کانیهای پورفیروبلاست تجزیه شده، شرایط P-T دگرگونی پسرورنده و اوج دگرگونی در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه مشخص نیست.

شرایط P-T دگرگونی پسرورنده با استفاده از روش‌های زمین دما- فشارسنجی معمول و برنامه ترمودینامیکی THERMOCALC تعیین شد. شرایط دمایی با استفاده از دماسنج Fe-Mg بین کانیهای گارنت و کامینگتونیت همسنجی شده توسط [13] در حدود 600 °C محاسبه شد. دماسنج گارنت-کامینگتونیت بر پایه همسنجی [14] دما را در حدود 570 °C تعیین می‌کند. از طرف دیگر استفاده از همسنجی [13, 14] برای کانیهای گارنت (پورفیروبلاست) و هورنبلند همزیست به ترتیب با دماهای 480 °C و 445 °C سازگار است. این تفاوت در مقادیر دماهای محاسبه شده برای کانیهای همزیست گارنت-کامینگتونیت و گارنت-هورنبلند در دماسنج [13] توسط [3] مورد بحث قرار گرفته است. نکته مهم این است که در همسنجی [13] مقادیر خطا برای دماسنج گارنت-کامینگتونیت کمتر از دماسنج گارنت-هورنبلند است. بنابراین تفاوت در مقادیر دماهای محاسبه شده در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه مورد مطالعه با استفاده از دماسنجهای تبادل گارنت-کامینگتونیت و گارنت-هورنبلند به دلیل جانیشینی‌های پیچیده کاتیونی در ساختار آمفیبول کلسیک در مقایسه با جانیشینی تقریباً دوتایی در کامینگتونیت است.


با در نظر گرفتن موارد بالا نتایج به دست آمده از دماسنج گارنت-کامینگتونیت در مقایسه با نتایج دماسنج گارنت-هورنبلند برای سنگهای کامینگتونیت‌دار منطقه مورد مطالعه از خطای کمتری برخوردار است [3]. دماسنج سنگهای مورد مطالعه به روش مقدار تیتانیوم در ترکیب کامینگتونیت بر پایه

مقادیر فشار محاسبه شده بر پایه واکنشهای تعادلی با استفاده از برنامه ترموکالک تقریباً با 6.5 ± 0.6 kbar همخوانی دارد (شکل 8) که این نتایج با مقادیر محاسبه شده بر پایه دماسنج Al در آمفیبول با استفاده از همسنجی [16 تا 18] سازگار است.

با در نظر گرفتن خطای کمتر در نتایج به دست آمده از دماسنج گارنت-کامینگتونیت، و نیز دماهای مشابه به دست آمده بر پایه مقدار Ti در ترکیب کانیهای آمفیبول تجزیه شده، به نظر می‌رسد که ترموکالک دماها را کمی پائین‌تر از مقدار واقعی نشان می‌دهد.



شکل 7 نمایش ترکیب کانیهای دگرگون در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان روی سیستم (CAF), SiO_2 , Ab, CO_2 و H_2O فازهای اضافی هستند.



شکل 8 تعیین شرایط تقریبی دما و فشار دگرگونی پسرودید در سنگهای کالک-سیلیکات کامینگتونیت دار منطقه تخت سلیمان با استفاده از برنامه ترموکالک.

برداشت

- شرایط P-T اوج دگرگونی در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه، به دلیل دگرگونی پسرونده شدید، مجموعه کانیهای دگرگون در اوج دگرگونی با روشهای دما- فشارسنجی کانی- شناسی قابل تعیین نمی‌باشد.

- دگرگونی پسرونده در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان به دنبال اوج دگرگونی و در ارتباط با بالا آمدگی سنگها در شرایط کاهش فشار و دما رخ داده است.

- حضور کامینگتونیت در سنگهای دگرگون کالک-سیلیکات مورد مطالعه حاصل واکنشهای شکست گارنت اولیه در شرایط دگرگونی پسرونده است. بقایای گارنت همراه با کانیهای همزیست کامینگتونیت، کلسیت و پلاژیوکلاز در زمینه گرانوبلاستیک این پدیده را تایید می‌کند. واکنشهای پیشنهادی برای تشکیل کامینگتونیت نیز همزیستی این آمفیبول فقیر از کلسیم را با فازهای غنی از کلسیم مثل کلسیت و هورنبلند توجیه می‌کند.

- تشکیل گارنت با بافت پوئی کیلوبلاستیک دارای نفوذیهایی فراوان و نسبتاً درشت دانه از کانیهای کلسیت، کوارتز و پلاژیوکلاز عملکرد فرایند دگرگونی پسرونده به دلیل کاهش شرایط فشار بر سنگهای دگرگون را نشان می‌دهد.

- تشکیل فازهای آبدار فراوان مانند هورنبلند، کامینگتونیت و نیز حضور کانیهای ثانویه اپیدوت و تیتانیت در سنگهای کالک-سیلیکات مورد مطالعه حضور فاز شاره غنی از H₂O در فرایندهای دگرگونی پسرونده را نشان می‌دهد. حضور کلسیت در مقادیر فراوان در مجموعه کانیهای این سنگها نشان دهنده کاهش فعالیت X_{CO2} به دلیل تاثیر فاز شاره غنی از H₂O در منطقه مورد مطالعه است.

- دما و فشار محاسبه شده در تشکیل کامینگتونیت و کانیهای همراه در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه مورد مطالعه به ترتیب 550-600 °C و 7 kbar است (رخساره آمفیبولیت فشار میانگین). با توجه به مقادیر فشار محاسبه شده، عمق تشکیل این سنگها در حدود 21 کیلومتر برآورد شده است.

تشکر و قدردانی

از هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز برای حمایت مالی از این پژوهش تشکر می‌کنیم.

مراجع

- [1] Alavi, M., "Regional stratigraphy of the Zagros Fold-Thrust belt of Iran and its proforelenad evolution", American Journal of Science 304 (2004) 1-20.
- [2] Miyano T., Klein C., "Fluid behavior and phase relations in the system Fe-Mg-Si-C-O-H: application to high grade metamorphism of iron-formations", American Journal of Science 286 (1986) 540-575.
- [3] Evans B.W., Ghiorso M.S., "Thermodynamics and petrology of cummingtonite", American Mineralogist, 80 (1995) 649-663.
- [4] Evans B.W., "Reactions among sodic, calcic, and ferromagnesian amphiboles", sodic pyroxene, and deerite in high-pressure metamorphosed ironstone, Siphnos Greece, American Mineralogist, 71 (1986) 1118-1125.
- [5] Lattard D., Le Breton N., "The P-T-fO₂ stability of deerite Fe₁₂²⁺ Fe₆³⁺ [Si₁₂O₄₀]OH₁₀", Contributions to Mineralogy and Petrology, 115 (1993) 474-487.
- [6] نبوی م. ح.، "مقدمه ای بر زمین‌شناسی ایران". سازمان زمین‌شناسی ایران، (1355) 109 ص.
- [7] افتخارنژاد ج.، "طبقه بندی تکتونیکی ایران در ارتباط با حوضه‌های رسوبگذاری". مجله انجمن نفت ایران، شماره 82، (1359) 28-19.
- [8] بابا خانی ع. ر. قلمقاش ج.، "نقشه زمین‌شناسی 1/100000 تخت سلیمان". سازمان زمین‌شناسی ایران، تهران، (1371).
- [9] Gilg H. A., Boni M., Balassone G., Allen C. R., Banks D., Moore F., "Marble-hosted sulfide ores in the Angouran Zn-(Pb-Ag) deposit, NW Iran: interaction of sedimentary brines with a metamorphic core complex", Mineral Deposita 41 (2006) 1-16.
- [10] Kretz R., "Symbols for rock-forming minerals", American Mineralogist 68 (1983) 277-279.
- [11] Leake B.E., "Nomenclature of amphiboles", Mineralogical Magazine 42 (1978) 533-563.
- [12] Hynes A., "A comparison of amphiboles from medium and low pressure metabasites, Contributions to Mineralogy and Petrology", 81 (1982) 119-125.
- [13] Graham C. M., Powell R., "A garnet-hornblende geothermometer: calibration, testing

[19] Powell R., Holland T.J.B., "An internally consistent dataset with uncertainties and correlations: Applications to geobarometry", worked examples and a computer program. Journal of Metamorphic Geology, 6 (1988) 173-204.

[20] Holland T.J.B., Powell R., "An enlarged and updated internally consistent thermodynamic dataset with uncertainties and correlations: the system $K_2O-Na_2O-CaO-MgO-MnO-FeO-Fe_2O_3-Al_2O_3-TiO_2-SiO_2-C-H-O_2$ ", J. of Metamorphic Geology, 8 (1990) 89-124.

[21] Holland T.J.B., Powell R., "An internally consistent thermodynamic data set for phases of petrological interest", J. of Metamorphic Geology, 16 (1998) 309-343.

[22] Will T.M., Powell R., "Activity-composition relationships in multi-component amphiboles: an application of Darken's Quadratic Formalism", American Mineralogist 77 (1992) 954-966

[23] لطفی م، نقشه زمین شناسی 1/100000 ماه نشان، سازمان زمین شناسی ایران، تهران، (1380).

and application to the Pelona Schists, Southern California", Journal of metamorphic Geology, 2 (1984) 13-34.

[14] Perchuk L.L., Aranovich L.Y., Podlesski K.K., Lavrant'eva I.V., Gerasimov V.Y., Fed'Kin V.V., Kitsul V.I., Karasakov L.P., Brednikov N.V., "Precambrian granulites of the Aldan shield", eastern Siberia, USSR, Journal of metamorphic Geology, 3 (1985) 265-310.

[15] Otten M.T., "The origin of brown hornblende in the Artfjället gabbro and dolerites", Contribution to Mineralogy and Petrology, 86 (1984) 189-199.

[16] Johnson M.C., Rutherford M.J., "Experimental calibration of the aluminum-in hornblende geobarometer with application to Long Valley caldera (California) volcanic rocks", Geology 17 (1989) 837-841.

[17] Hammarstrom J.M., "Zen E.-A., Aluminium in hornblende: an empirical igneous geobarometer", American Mineralogist 71 (1986) 1297-1313.

[18] Hollister L.S., Grissom G.C., Peters E.K., Stowell H.H., Sisson V.B., "Confirmation of the empirical correlation of Al in hornblende with pressure of solidification of calc-alkaline plutons", American Mineralogist, 72 (1987) 231-239.