

شواهد ژئومورفولوژیکی در سن‌سنگی زمین لغزه بزرگ

سیمره (کبیرکوه) زاگرس، جنوب غربی ایران^۱

سیاوش شایان

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمین‌لغزه سیمره (کبیرکوه) یکی از بزرگترین لغزش‌های دنیاست که از دیرباز توجه بسیاری از دانشمندان داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. در تعیین علت وقوع و زمان آن بین دانشمندان مختلف، اختلاف‌نظر وجود دارد. در این مقاله ضمن بررسی وضعیت مکانی و ویژگی‌های دینامیکی و ژئومورفولوژیکی، فرضیه‌هایی برای چگونگی وقوع و زمان آن ارائه و به آزمون گذاشته شده‌اند. نظریات دانشمندان مختلف داخلی و خارجی نیز مورد بحث قرار گرفته و سپس با استفاده از داده‌های هیدرولو-اقلیمی و محاسبات دینامیک لغزش، مشخصات عمومی و جزئی لغزش سیمره ارائه شده است.

داده‌های حاصل از شواهد ژئومورفولوژیکی همچون نرخ گسترش شبکه آبهای سطحی روی لایه زیرین یا سطح لغزش، چگونگی گسترش رگولیت، میزان وقوع فرایند‌های انحلالی (ایجاد لایه، حفره‌ها، درزها و شکافها) در سنگهای آهکی ریزشی، گردواری اندک در دانه‌ها^۱ و قطعات لغزش یافته، گسترش جزئی افقهای خاک در پهنه ریزش و محدودیت نهشته گذاری‌های رود سیمره بر کناره‌های منطقه لغزش سبب شده است که سن زمین‌لغزه سیمره، جدید تشخیص داده شود. همچنین در تأیید این مطلب، بررسی اسناد و مدارک تاریخی نیز زمان وقوع لغزش را در سال ۸۷۷ م. مطابق با ۲۵۸ هـ، نشان داده است. به این ترتیب نظریه‌هایی که درباره وقوع آن دن حدود ۱۰۰۰ سال قبل عنوان شده بود، رد شد. لغزش سیمره به هنگام وقوع با صدای عظیم همراه بوده و سبب ایجاد لرزش در منطقه و نواحی دورست شده است. به همین علت برخی محرك وقوع آن را زمین لرزه دانسته‌اند. این مقاله به بحث و بررسی لرزه‌خیزی منطقه موردنظر می‌پردازد و نتیجه گرفته می‌شود که وقوع لغزش عظیم سیمره باعث ایجاد زمین‌لرزه شده است نه بر عکس.


کلید واژه‌ها: لغزش سیمره (کبیرکوه)، سن‌سنگی ژئومورفولوژیکی، زمین‌لغزه‌های زاگرس، حرکات دامنه‌ای، ژئومورفولوژی کاربردی.

۱. میزان گردش‌گی زوایای کناری دامنه‌ها بر اثر عوامل فرسایش


۱- مقدمه


زمین‌لغزش بزرگ سیمره (کبیرکوه)، یکی از بزرگترین زمین‌لغزه‌های شناخته شده در رشته کوه زاگرس بوده که به علت وسعت ابعاد و ویژگیهای خاص خود، تاکنون توجه دانشمندان متعددی را به خود جلب کرده است. ابعاد این لغزش به حدی است که برخی از مطالعه‌کنندگان، به آن لقب «بزرگترین لغزش شناخته شده در روی زمین» را اطلاق کرده‌اند [۱، ص ۱۸۲] و برخی آن را «بزرگترین لغزش در نیمکرهٔ شرقی می‌دانند» [۲، ص ۱۹۰]. محل وقوع جغرافیایی این لغزش در جنوب‌شرقی استان ایلام و در مرز استان لرستان به مختصات جغرافیایی (۰° دقيقه و ۲۳ درجه تا ۱۵ دقيقه و ۲۲ درجه عرض جغرافیایی شمالی) و (۳۰° دقيقه و ۴۷ درجه تا ۴۰° دقيقه و ۴۷ درجه طول جغرافیایی شرقی) است. لغزش بزرگ سیمره (کبیرکوه) از خطالرأس جنوبی رشته کبیرکوه زاگرس آغاز شده و تا دره رود سیمره در مجاورت آن ادامه یافته است. پس از ریزش مواد حاصل از لغزش در دره رود مذکور، حرکت مواد همچنان ادامه یافته و از طاقه‌سیهای کمارتفاع کوه دوپارش (کوه چول) به حدکث ارتفاع ۶۰۰ متر بالا رفته است و منطقه‌ای وسیع را که بین ۸۰ کیلومتر مربع [۳، ص ۹۳] و ۱۰۰ کیلومتر مربع [۴، ص ۲۶۳] تا ۱۶۶ کیلومتر مربع [۵، ص ۳۰] براورد شده‌اند؛ پوشانده است (شکلهای ۱ و ۲).

ویژگیهای زمین‌شناختی منطقه وقوع لغزش روی نقشه به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین‌شناسی جنوب‌غرب ایران که در سال ۱۹۶۹ از سوی شرکت ملی نفت ایران با راهنمایی هوبر تهیه و در سال ۱۹۷۵ چاپ و منتشر شده است؛ قابل بررسی است [۶]. همچنین گستره جغرافیایی منطقه وقوع لغزش را می‌توان به کمک نقشهٔ توبوگرافی به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ پل دختر که در سال ۱۳۵۵ از سوی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران، برگ K-۷۵۳ III-۵۵۵۶ از سری K-۷۵۳ III-۵۵۵۶ انتشار یافت، مورد بحث و بررسی قرار داد [۷]. جهت ملاحظه دقیق لغزش بزرگ سیمره و بررسی ابعاد آن، عکسهای هوایی تهیه شده به وسیله سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ماه اوت ۱۹۵۵ قابل استفاده است [۸]. (شکل ۲). بررسی کلی منطقه وقوع لغزش نیز از طریق تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷، ردیف و گذر شماره ۰۳۷ - ۱۶۷ فریم سوم استان ایلام امکان‌پذیر است [۹].




شکل ۱ محدوده لغزش سیمره روی نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ پل دختر، سازمان جغرافیایی
نیروهای مسلح ایران






شکل ۲ پنهان گسترش مواد و محل لغزش لایه‌ها در طاقدیس کبیرکوه و مجاورت دره رود سیمراه در عکس هوایی منطقه به مقیاس تقریبی ۱:۵۵۰۰۰ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

بررسیهای زمین‌شناسخی منطقه وقوع لغزش و اطراف آن نشان می‌دهد که که از نظر لیتوژئوگرافیکی به طور عمده از سازند آسماری تشکیل شده که از نظر سنگ‌شناسی به طور اعم کربناتی و شامل آهک دولومیت، آهکهای رسی و شیلی است. که از نظر سنی از اوپیگوسن در دوران سنوزوئیک زمین‌شناسی و تا بوردیگالین از میوسن پایینی ادامه پیدا می‌کند (آسماری بالایی)؛ پس از این سازند، رسوبات تبخیری سازند گچستان قرار می‌گیرند. سازند آسماری را بر اساس سنگواره‌ها و سن به سه قسمت آسماری پایینی، میانی و بالایی تقسیم کرده‌اند [۱۰ صص ۲۴۲-۲۳۲ و ۲۳۲-۲۲۲]. همچنین آهکهای مارنی بخش ائوسن بالایی سازند و شیلهای سازند کژدمی با زمان سنومانین، قسمتهایی از که کوه و منطقه وقوع لغزش را در برگرفته‌اند. منطقه وقوع لغزش از نظر تکتونیکی دارای لرزه‌خیزی مختصر بوده است و نزدیکترین گسل منطقه به آن در ملکوه (در شمال شرقی که کوه) به فاصله تقریبی ۲۰ کیلومتری قرار دارد. در نقشه‌های پهنه‌بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران [۱۱، نقشه ضمیمه]، منطقه وقوع لغزش در پهنه با خطر نسبتاً پایین زمین لرزه واقع شده است. با این حال برخی استناد تاریخی خبر از وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در منطقه سیمراه می‌دهند و به همین علت وقوع لغزش‌های بزرگ را نیز به وقوع زمین لرزه‌ها نسبت داده‌اند. [۱۲، ص ۲۵۵ و ۱۲۴؛ ۱۳، ص ۴۷۲ و ۲۲۹، ص ۱۴؛ ۱۴، ص ۴۵]، (شکل ۳).



شکل ۳ طرح افقی لغزش در منطقه سیمراه [۲]

گروه دیگری از دانشمندان علاقه‌مند به لغزش بزرگ سیمیره، عوامل دیگری چون زمین ساخت گرانشی، لغزش‌های گرانشی، اشباع رطوبتی لایه‌های مستعد و یا ترکیبی از زمین ساخت و اشباع لایه‌ها را جزء علل لغزش ذکر کردند و برای زمان وقوع آن، تاریخهای متفاوتی از ۱۰/۰۰۰ سال قبل تا دو هزار سال قبل و سال ۸۷۲ میلادی (حدود ۱۱۳۰ سال قبل) را عنوان کردند [۱، ص ۱۸۲؛ ۲، ص ۱۹۰؛ ۳، ص ۱؛ ۴، ص ۴۵ و ۱۴؛ ۵، ص ۱۲۳؛ ۶، ص ۱۲۴؛ ۷، ص ۴۲۹؛ ۸، ص ۲۲۲-۴؛ ۹، ص ۱۷۹؛ ۱۰، ص ۱۸؛ ۱۱، ص ۱۷۹؛ ۱۲، ص ۷۷۶] (شکل ۴).



شکل ۴ طاقدیس کبیرکوه


امتداد دریاچه سیمیره (با علامت ...)، جهت حریان کنونی (کم) و رسوبات دریاچه‌ای (L) که پس از باز شدن تنگه، جریان سریع آب و تخلیه آن بر جای مانده‌اند. امتداد طاقدیس کبیرکوه با خط چین مشخص شده است.

محل و زمان عکسبرداری: جاده سراب جهانگیر به دره شهر (نزدیک روستای هلوش).


محل تنگه رود سیمیره با علامت (L) روی عکس مشخص شده است. (خردادماه ۱۳۸۲)

به علت تفاوت در نگرشها نسبت به عوامل ایجاد، تاریخ دقیق وقوع، دامنه زمانی زیاد برای زمان وقوع، بررسیهای ژئومورفولوژیکی گستره لغزش و یافتن شواهدی که بتواند زمان مناسب و متناسبی را برای وقوع این پدیده جالب توجه ارائه کند، بررسیهای استنادی و پژوهش‌های میدانی ژئومورفولوژیکی در منطقه انجام شد. فرضیه‌های اولیه برای انجام پژوهش عبارت بودند از:


- ۱- عامل زیربری و ایجاد هوگ بک^۱ (بریدگی) در لایه‌های سخت و نرم مواد تشکیل‌دهنده و پایه لغزش (آهکهای آسماری) سبب بروز لغزش در منطقه شده‌اند (شکل ۵).
- ۲- عامل زمین لرزه به عنوان عامل محرك در وقوع لغزش دخالت داشته است.
- ۳- زمان وقوع لغزش، جدید بوده و شواهد ژئومورفولوژیکی تأیید کننده تازگی وقوع لغزش است.



الف



ب



ج

نمودار سه‌بعدی مارن کر تاسه - انوس آهک آسماری فارس تختانی

شکل ۵ فرضیه‌هایی که شکل‌گیری زمین‌لغزه سیمراه را به نبودن پایه (تکیه‌گاه) لازم نسبت می‌دهند. الف و ب- دو گونه از توجیهات احتمالی از خمیدگی زانوبی فرضی هاریسون و فالکون در آهک آسماری را نشان می‌دهد. ج- فرضیه مؤلف که در برگیرنده برش هاگ‌بک جدا شده بر اثر نقش‌بستگی آبراهه از سازند فارس تختانی است [۱۶، ص ۲۴۰].

۱. Hogback

به علت انحلال پذیری مواد تشکیل‌دهنده منطقه و فرسایش رود سیمره در پای محل وقوع لغزش، عامل زیربری^۱ به وسیله روختانه و ایجاد هوگبک که پایداری سنگهای آهکای آسماری، مارنها و شیلهای تشکیل‌دهنده لایه متحرک را دچار اختلال می‌سازند، فرضیه نخستین ارائه شد؛ برای آزمون از بررسیهای زمین‌شناختی و لیتو لوژیکی توأم با بررسیهای میدانی و مشاهده پدیده‌های ژئومورفولوژیکی استفاده شد. در حال حاضر به علت پوشیده شدن منطقه از مواد رسنی حاصل از زمین‌لرزه بزرگ سیمره، بررسی پایه اولیه و محیط نخستین وقوع لغزش امکان‌پذیر نیست و این امر فقط با شبیه‌سازی ذهنی یا رایانه‌ای امکان‌پذیر می‌شود. با این حال با توجه به شواهد ژئومورفولوژیکی موجود و با یاری ذهن، باید پدیده‌ها و مواد حاصل از لغزش از منطقه حذف کرده؛ سپس ناهمواریهای اولیه و شبکه زهکشی سیمره را در نظر گرفته و به این امر اقدام کرد.

همچنین به علت متواتر بودن استناد و مدارک نسبت به وقوع زمین‌لرزه در منطقه به عنوان عامل محرك لغزش، بررسیهای میدانی و انجام محاسبات مکانیک حرکت (سینماتیک) برای آزمودن فرضیه دوم در دستور کار قرار گرفت تا با شبیه‌سازی حرکت از طریق روابط مکانیکی این امر به آزمون گذاشته شود.

با توجه به فرضیه سوم؛ یعنی جدید بودن زمان لغزش، مشاهده و بررسی شبکه هیدرولوژیکی منطقه، عمق لایه خاک تشکیل شده از زمان وقوع لغزش تاکنون، اندازه‌گیری و عکسبرداری از گردواری دانه‌ها و مواد حاصل از لغزش، مشاهده شد؛ سپس اندازه‌گیری تغییرات مجاری و آبراهه‌ها در رتبه‌های گوناگون، میزان جابه‌جایی و نهشته‌گذاری مواد جدید بر اثر سیلا بهای منطقه و ارتباط آنها با حجم (دبی) سیمره و تأثیر اقلیم بر آن در دستور کار قرار گرفت و نمونه‌گیریهایی انجام شد. در نهایت مجموعه داده‌های حاصل از شواهد ژئومورفولوژیکی و برقراری ارتباط بین عوامل ژئومورفولوژیکی منجر به نتیجه‌گیری از زمان وقوع لغزش، عامل ایجاد آن و شبیه‌سازی مکانیکی از لغزش شد.

۲- ویژگیهای منطقه

۱- اقلیم هیدرولوژی

منطقه مورد بررسی در فاصله بین استان ایلام و لرستان، در کنار جاده اصلی آسفالت شده

1. Undercutting

خرم آباد به پل دختر و اندیمشک، در امتداد جاده فرعی پل دختر به دره شهر قرار دارد. اقلیم نیمه مرطوب معتدل با زمستانهای سرد در نواحی کوهستانی و تابستانهای کاملاً خشک، در این منطقه حاکم است. زمستانها اغلب با نفوذ سیکلونهای بارانزای مدیترانه‌ای و ریزش‌های جوی همراه است اما در تابستان، به علت افزایش دما و کاهش نسبی رطوبت، شرایط بدی برقرار می‌شود. حداقل دمای مطلق، در این منطقه اغلب از ۲۸ درجه سانتیگراد بالاتر می‌رود. به دلیل شبی تند نواحی کوهستانی منطقه مورد بررسی، هنگام بارشهای تند و رگبارهای سریع که در رژیم منطقه به طور فراوان پیش می‌آید، آبهای سطحی با تخریب دامنه‌ها، مواد تخریبی زیادی را به سیمراه تخلیه می‌کنند. قدرت فرسایش این رودها در شبیهای تند به آن حد زیاد است که در برخی مناطق بستر رودها در داخل توده‌های سنگی، راه خود را کنده و جریان دارند. کوههای منطقه، به دلیل موقعیت رویه آفتاب، ذوب سریع برف در دامنه‌ها و حرکت آبهای سطحی در شبیهای تند به شدت دچار فرسایش شده، مواد تخریبی زیادی به رودخانه می‌ریزند. نواحی کوهپایه‌ای منطقه نیز به دلیل داشتن خاکهای نسبتاً نرم، بیشتر در معرض فرسایش قرار دارند. به همین دلیل برخی عوارض و شواهد ژئومورفولوژیکی مانند مخروطهای افکنه، واریزهای سایر چشم‌اندازهای تخریبی در این نواحی زیاد دیده می‌شوند. بارندگی متوسط سالیانه در منطقه مورد بررسی در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیمتر است [۱۴، صص ۴-۲ و ۳۹].

منطقه مورد مطالعه از نظر شبکه اوروپیدروگرافی، یکی از زیر حوزه‌های سیستم رودخانه‌ای سیمراه - کرخه را تشکیل می‌دهد که «زیر حوزه سیمراه» نام دارد و از بهم پیوستن رود گاماسیاب و قره‌سو ایجاد شده است. در نهایت زیر حوزه کشکان نیز در منطقه مؤ در مطالعه به آن می‌پیوندد. مسیر سیمراه در پای کیرکوه به سمت جنوب غرب است اما پس از رسیدن به آن به سمت جنوب‌شرقی تغییر جهت می‌دهد و با نام «کرخه» راه خود را به سوی خوزستان ادامه می‌دهد. دره اصلی سیمراه ۲۲۵ کیلومتر طول دارد و با محاسبه آبهای بالادست در مجموع آبهای حدود ۲۸۴۵۴/۵ کیلومتر مربع را زهکشی کرده، از پای کیرکوه در منطقه وقوع لغزش عبور می‌دهد.

حداکثر ارتفاع در منطقه، در محل پیوستن کشکان رود با سیمراه در جنوب‌غربی باباخوارزم ۴۹۷ متر و حداقل ارتفاع در منطقه خط‌الرأس کیرکوه بر اساس نقشه‌های توپوگرافی منطقه و در قسمت شمال منطقه رانش برابر ۲۲۵۳ متر است. رود کشکان پس از پیوستن به سیمراه در محل باباخوارزم در عرض جغرافیایی (۶ و ۳۳ درجه شمالی) از جهت عمومی جنوب‌غربی پیروی کرده و پس از طی ۲۵/۵ کیلومتر به محل بند حاصل از ریزش مواد لغزش در سه

کیلومتری جنوب روستای هلوش می‌رسد. آبهای سیمره به علت وقوع رگبارها، بارش‌های حجمی و ناگهانی ناشی از ورود سیکلونهای بارانزای مدیترانه‌ای و ویژگیهای لیتوولوژیکی و پتانسیل انفال مواد تخریبی و ریزشی در منطقه، با مسلح شدن به بار رسویی حمل شده، توانایی فرسایش زیادی در مسیر خود دارد.

با توجه به میانگین دبی رود سیمره در ایستگاه چم‌زاب بالای محل پیوستگی سیمره به کشکان که برابر 10.9 متر مکعب در ثانیه است و میانگین دبی حداقل آن (217 متر مکعب در ثانیه)، میزان دبی سیل متوسط محاسبه شده با استفاده از توزیعهای آماری در این ایستگاه بر اساس توزیع گامبل برابر $894/5$ و بر اساس توزیع لوگ نرمال پارامتری برابر $0/78$ مترمکعب در ثانیه است که توانایی سیلهای منطقه سیمره را برای حل مواد منفصل، آواری و قدرت فرسایش رود مذکور نشان می‌دهد. میزان احتمال وقوع سیلابها در ایستگاه مذکور برای دوره‌های بازگشت 2 تا 10000 ساله بر اساس جدول یک است [۱۹، ص ۱۰۸].

جدول ۱ مشخصات حوزه و دبی‌های^۱ حداقل در دوره‌های برگشت 2 تا 10000 ساله رود سیمره در ایستگاه چم‌زاب

دبی ویژه سیلاب $m^3/sec/km^2$	سطح حوزه لبریز (کیلومتر مربع)	۱۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۵	۲	۱	۰	۵۹۴/۷	*	دوره برگشت (سفر) نسبتی‌های حداقل	امتداد ایستگاه
$0/24$	$28454/5$	$5361/5$	$3686/6$	$2271/9$	$2000/0$	$1582/2$	$1172/1$	$980/0$	$594/7$	*	یکروزه	۰-۵
		$6600/0$	$4200/0$	$2500/0$	$2100/0$	$1600/0$	$1300/0$	$990/0$	$595/0$	**		
		$9691/7$	$2711/5$	$2926/5$	$2500/0$	$1945/2$	$1591/8$	$1120/0$	$715/2$	***	لحظه‌ای	۰-۵
		$8200/0$	$5300/0$	$2100/0$	$2600/0$	$2000/0$	$1600/0$	$1140/0$	$715/2$	**		

* محاسبات بر اساس چوکی استنارو لجام شده است.

** محاسبات بر اساس چوکی استنارو و تصحیح لجام شده است.

* بر اساس ربطه بین دبی یکروزه و لحظه‌ای لجام شده است.

متأسفانه مشخصه‌های مقادیر رسوی در ایستگاه چم‌زاب محاسبه نشده است اما می‌توان دبی ویژه رسوی را در ایستگاههای نزدیک به آن (تنگ‌سازی‌بن) به این ایستگاه نیز تعیین داد و

^۱. دبی بر حسب متر مکعب در ثانیه

نتیجه‌گیری کرد. از آنجا که دبی ویژه رسوب در ایستگاه تنگ‌سازین روی سیمراه و مجاورت ایستگاه چمزاب تقریباً با همان دبی برابر با $252/6$ تن در سال بر کیلومتر مربع است، مقدار دبی کل رسوبی در محل ایستگاه چمزاب برابر با $61/581$ می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت از این ایستگاه سالیانه حدود ده میلیون تن رسوب عبور می‌کند که مسلح شدن رود به چنین بار رسوبی قابل توجهی نشانگر پتانسیل فرسایشی و حمل مواد در مجاورت محل وقوع لغزش بزرگ سیمراه است. در نتیجه باید به تغییر اقلیم و خشکتر شدن نسبی منطقه از زمان وقوع لغزش نسبت به زمان کنونی توجه کرد. مسلماً در هنگام وقوع لغزش، منطقه مربوطین، پریارانتر، رژیم آبها منظمتر و قویتر از حال حاضر بوده و امکان ایجاد بردگی در پای آهکهای آسماری بیش از زمان کنونی بوده است [۱۹، ص ۱۹۲].

۲-۲- ویژگیهای منطقه وقوع لغزش

دامنه شمالی رشته کوه کبیرکوه از زاگرس با جهت شمالی غربی - جنوب شرقی، منطقه وقوع لغزش است. سنگ آهکهای آسماری از خط الرأس کبیرکوه جدا شده و به سمت رود سیمراه به حرکت در آمده‌اند. ریشه اصلی محل شروع لغزش در حال حاضر از فاصله دور به خوبی پیداست. حداقل ارتفاع در شمال‌غربی لغزش روی کبیرکوه 2352 متر و جنوب شرقی 2120 متر است.

ضخامت آهکهای آسماری که دچار ریزش شده‌اند 305 متر و طول آنها 14 کیلومتر است. این مواد به مسافت $902/5$ متر از روی خط الرأس یا ریشه لغزش به سمت رود سیمراه حرکت کرده‌اند. با توجه به شبیه متوسط لایه‌های زیرین سازند گچساران که لغزش روی آنها صورت گرفته است، شبیه لایه‌ها حدود 20 درجه است. حجم مواد جابه‌جا شده بر اثر این جابه‌جایی را 20 کیلومتر مکعب و جرم آنرا 55 میلیارد تن براورد کرده‌اند. اختلاف ارتفاع مستقیم بین خط الرأس کبیرکوه تا قاعده آن (مثلث تئوریک قائم الزاویه) برابر 1800 متر است. مواد ریزشی پس از سقوط به دره سیمراه و پر کردن مجرای حرکتی آن، یک سد طبیعی در منطقه ایجاد کرده‌اند که تا صدھا سال دوام داشته است. در پشت این سد، رود سیمراه با آبهای خود دریاچه‌ای موقت ایجاد کرده که حداقل عمق محل «تلفونه» در رقوم 912 متر اندازه‌گیری شده است. با توجه به بالاترین سطح داغ آب و نهشته‌های دریاچه‌ای که در رقوم 801 متری واقع شده حداقل عمق دریاچه 111 متر تعیین شده است. مواد ریزش یافته در بستر سیمراه به علت انرژی زیاد حرکتی، از دامنه طاقدیس کوه دو فارش در مجاورت شرقی

سیمره بالارفته و تا مسافت متوسط ۹ کیلومتر به راه خود ادامه داده‌اند. پهنه گسترش در برخی مناطق ۸ کیلومتر و در قسمت‌های دیگری تا ۱۲ کیلومتر گستردۀ شده‌اند. بخش اول لغزش؛ یعنی ریشه لغزش از خط‌الرأس کیبرکوه تا پایین دامنه آن و بستر سیمره $90.2/5m \times 14000 = 12/6 km^2$ و بخش دوم لغزش؛ یعنی منطقه انباشت مواد از بستر سیمره تا فواحی اطراف آن ۱۳۵ کیلومتر مربع را در بر می‌گیرند که در مجموع $147/6$ کیلومتر مربع منطقه لغزش را تشکیل می‌دهند. طول دریاچه ایجاد شده بر اثر ریزش مواد و انسداد مجرای سیمره را تا ۱۵ کیلومتر براورزد کرده‌اند. محاسبات انجام شده روی عکس‌های هوایی و نقشه‌های توپوگرافی مسافتی حدود ۸۵ کیلومتر به دست می‌دهند. همانطور که ذکر شد، حداقل عمق دریاچه در محاسبات ما ۱۱۱ متر و حداقل آن در مدارک دیگر ۱۸۰ متر براورده شده است. [۱۹، ص ۲۰].

در حال حاضر آثار سه دریاچه بازمانده از دریاچه اولیه به اسمی، سیمره، جایدر و چاه جوال به مساحت‌های تقریبی ۲۵ و ۵۰ کیلومتر مربع برای دریاچه‌های اول و دوم قابل اندازه‌گیری است. اندازه برخی توده‌های یکپارچه از سنگ آهکی آسماری پرتاپ شده در شرق روستای گاویشان به بیش از بیست متر مکعب می‌رسد. به نوشته شرو^۱ با اینکه سازه عمودی حرکت اولیه در مرکز گرانش لایه متحرک فقط حدود ۹۰۰ متر مربع بوده است اما لغزش توانسته است با قدرت مهیب خود عرض دره را پیموده و از ارتفاع ۶۰۰ متری طاقدیس روبه بالا برود و تا حدود ۱۸ کیلومتر دیگر به راه خود ادامه دهد. سرعت لازم برای این کار بر اساس محاسبات انجام شده به وسیله شرو، ۳۰۰ کیلومتر در ساعت بوده است [۲۱، صص ۴۳-۱۶۳۹]. (شکل ۳).

۳- یافته‌های پژوهش

برخی از یافته‌های سینماتیک (حرکتی و مکانیکی) حاصل از روابط فیزیکی در جدول ۲ نشان داده شده‌اند. بر اساس داده‌های جدول می‌توان ابعاد و شدت وقوع لغزش را درک کرد. گسترش ابعاد محدوده وقوع لغزش، حجم و جرم مواد جابه‌جا شده، مساحت قابل توجه برای دریاچه تشکیل شده و عمق آن، سرعت زیاد حرکت و شتاب آن، مقدار انرژی آزاد شده (کار انجام شده)، طول مواد پرتاپ شده، شدت صدای حاصل از ریزش مواد پرتاپ شده و شدت صدای حاصل از ریزش مواد همگی تأییدکننده این نظر است که این لغزش بزرگ، حداقل یکی از بزرگترین لغزش‌های واقع شده روی کره زمین بوده است. بررسیهای هیدرولوژیک - ژئومورفولوژیک برای اثبات یا رد فرضیه‌های تحقیق با توجه به شواهد موجود در منطقه نشان می‌دهند که:

۱. Shreve

جدول ۲ مشخصات عمومی لغزش بزرگ سیمراه

ردیف	مورد	ابعاد	واحد
۱	طول خطالرأس ریزش یافته کبیرکوه	۱۴	کیلومتر
۲	عرض مواد ریزش یافته از روی کبیرکوه.	۹۰/۲/۵*	متر
۳	مواد ریزش یافته	۱۲/۶*	کیلومتر مربع
	پخش مواد ریزشی	۱۲۵*	کیلومتر مربع
۴	ضخامت لایه آهک آسماری ریزش یافته	۳۰۵	متر
۵	شیب لایه زمین	۲۰	درجه
۶	حجم مواد جابه‌جا شده	۲۰	کیلومتر مربع
۷	جرم مواد جابه‌جا شده	۵۶	میلیارد تن
۸	اختلاف ارتفاع مثلثی ریزش (مرکز گرانش)	۱۸۰*	متر
۹	ادامه حرکت مواد پس از ریزش سیمراه	حداکثر	کیلومتر
	مساحت دریاچه تشکیل شده در پشت بند سیمراه	۸	کیلومتر
۱۰	مساحت دریاچه تشکیل شده در پشت بند سیمراه	۸۵*	کیلومتر مربع
۱۱	حداقل /حداکثر عمق دریاچه سیمراه	۱۱۰/۱۱۱*	متر
۱۲	حداکثر حجم مواد پرتابی باقیمانده	۲۰	مترمکعب
۱۳	سرعت جابه‌جایی مواد روی سطح شیبدار	۱۹۰*	کیلومتر بر ساعت
۱۴	شتات حرکت روی سطح شیبدار	۵*	متر بر محدوده ثانیه
۱۵	میزان فشردگی هوا در جلوی توده متحرک	۱۰*	نیوتون بر متر مربع (معادل ۱۰۰ کیلو نیوتون بر مترمربع)
۱۶	مقدار انرژی آزاد شده بر اثر حرکت مواد تا دره سیمراه (اصطکاک با سطح زمین صفر فرض شده است)	۶۴۸۹۰*	نیوتون یا ژوول بر مترمربع
۱۷	شدت صدای ایجاد شده در منطقه **	۱۰۵*	لسی بل
۱۸	طول منطقه بر جایگذاری مواد	۱۲۱۶۵	متر
۱۹	طول منطقه از جای برداشتن مواد	۹۰۲/۵*	متر

* موارد اندانه‌گیری شده بر اساس روابط سینماتیک به وسیله مؤلف.

** برای مقایسه یادآوری می‌شود که شدت صدای ایجاد شده بر اثر کار با یک مت هفاری برابر 95dB بوده و

آستانه دردناکی در صورت تداوم به مدت ۲ دقیقه (کوششهای انسان کر می‌شود) 120dB است.

الف- عامل زیر بری و ایجاد هوگ بک (بریدگی لایه‌های زیرین) می‌تواند به علت توانایی بالقوه رود سیمراه در ایجاد آن یک عامل بسیار مهم و اولیه جهت ناپایداری مواد سنگ آهکی

آسماری یکپارچه (به ضخامت حداقل ۲۰۵ متر) محسوب شود. بر اساس این فرضیه، عامل وزن توده مواد تشکیل‌دهنده سنگ آهک آسماری، زیربری و ایجاد هوگ بک، سبب ناپایداری مواد و تأثیر گرانش بر حرکتهای اولیه و انقطاع توده‌ای شده است و این امر توانایی توده سنگ آهکی مواد را برای نگهداری جرم خود بر اثر نیروی گرانش زمین از دست دارد و وزن حاصله، سبب جابه‌جایی توده، مواد شده است. این امر می‌تواند به خودی خود، فرضیه اشباع لایه‌های زیرین از آبهای حاصل از بارندگی مداوم و پی در پی اواخر پلیستوسن را رد و عدم نیاز به ایجاد لایه ورم کرده خمیری رس را در زیر لایه‌های آهک آسماری اثبات کند. به همین دلیل نیازی به بارندگیهای زیاد در منطقه نیست و می‌توان نفوذ آب به این درزها و شکستگیهای درون توده آهک آسماری را به عنوان عامل تحریک لایه‌ها فرض کرد. ابعاد فیزیکی توده متحرك به تنها یی فشار گرانشی ناشی از زیر بری و عدم پایداری لایه زیرین و شبیدار ۲۰ درجه را تأیید می‌کند. از نظر قوانین سینماتیک جرم زیاد مواد می‌تواند بدون داشتن سطح انکا تحت تأثیر نیروی گرانشی زمین (۹/۸۱) به تنها یی عامل حرکت محسوب شود. این امر، فرضیه اوبرلندر را در مورد عدم قبولی خیس شدگی لایه‌های زیرین و رخداد زمین‌لرزه شدید تأیید، سایز فرضیات را رد می‌کند [۱۲].

همچنین فرضیات هریسون و فالکون، نخستین ارائه کنندگان اطلاعات در مورد لغزش بزرگ سیمراه که وقوع آن را ده هزار سال قبل و در پایان پلیستوسن بر اثر اشباع لایه‌های زیرین اعلام شده است، رد می‌کند [۲۲، صص ۳۰-۹-۲۹۶: ۲۴؛ ۲۳: ۲۵]. ادبیات ژئومورفولوژیک مرتبه با زمان وقوع لغزش را که همگی روشهای هریسون و فالکون را تکرار کرده‌اند، نیز زیر سؤال می‌برد [۱، ص ۱۵؛ ۳، ص ۱۳]. (شکل ۵).

ب- محاسبات انجام شده مکانیکی نشانگر آن است که توده مواد لغزشی، به اندازه کافی شتاب، جرم، وزن، شدت و انرژی کافی برای ایجاد یک صدای عظیم در منطقه داشته‌اند. این، حرکت و انرژی حاصل از آن قادر بوده است لغزش قابل توجهی را در منطقه ایجاد کند. نگاهی، مجدد به استناد تاریخی موجود درباره زمان وقوع لغزش و یا گفته‌های برعی از مورخان و دانشمندان زمین لرزه‌شناس نشان می‌دهد که نویسندهای اولیه، به وقوع صدای عظیم در منطقه معترف بوده‌اند، اما نویسندهای متاخر آن را به معنای وقوع زلزله گرفته‌اند. مبررسی و ملویل نوشت‌اند که [۱۲، ص ۴۷۲]: «همه منابع اصطلاح هده را در توصیف این لرزه به کار بردۀ‌اند که بیشتر به معنی سرو صدای درهم شکستن و فروریختن ساختمانهاست تا نشانگر نیرویی که

۱. تأکیدها از مؤلف این مقاله است.

سبب آن شده است (زلزله).

زمین لرزه باید با غوغای بلند بوده باشد که به احتمال زیاد از زمین‌لغزه‌های بزرگ و گستردگی که از این نظر دره سیمره بسیار نامدار است، پدید آمده است (به نقل از هریسون و فالکون ۱۹۲۶ و ۱۹۴۶).

پس می‌توان استناد پژوهشگران به مطلب نقل شده از طبری را نوعی سهل‌انگاری در نقل وقایع تاریخی و نتیجه‌گیری از آن بر شمرد. به نظر ما، وقوع لغزش بزرگ سیمره سبب وقوع لرزش در منطقه شده است نه بر عکس. شدت صدای ایجاد شده بر اساس محاسبات فیزیکی در جدول ۲ نشان می‌دهد که صدای عظیمی از منطقه برخاسته و این صدا و لرزش حاصل از ریزش ۵۶ میلیارد تن مواد، کافی بوده است تا به قول طبری، لرزه احتمالاً در عراق، در واسطه و بصره حس شود (فاصله مستقیم بصره تا محل وقوع لغزش ۲۹۰ کیلومتر) و این امر به علت صدای عظیم و لرزش حاصل از ریزش مواد قابل توجه بوده است (نه لرزش زمین). از نظر ما، فرضیه دوم اثبات نشده و رد شده است و نمی‌توان عامل زمین لرزه را به عنوان عامل تحريك و مسبب وقوع لغزش بزرگ سیمره محسوب داشت.

ج- زمان وقوع لغزش با استناد به شواهد ژئومورفولوژیکی تازه است. شواهد ژئومورفولوژیکی مورد استناد که در جریان این پژوهش حاصل شده‌اند به شرح زیر است:

۱- ملاحظه و بررسیهای زمینی و عکس‌های هوایی منطقه لغزش نشان می‌دهد که شبکه آبهای جاری در منطقه هنوز موفق به استقرار شبکه‌های آبهای سطحی رتبه ۲ و بالاتر نشده است و اغلب شبکه‌ها از نوع رتبه یک و دو است. با توجه به بارندگی میانگین سالیانه در منطقه (حدود ۴۰۰ میلیمتر)، جنس مناسب سنگهای آهکی آسماری وجود سازندهای تبخیری گچساران در منطقه که برای گسترش شبکه‌های سریع آبهای سطحی روان مساعد می‌باشد و عدم گسترش چنین شبکه‌هایی، می‌توان عامل زمان را به عنوان محدود کننده گسترش شبکه‌های رتبه سوم و بالاتر در نظر گرفت. پس زمان وقوع لغزش بزرگ سیمره (کبیرکوه) زمانهای اخیر بوده که در صورت وجود زمان ده هزار ساله، حتماً جنس مواد و ریزشهای جوی کافی اجازه گسترش این شبکه‌ها را داده است.

۲- عدم گسترش رگولیت^۱. بررسیهای میدانی نشان می‌دهد که در پای تخته سنگهای منطقه، حتی تخته سنگهای عظیم به حجم بیش از ۲۰ متر مکعب، رگولیت گسترش نیافته است. عدم

۱. رگولیت: مواد حاصل از هوازدگی که به اشکال گوناگون در پای تخته سنگهای منطقه دیده می‌شود.

وجود آن با توجه به نوسان دمای منطقه، رطوبت نسبتاً کافی و گرانش زمین برای ایجاد لایه‌های رگولیتی نسبتاً ضخیم، می‌تواند فقط نشانه نبودن زمان کافی برای گسترش باشد. زمان ده هزار ساله، در صورتی‌که آن را به عنوان مبدأ زمانی وقوع لغزش قبول کنیم، زمان مناسبی برای ایجاد رگولیت بوده و عدم وجود و یا گستردگی بسیار محدود آن، نشانه در اختیار نبودن زمان کافی برای ایجاد رگولیتها در منطقه است (شکل ۶).



شکل ۶. قشر رگولیت در پای تخته‌سنگ‌های ریزشی سیمه‌های هنوز گسترش نیافته است و بلوکها شکل اولیه خود را حفظ کرده‌اند.

محل و زمان عکسبرداری: جنوب غربی روستای کامیشان (خرداد ۱۳۸۲)

۳- عدم گسترش لایه‌ها: گسترش لایه‌های ریلی و لانه زنبوری از ویژگیهای مناطق مستعد کارستیک است. لایه‌ها در صورت وجود آب نسبتاً کافی، کبود دما و زمان مناسب به انواع و ابعاد گوناگون در این گونه مناطق، (منطقه مورد مطالعه نیز از جمله آنها محسوب می‌شود و دارای ارتفاع کافی «حدود ۲۰۰۰ متر» از نظر دما، سردی هوا و آب مورد نیاز حدود میانگین ۴۰۰ میلیمتر در سال است) گسترش پیدا می‌کند اما مشاهده و اندازه‌گیری لایه‌های تشکیل شده روی قطعات آواری ناشی از لغزش بزرگ سیمره (کبیرکوه) نشانگر آن است که ابعاد لایه‌های مذکور در حد میلیمتری باقی مانده است. حداقل عمق لایه‌های اندازه‌گیری و تصویربرداری شده روی تخته سنگهای بزرگ آواری منطقه در جنوب گاو میشان (در ارتفاع ۲۰۰۰ متری) کمتر از ۳ میلیمتر است. در صورتی که گسترش لایه‌های مذکور را فقط به بعد از وقوع لغزش نسبت دهیم و زمان وقوع ده هزار ساله را قبول کنیم، این لایه‌ها باید دارای اعمق بیش از حد مذکور بوده و از نظر طولی نیز گسترش کافی داشته باشند. کل لایه‌های ریلی و لانه زنبوری موجود در تخته سنگهای آواری حاصل از ریزش، ابعاد بسیار اندک داشتند که نشانه در اختیار نبودن زمان کافی برای گسترش چنین عوارضی روی سنگهای آهکی آسماری در منطقه است. حتی این نکته را نباید از نظر دور داشت که احتمال دارد، لایه‌های مذکور به هنگام استقرار توده سنگهای آسماری در مکان اولیه خود در ارتفاعات بالا و قبل از وقوع لغزش گسترش یافته باشند. در این صورت باید با توجه به نرخ گسترش لایه‌ها در مناطق مرتفع کوهستانی و با آب و هوای مدیترانه‌ای، حداقل برابر ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر بر هر ۱۰/۰۰۰ سال باشند که لایه‌های مذکور را در قلمرو منطقه و روی سنگها باید ملاحظه کرد [۶۲، ص ۶۲]. در صورتی که عمق لایه‌های منطقه کمتر از ۳ میلیمتر است و زمان وقوع زمین‌لغزش را در ده هزار سال قبل تأیید نمی‌کند (شکل ۷).


۴- گردواری دانه‌ها و مواد در طبیعت تابعی از شرایط محیطی - اقلیمی و گذر زمان است. در صورت وجود عوامل فرساینده (باد، تغییرات دما و هوایی مکانیکی) باید دانه‌ها و تخته سنگهایی که در معرض این عوامل قرار می‌گیرند به مرور زمان زوایای تیز خود را از دست بدهند و به نوعی گردواری نزدیک شوند. به عبارت دیگر، حتماً سخترین کانیها و سنگها باید به مرور زمان، تحت تأثیر عوامل هوایی از حالت گوشش‌های نوک تیز خارج شده و به گردی برسند. ملاحظه سنگهای ناشی از لغزش و ریزش مواد (تخته سنگهای بزرگ) در منطقه و مشاهده دقیق آنها نشان می‌دهد که هنوز زوایای خشن در کناره‌های سنگهای بزرگ



شکل ۷ درزها و شکافها در بلوکهای ریزش یافته محدودند و لایه‌های ریلی فقط تا ۳ میلیمتر روی سنگهای آهکی آسماری ریزشی، گسترش پیدا کرده‌اند. به زوایای تن ماد ریزشی توجه کنید. طول خط کش ۳۰ سانتیمتر است.

محل و زمان عکسبرداری: جنوب غربی گاو میشان (خرداد ماه ۱۳۸۲)

دچار گردواری نشده است و این امر علی‌رغم هوازدگی وسیع مکانیکی حاکم بر منطقه در حال حاضر قابل ملاحظه است. نتیجه اینکه زمان کافی از زمان وقوع لغزش در اختیار عوامل فرساینده نبوده است تا بتواند سنگهای نه چندان سخت آهکی را فرسوده کند و زوایای آنها را ملایم سازد و به حالت گردواری نزدیک کند (شکل ۸).



شکل ۸ گردواری در بلوکهای ریزشی آهکهای آسماری در منطقه سیمره بسیار انک است و بلوکها ابعاد وسیع اولیه خود را هنوز حفظ کرده‌اند. برای مقایسه به دوربین چشمی توجه کنید.
 محل و زمان عکسبرداری: جنوب غربی گاویشان (خردادماه ۱۳۸۲)


۵- عدم گسترش درزها و شکافها در سنگهای آهکی منطقه نشانگر آن است که هنوز فرصت کافی از نظر زمانی داده نشده است تا عوامل مکانیکی و انحلال بر اثر رطوبت محیطی بتواند درزها و شکافهای قابل توجه را با توجه به زمان ده هزار ساله پیشنهادی در سنگهای آهکی منطقه ایجاد کند. درزها و شکافهای سنگهای منطقه ممکن است از دو دسته باشند:

الف- درزها و شکافهای اولیه که قبل از وقوع لغزش بزرگ سیمره در سنگها وجود داشته است.

ب- درزها و شکافهایی که به مرور زمان بر اثر عمل انحلال یا هوازدگی مکانیکی در سنگهای آهکی منطقه ایجاد شده‌اند. مشاهده دقیق و اندازه‌گیری میدانی نشانگر آن است که در قطعات بزرگ سنگ ناشی از ریزش سیمره، درزها و شکافها گسترش محدود و غیر قابل اعتنا



دارند. درزها و شکافهای اولیه و قبلی سنگها نیز در جریان وقوع لغزش مورد استفاده قرار گرفته است و به هنگام سقوط و حرکت روی لایه زمین به تکه شدن بلوکهای سنگها منجر شده‌اند و پس از وقوع لغزش هنوز زمان کافی برای گسترش درز و شکاف فراهم نشده است (شکل ۹).



شکل ۹ درزها و شکافها هنوز روی بلوکهای ریزشی گسترش چندانی ندارند. به لایه‌های لامه زنپوری محدود روی بلوک توجه کنید

محل و زمان عکسبرداری: جنوب روستای گاویشان (خردادماه ۱۳۸۲)

۶- عدم گسترش افقهای خاک: تحول افقهای گوناگون خاک با زمان تناسب مستقیم دارد. هر چه زمان بیشتری در اختیار سنگ قرار گیرد، توانایی ایجاد خاکهایی با افق تحول یافته و ضخیم را پیدا می‌کند. مشاهدات منطقه‌ای در جریان بازدید از منطقه وقوع لغزش نشان می‌دهد پهنه‌های محدودی که اغلب حالت دپرسیوهای طبیعی حاصل از مواد ریزشی را دارند، به وسیله مردم منطقه مسطح شده‌اند و به عنوان اراضی زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روی پهنه حاصل از حرکت و لغزش مواد، هم در روستای گاومیشان و هم در پیرامون روستای هلوش، وسعت و فراوانی تکه زمینهای زراعی بسیار محدود است. مردم روستای گاومیشان توانسته‌اند در برخی از چاله‌های طبیعی، به جالیزکاری محدود بپردازنده، شایان ذکر است که در این منطقه عمق خاک بسیار اندک و وسعت آنها نیز قابل توجه نیست. محدودیت پهنه‌های خاک و کمی عمق آن را باید به آرایش تازه مواد رسیزشی و لغزشی و در اختیار نبودن زمان کافی برای تحول افقهای خاک در منطقه نسبت داد (شکل ۱۰).



شکل ۱۰ فقط در نواحی محدود روی مواد حاصل از لغزش خاکهای تازه تشکیل شده است که در این قطعات محدود، جالیزکاری انجام می‌شود. مناطق سرسیز در این تصویر، روی مواد انباشته شده در تنگه سیمره و نهشته‌های دریاچه‌ای تشکیل شده‌اند و جالیز جلوی تصویر روی مواد لغزشی کشت شده است.

محل و زمان عکسبرداری: جنوب روستای گاومیشان (خردادماه ۱۳۸۲)

- ۷- محدودیت نهشته‌گذاری فرایندهای جریانی سطحی (سیمره و انشعابات آن) در نواحی کناره‌ای و مجاورت مواد لغزشی می‌تواند حاصل دو علت باشد:
- الف- جریانهای طغیانی مکرر و حمل مواد نهشته‌شده کناره‌ای از سالی به سال دیگر و محو آثار نهشته‌گذاری روی مواد حاصل از فرسایش.

ب- در اختیار نبودن زمان کافی برای نهشته گذاری؛ با توجه به بررسی شواهد آبرفتی در اطراف جریان سیمره و محدودیت گستره آبرفت‌های جدید در مناطقی که مورد لغزش قرار گرفته است، می‌توان حکم کرد که در این مورد هر دو عامل مذکور مؤثر بوده‌اند. با این حال توانایی رسوب‌زایی سیمره را نمی‌توان ذیر سؤال برد. گسترش بسیار وسیع آبرفت‌ها و نهشته‌های حاصل از جریان سیمره، انباشتن آنها در دریاچه حاصل از ریزش مواد بر بستر سیمره و ایجاد بند، خود می‌تواند گویای پتانسیل بالقوه رسوب‌زایی در منطقه باشد. با این حال جریان طغیانی رود سیمره را نیز نباید از یاد برد که می‌تواند سبب شود حتی مواد نهشته‌شده کناره‌ای که در طول سالهای متمادی نهشته شده‌اند طی یک جریان سیلانی، برداشته شده و توسط رود حمل شود. به هر حال عدم گسترش این مواد در کناره‌های رود را می‌توان با اندکی سهل‌انگاری، به علت زمان اندکی دانست که در اختیار سیمره قرار گرفته تا امر نهشته‌گذاری را بعد از وقوع لغزش انجام دهد (شکل ۱۱).



شکل ۱۱ روی رسوبات دریاچه‌ای قدیمی سیمره که بر اثر مسدود شدن بستر سیمره ایجاد شده بود، آثاری از ایجاد آبراهه‌ها و کنده‌کاری دیده نمی‌شود و امتداد منحنيها فقط خوش خاک و ایجاد اثر ردپای گوسفندان^۱ را روی این نهشته‌ها نشان می‌دهد.

محل و زمان عکسبرداری: شمال روستای هلوش (خرداد ۸۲)

۱. Terracette

۴- نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که:

- الف- در میان آثار منتشر شده درباره لغزش بزرگ سیمراه از نظر بیان ویژگیها و ابعاد لغزش، اختلاف نظرهایی وجود دارد که نیازمند اصلاح بوده است و به هنگام ارائه آنها باید احتیاط را رعایت و محاسبات و اندازه‌گیریهای میدانی و جدید را انجام داد.
- ب- اغلب آثار منتشر شده بدون توجه به مشاهدات میدانی و به شکل تکرار نوشته‌ها و آثار دیگران بوده است و حتی نمی‌توان به روش متواتر تاریخی، استناد محیطی کرد و حکم ژئومورفولوژیکی صادر نمود.
- ج- در صورتی که شک، در نوشته‌های متواتر و مکرر مد نظر پژوهشگر قرار نگیرد و انجام کارهای میدانی و مشاهدات دست اول و اندازه‌گیریها و محاسبات جدید را در چارچوب امر پژوهش نپذیرد، مجبور به حکم‌کردن از راه دور و یا جمعبندی آثار دیگران و ارائه مطالب تکراری خواهد شد.

بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی از نظر سینستنجی پدیده لغزش بزرگ سیمراه (کیبرکوه) نشان داد که علی‌رغم تکرار زمان و وقوع ده هزار ساله به وسیله پژوهشگران، مستندات و شواهد ژئومورفولوژیکی این زمان را تأیید نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که زمان وقوع ذکرشده به وسیله مورخ مشهور طبری با اندکی ملاحظه برای تعیین سن مطلق وقوع لغزش سیمراه قابل استفاده باشد.

وی بیست و دوم ژوئن سال ۸۷۲ میلادی، برابر با یازدهم شعبان سال ۲۵۸ هجری قمری را به عنوان روز وقوع زلزله بزرگ در سیمراه که باعث وقوع لغزش‌های بزرگ در منطقه شده، ارائه کرده است.

می‌توان این تاریخ را با توجه به شواهد ژئومورفولوژیکی برای وقوع لغزش پذیرفت اما باید دقت کرد که زمان مذکور، زمان وقوع زلزله و پیامد آن لغزش سیمراه نبوده است بلکه بر عکس، این زمان، زمان وقوع لغزش سیمراه و لرزش زمین و احساس آن به وسیله اهالی منطقه و نواحی دورتر بوده است. شواهد ژئومورفولوژیکی زمان هزار و صد ساله را برای وقوع لغزش تأیید می‌کند و تأیید کننده زمان یازده هزار ساله نمی‌باشد (شکل‌های ۱۲ و ۱۳).



شکل ۱۲ حفره‌های ریزشی ناشی از نفوذ آبهای سطحی به درون رسوبات دریاچه‌ای سیمره و انحلال مواد قابل حمل از درون آنها

زمان و محل عکسبرداری: شمال روستای هلوش، کنار جاده سراب جهانگیر به دره شهر (خردادماه ۱۳۸۲)



شکل ۱۳ تصویر جالبی که سطح شیبدار لغزش مواد آهکی آسماری را روی سازند گچساران نشان می‌دهد. پوشش گیاهی منطقه هنوز نتوانسته است کاملاً بر سطح لغزش بزرگ سیمره استقرار پیدا کند. محل و زمان عکسبرداری: ۱/۴ کیلومتری جنوب روستای گاو میشان (خردادماه ۱۳۸۲)

برای تأیید این امر شواهد ژئومورفولوژیکی هشتگانه در متن ارائه شد. فرضیات اول و سوم مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه دوم رد شد. محدوده وقوع زمین‌لغزه بزرگ سیمراه به عنوان یک کارگاه نمونه آموختشی - پژوهشی برای انجام آموزشها و پژوهش‌های میدانی ژئومورفولوژیک درباره لغزش‌های زمین و بررسیهای پیشرفته‌تر در آن، پیشنهاد می‌شود.

۵- منابع

- [1] Bloom, A.L.; Geomorphology, a systematic analysis of late cenozoic landforms; New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1978.
- [2] Fisher W.B.; The cambridge history of Iran. The land of Iran; Vol.1, U.K.: Oxford Universiy Press, 1968.
- [3] Banihabib, M.E. & Shoaei Z.; "A model for the seizizing of debris deposition in Seimareh Area"; Seoul: *4th International Conference on Hydro Science and Engineering*, http://kflki.baw.de/conferences/ICHE/2000_seeoul/html, 2000.
- [۴] برگریزان، محمود؛ «زمین‌لغزه سیمراه و نهشته‌های دریاچه‌ای در جنوب باختن پل دختر لرستان»، مجموعه مقالات نخسین سمپوزیوم بین‌المللی کواترنر؛ تهران: دانشگاه تهران، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۳۷۴.
- [۵] کمکپناه، علی و دیگران؛ پهنه‌بندی زمین‌لغزه در ایران؛ زمین‌لغزه و مروری بر زمین‌لغزه‌های ایران؛ ج ۱؛ مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۳.
- [6] N.I.O.C.; Geological map of Iran, Sheet No 4. South – West Iran. 1:1/000/000. Oil Service Co, of Iran ltd. 1969, H.Huber/. Tehran 1975.
- [۷] سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران، نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰۰؛ ۱ پل دختر، برگ III-۵۵۵ از سری ۷۵۲-K، تهران: ۱۳۵۵.
- [۸] سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ایران، عکس‌های هوایی ۰۰۰۵۵/۰۰۵: ۱، شیت ۲۶، ش ۵-۷۴۶۴، ۱۳۷۵-۷۹۱۰، تهران: ۱۳۲۵.
- [۹] USEGS, LANDSAT-7, IMAGE/037 – 167, 3rd fram of Ilam province, Iran, 1985.
- [۱۰] مطیعی، همایون؛ «چینه‌شناسی زاگرس»، از مجموعه کتابهای زمین‌شناسی ایران (۱)، سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۷۲.
- [۱۱] برزگر، فرج؛ پهنه‌بندی خطر نسبی زمین‌لرزه در ایران؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۷۶.



- [۱۲] امبرسن، ن، ن و ب - ب، ملویل؛ تاریخ زمین‌لرزه‌های ایران؛ ترجمه ابوالحسن رده؛ تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۰.
- [۱۳] کمکپناه، علی و سعید منتظر القائم؛ مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی راهبردهای کاهش خسارات زمین‌لرزه در کشور؛ تهران: مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۷۳.
- [۱۴] رهنماei، محمد تقی؛ «شناخت آلودگی و منابع آلیندۀ آبها (رویدخانه سیمراه)»، گزارش، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، اداره کل محیط زیست ایلام، ۱۳۷۵.
- [۱۵] Chorley, R.J., Schumm S., Sugden D.; Geomorphology, Metuen & Co Ltd. London:1984.
- [۱۶] ابرلندر، تئودور؛ رویدخانه‌های زاگرس؛ ترجمه: معصومه رجبی و احمد عباس نژاد؛ تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۷۹.
- [۱۷] عالی طالقانی، محمود؛ ژئومورفولوژی ایران؛ تهران: نشر قومس، ۱۳۸۱.
- [۱۸] درویش زاده، علی؛ زمین‌شناسی ایران؛ تهران: نشر دانش امروز، ۱۳۷۰.
- [۱۹] شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران؛ «مطالعات پیش توجیهی طرح سد مخزنی و نیروگاه برق‌آبی کوران بوزان»، گزارش هیدرولوژی؛ تهران: مهاب قدس، ۱۳۷۸.
- [۲۰] ابرلندر، تئودور؛ «اشکال خاص از پیکرشناسی زاگرس»؛ ترجمه سید رضا صدرالدین؛ فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، ش ۳۳، تهران: بهار، ۱۳۷۲.
- [۲۱] Shreve, R.L. Shermam Landslide. Alaska, Science. Vol.154, 1966.
- [۲۲] Harison, J.v.& N.l. Falcon; "An ancient landslip at Saimareh in Southwestern Iran", Geo, Vol.46, 1936.
- [۲۳] Harision, J.V & N.l. Falcon; "The Seimareh Landslip, Southwest Iran", Geos.J.No.42, 1937.
- [۲۴] Harrison, J.V; Southwest Persia, A survey of the Pish – I –kuhj in luristan, Geogr. J. No.56, 108, 1964.
- [۲۵] Harrison j.V; Kuh – Galu, South – West Iran, Geogr.J.88:20, 1936.
- [۲۶] Gaudie. A; The changing earth, rates of geomorphological processes, U.K.: Oxford, Blak well, 1995.