

آفات و بیماریهای گیاهی

جلد ۷۱، شماره ۲، اسفند ۱۳۸۲

بررسی کارآیی شعله افکن در مقایسه با روشهای متداول مبارزه با علفهای هرز در مزارع کشت مستقیم پیاز

Investigating efficacy of flaming compared to common methods of weed control in seeded onion (*Allium cepa L.*) Fields

پرویز شیمی و سید احمد فقیه

بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

(تاریخ دریافت: شهریور ۸۱ تاریخ پذیرش: اسفند ۸۲)

چکیده

در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ طی یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۱۰ تیمار، کارآیی شعله افکن در مقایسه با روشهای متداول مبارزه با علفهای هرز در مزارع پیاز مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: کاربرد علفکش ایوکسینیل (توتریل ۲۲/۵٪) به میزان ۳ لیتر در هکتار در اوایل رشد علفهای هرز پهنه برگ + ۳ لیتر ستوكسیدیم (نابو-اس ۱۲/۵٪) در مرحله ۳-۶ برگی باریک برگها در دو تیمار با یکبار و چین و بدون وچین، کاربرد علفکش کلرتال دیمتیل (دکتال ۷۵٪) به میزان ۱۲ کیلوگرم در هکتار در دو تیمار یک بار و چین و بدون وچین، سوزاندن علفهای هرز توسط شعله افکن در مرحله ۵ سانتی متری پیاز با سرعت ۲۵٪ متر در ثانیه در دو تیمار با یکبار و چین و بدون وچین، کاربرد علفکش پاراکوات (۲۰٪) در مرحله ۵ سانتی متری پیاز به میزان ۳ لیتر در هکتار در دو تیمار با یکبار و چین و بدون وچین، شاهدهای با و بدون علف هرز. علف هرز عمده

آزمایش *Chenopodium album L.* بود. نتیجه آزمایشات نشان داد که استفاده از علفکشهاي آزمایش شده و یا شعله افکن باضافه یکبار و چین میتوانند علفهای هرز مزارع پیاز را به نحو مطلوب کنترل نموده و عملکرد را نیز افزایش دهنند. بدین ترتیب شعله افکن میتواند جانشین مناسبی برای علفکشها در مزارع پیاز باشد.

واژه‌های کلیدی: پیاز، علفهای هرز، علفکش، شعله افکن

مقدمه

نظر به اینکه سم های کشاورزی آلوه کننده محیط زیست هستند، متخصصین بفکر کاهش مصرف و یا حتی جایگزینی برای آنها افتاده‌اند. کشورهای اروپای شمالی در این راه پیشقدم بوده و تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام داده است. از جمله وسایلی که بعنوان جایگزین علفکشها با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است انواع شعله افکن می‌باشد. بهترین زمان از بین بردن علفهای هرز توسط شعله افکن مرحله ۲-۱۰ سانتی‌متری علفهای هرز می‌باشد (Anonymous, 2003).

استفاده از شعله افکن جهت مبارزه با علفهای هرز در کشت‌های مختلف نتایج مطلوبی داشته است : در سیب زمینی (Ascard, 1988)، ذرت (Balsari, 1991)، کلم سفید (Balsari et al. 1994) کاهو (Holmoy and Botland 1994; Netland, 1994) هویج (Diver2002 ; Parish,1990 ; Ascard,1988) زمینه صورت گرفته است.

طبق گزارش Parish 1990 پیاز در مرحله ۵ سانتی‌متر به شعله مقاوم می‌باشد. Vester(1988) گزارش کرده است که شعله افکن در مزارع پیاز، ذرت، سیب زمینی و چغندرلبوئی بصورت انتخابی عمل می‌نماید. او زمان مصرف شعله افکن را درست بعد از سیز شدن پیاز، یعنی زمانیکه حدود ۱ سانتی‌متر رشد کرده است توصیه نموده و معتقد است در این مرحله پیاز نسبت به شعله افکن مقاوم است. براساس تجربیات Diver,2002 مرحله ۵ - ۷/۵ سانتی‌متری پیاز بهترین زمان استفاده از شعله افکن در مزارع پیاز می‌باشد.

Ascard, 1989 گزارش کرده است که شعله افکن را میتوان در مزارع پیاز در مراحل

قبل از سبز شدن و یا هنگامیکه ۱۵ سانتیمتر رشد کرده باشد علوفهای هرز استفاده نمود.

همین نویسنده در سال ۱۹۸۸ نوشته است که زمانیکه گیاه پیاز ۱۵-۲۰ سانتیمتر است شعله

افکن را باید فقط بین ردیفها استفاده نمود.

Melander & Rasmussen, 2001 توانسته‌اند با استفاده از شعله افکن، علوفهای هرز را

در مراحل اولیه رشد و قبل از سبز شدن پیاز تا ۹۲ درصد کنترل نمایند. در نهایت شعله افکن بن

یکی از ابزارهای معمول مبارزه با علوفهای هرز در مزارع پیاز کشت ارگانیک در اروپا می‌باشد

(Anonymous, 2003; Ascald and Bellinder, 1996; Melander, 1998; Tie et al; 1999)

در ایران علف‌کش‌های توصیه شده در مزارع پیاز عبارتند از ایوکسینیل (پهن

برگ‌کش)، کلتال دیمتیل (پهن و باریک برگ‌کش)، و باریک‌برگ کشهای ستوكسیدیم و

سیکلوکسیدیم (Mosalla-nejad, et al., 20). در این آزمایش، علفکش‌های توصیه شده ایران در

مقایسه با شعله افکن طی سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در آذربایجان‌شرقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

روش بورسی

این طرح بصورت دو آزمایش مجزا در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار و

۱۰ تیمار اجرا گردید: آزمایش اول به صورت کشت ردیفی و آزمایش دوم کشت کرتی

(دستپاش) بود.

تیمارهای هر یک از دو آزمایش عبارت بودند از :

تیمار ۱ - سمپاشی توسط علفکش ایوکسینیل (توتریل ۲۲/۵ درصد) به میزان ۳ لیتر (از ماده

تجارتی) در هکتار در اوایل رشد علوفهای هرز + ۳ لیتر (از ماده تجارتی) ستوكسیدیم (تابو -

اس ۱۲/۵ درصد) در هکتار در مرحله ۳-۶ برگی رشد باریک برگها + یکبار و چین دستی در

زمان مورد نیاز. تیمار ۲ - مانند تیمار ۱ بدون و چین. تیمار ۳ - سمپاشی توسط علفکش کلتال

دیمتیل (دکتال ۷۵ درصد پودر) به میزان ۱۲ کیلوگرم (از ماده تجارتی) در هکتار بعد از کاشت

قبل از سبز شدن پیاز + یکبار و چین دستی در زمان مورد نیاز. تیمار ۴ - مانند تیمار ۳ بدون

و چین. تیمار ۵ - سوزانیدن علوفهای هرز توسط شعله‌افکن هنگامیکه پیاز در مرحله ۵

سانتی‌متری بود + یکبار و چین دستی. علفهای هرز در مرحله ۱۰ سانتی‌متری از رشد بودند. تیمار ۶- مانند تیمار ۵ بدون و چین، تیمار ۷- مانند تیمار ۵ با این تفاوت که بجای شعله افکن از پاراکوات ۲۰٪ مایع به میزان ۳ لیتر (از ماده تجاری) در هکتار استفاده گردید. تیمار ۸- مانند تیمار ۷ بدون و چین، تیمار ۹- شاهد بدون علف هرز (سه بار و چین در زمانهای مورد نیاز). تیمار ۱۰- شاهد بدون و چین : علفهای هرز این تیمار به هیچ طریق کنترل نشدند.

قطعات آزمایش $10/8 = 1/8 \times 6$ متر مربع بودند. کرتها ردیفی دارای ۳ پشته با فاصله ۶۰ سانتی‌متر از یکدیگر و روی هر پشته دو ردیف پیاز کاشته شده بود. آبیاری آزمایش طوری صورت گرفت که فاضلاب هیچ یک از کرتها وارد کرت دیگر نگردد. رقم پیاز مورد استفاده قرمز آذر شهر، میزان بذر ۳ کیلو در هکتار و خاک مزرعه از نوع لوم شنی بود. سعپاش مورد استفاده از نوع PC₃ و تک نازله بوده و برای آزمایش از نازل شرهای استفاده گردید. مقدار آب مصرفي ۳۰۰ لیتر در هکتار بود.

شعله افکن از نوع Pulsfog ساخت آلمان با سوخت گازوئیل بود. سرعت حرکت شعله افکن هر قدم ۰/۲۵ متر در ثانیه و فاصله دهانه آن با زمین ۱۰ سانتی‌متر بود.

آمار زیر از آزمایش تهیه گردید:

شناسائی علفهای هرز آزمایش از کرتها شاهد با علف هرز، شمارش علفهای هرز هر کرت در ۴ کادر ۰/۲۵ متری ۲۰ روز پس از سعپاشی و یا استفاده از شعله افکن، توزین محصول پیاز : در کشت ردیفی از ۴ خط وسط به طول ۵ متر با حذف نیم متر از طرفین و در کشت کرتی $6/5 = 1/3 \times 5$ متر مربع با حذف ۰/۵ متر از طرفین.

نتایج بدست آمده تجزیه واریانس شده و میانگین‌ها توسط آزمون دانکن مقایسه گردید. از آنجا که براساس آزمون بارتلت بین واریانس خطا در آزمایشهای سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ برای علف هرز سلمک، سایر علفهای هرز و عملکرد پیاز اختلاف معنی‌دار وجود داشت، لذا تجزیه مرکب برای دو سال انجام نشد و نتایج بصورت جداگانه برای هر سال نشان داده شده است.

انگیزه اجرای طرح در دو کشت کرتی و ردیفی بررسی هر یک از تیمارها در دو روش کشت بوده و مقایسه دو کشت به هیچ عنوان مورد نظر نبوده است.

جدول ۱ - علف های هرز موجود در کرتهای آزمایش طی سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹

Table 1- Weeds in the experimental fields during the years of experiment (1999-2000)

نام علمی scientific names	نام فارسی Names in Persian
<i>Chenopodium album L.</i> (dominant)	سلمک (غالب)
<i>Heliotropium lasiocarpum fisch. & C.A.Mey</i>	آفتاب پرست
<i>Atriplex tataricum L.</i>	هشتاخانی
<i>Amaranthus blitoides S.Watson</i>	تاج خروس خوابیده
<i>A. retroflexus L.</i>	تاج خروس وحشی
<i>Hyoscyamus niger L.</i>	بذرالبنج
<i>Lactuca serriola L.</i>	گار چاق کن
<i>Fumaria officinalis L.</i>	شاه تره
<i>Tribulus terrestris L.</i>	خارخسک
<i>Mellilotus officinalis (L.) Pall.</i>	بونجه زرد
<i>Polygonum perfoliatum M.B.</i>	هفت بند
<i>Salsola kali L.</i>	علف شور
<i>Echinochloa crus-galli (L.)P.Beauv.</i>	سوروف
<i>Setaria verticillata (L.)P.Beauv.</i>	چسبک
<i>S.viridis (L.)P.Beauv.</i>	ارزن وحشی
<i>Sonchus oleraceus L.</i>	شیر نرم

نتیجه و بحث

علف هرز غالب در هر دو سال آزمایش سلمک (*Chenopodium album*) و در سال اول آفتاب پرست (*Heliotropium lasiocarpum*) نیز جزء علفهای هرز غالب بود. لیست کامل علفهای هرز آزمایش در جدول ۱ مشخص شده است. این جدول نشان میدهد که آزمایش از تنوع علف هرز مناسبی برخوردار بوده است. در جدول ۲ تعداد علف هرز سلمک که در هر

دو سال آزمایش غالب بوده است و در صد کترول آن نشان داده شده است. در جدول ۳ میانگین تعداد سایر علوفهای هرز و درصد کترول آنها در تیمارهای مختلف طی ۲ سال آزمایش نشان داده است. در میان تیمارها فقط تیمارهای استفاده از شعله افکن خسارت اولیه (پژمردگی) به پیاز وارد آورد که خیلی زود این حالت بر طرف و پیاز به رشد خود ادامه داد و از این لحاظ نسبت به سایر تیمارها تاخیر رشد نداشت. جدول ۴ نیز نمایانگر میانگین عملکرد پیاز است.

با توجه به داده‌های جداول ۲ و ۳ اعمال کلیه تیمارها در مهار علوفهای هرز بسیار موثر بوده‌اند. تیمارهایی که در کلیه موارد علوفهای هرز را بالای ۹۰٪ کترول نمودند عبارت بودند از علفکش و یا شعله افکن + یکبار و چین. پاراکوات کمی ضعیفتر از سایر علفکشها و یا شعله افکن عمل نمود ولی در حد توصیه می‌باشد.

تأثیر در عملکرد پیاز (جدول ۴) نیز مشابه کترول علوفهای هرز بوده است. نتایج نشان میدهد که در صورت عدم مبارزه با علوفهای هرز در مزارع پیاز، خسارت ناشی از آنها میتواند نزدیک به صد درصد باشد. اکنون عملکرد محصول پیاز را طی دو سال آزمایش مورد تحلیل قرار میدهیم:

در پیاز ردیفی سال اول، بیشترین عملکرد متعلق به شاهد بدون علف هرز بود و پس از آن، تیمارهای علفکش و یا شعله افکن + یکبار و چین بیشترین عملکرد را داشته‌اند. سپس تیمارهای ایوکسینیل + ستوكسیدیم و کلرتال دیمتیل و ضعیفتر از همه تیمارهای شعله افکن و پاراکوات بدون و چین بودند. در سال دوم، تیمارهای علفکش و یا شعله افکن + یکبار و چین عملکردی مشابه شاهد بدون علف هرز داشتند. سپس تیمار شعله افکن در ردیف بعدی قرار گرفت و پس از آن سایر علفکشها قوار گرفتند. در پیاز کرتی، در هر ۲ سال آزمایش، بهترین تیمارها متعلق به تیمارهای علفکش و یا شعله افکن + یکبار و چین بودند، گرچه در سال اول، تیمار شعله افکن + یکبار و چین برتری داشت. تیمار کلرتال دیمتیل نیز در سال دوم از عملکرد خوبی برخوردار بود.

نتیجه کلی از دو سال آزمایش فوق اینکه، روش‌های کترول علوفهای هرز در پیاز کرتی و ردیفی مشابه عمل می‌نمایند.

جدول ۲- میانگین تعداد سلک (علف هزار عالب) در مترمربع و درصد کنترل آن نسبت به شاهد با علف هزار در مترمربع در گرسنگی داری داشتند.

Table 2. Average number of lambsquarters (dominant weed) /m² and its %control in row and traditional cultivation.

Treatment تیمار	Year 1999						Year 2000					
	traditional			Row			traditional			Row		
	کریز	روغنی	TOW	کریز	روغنی	TOW	کریز	روغنی	TOW	کریز	روغنی	TOW
ioxyynil + sethoxydym + one hand weeding	2	c	93	0.8	c	97	1.75	b	98	1.5	b	96
ioxyynil + sethoxydym	8.8	b	69	6	b	80	5.75	c	92	3.75	c	91
chlorthaldimethyl + one hand weeding	0.5	de	98	1	c	97	0	a	100	0	a	100
chlorthal dimethyl	0	e	100	7.8	b	74	6.75	c	91	5.5	c	87
flamer + one hand weeding	0	e	100	0	c	100	0	a	100	0	a	100
Flamer	2	cd	93	4.5	b	85	8.25	c	89	4	c	90
paraquat + one hand weeding	1.8	cd	94	2.3	c	92	0	a	100	0	a	100
paraquat	7.3	b	74	6.5	b	78	4.75	c	94	3.75	c	91
hand weeded check	0	e	100	0.3	c	99	0	a	100	0	a	100
weedy check	28.5	a	0	30	a	0	74.8	d	0	42.25	d	0

* مرور شتابه بعد از اضافه میانگین زمان چند دامنهای داشتند.

*Numbers followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan's Multiple Range Test.

جدول ۳- میانگین تعداد سایر علفهای موز در سه روش در مدت زمانی کوتاه‌تر از ۲ سال آزمایش.

Table 3- Average number of other weeds /m² and their %control in traditional and row cultivation during the 2 years of trials.

Treatments	Year 1999 / ۱۳۷۸ سال										Year 2000 / ۱۳۷۹ سال									
	بیان بroadleaf weeds					علفهای grassy weeds					بیان بroadleaf weeds**					بیان بroadleaf weeds**				
	traditional	کرنی	Row	traditional	کرنی	row	traditional	کرنی	row	traditional	کرنی	row	traditional	کرنی	row	traditional	کرنی	row	traditional	کرنی
Ioxynil + sethoxydim + onchandweeding	4.8	c	94	2	c	96	0.5	d	96	0	d	100	2.25	d	94	2.25	cd	92		
Ioxynil+sethoxydim	21.3	b	72	16.8	b	65	5.5	bc	83	2.5	c	77	5	bc	86	5.25	e	80		
Chlorbaltidimethyl+one handweeding	1.5	d	98	3.5	c	93	0.5	d	96	0.5	d	95	2.25	d	94	2.25	cd	92		
Chlorthal dinethyl	0	d	100	16.3	b	66	8.8	ab	25	9	a	17	8	b	78	4.5	d	83		
Flamer + one handweeding	0	d	100	0	c	100	0	d	100	0	d	100	0.25	e	99	0	f	100		
Flamer	5.5	c	93	9.5	b	86	6.5	bc	45	6.3	b	42	5	bc	86	4.25	d	84		
Paraquat + one handweeding	3.5	c	95	4.5	c	91	1.3	d	89	1	cd	91	2.5	d	94	6.25	c	77		
Paraquat	16.3	b	78	13.25	b	72	4	cd	60	5.8	b	46	4	c	89	12.5	b	53		
Handweeded	0	d	100	0	c	100	0	d	100	0	d	100	0	e	100	0	f	100		
Weedy check	75.3	a	0	48	a	0	11.8	a	0	10.8	a	0	36.25	a	0	26.75	a	0		

*مرتب شده با ابتدا از انداد در سه سطح تراکم اسید (آزمون دست داشتی).

*Numbers followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan's Multiple Range Test.

**The second year experiment did not contain grassy weeds

***آزمایش سال دوم ناکام علوفهای موز بارگاه برگ بود.

جدول ۲ - میانگین عملکرد محصول پیاز (تن در هکتار) در دو کشت ریبی و گرتی طی دو سال آزمایش.

Table 4 – Average onion yield (tons/ha) in row and traditional cultivation during the two years of trials.

Treatment	Year 1999			Year 2000		
	Traditional	کری	روز	Traditional	کری	روز
ioxynil+sethoxydim+one hand weeding	15.78	b	14.88	b	16	a
ioxynil+sethoxydim	8.75	c	8.5	d	4.7	c
chlorthaldimethyl+one hand weeding	15.08	bc	12.6	c	14	a
chlorthal dimethyl	10.43	d	8.8	d	11.8	a
flamer + one hand weeding	17.5	a	12.9	c	9.2	ab
Flamer	8.73	e	4.95	e	3.2	bc
paraquat+one hand weeding	14.58	c	12.4	c	9.8	ab
paraquat	3.88	f	4.98	e	0.8	c
hand weeded check	17.95	a	16.38	a	15.1	a
weedy check	3.53	f	2.2	f	0.5	c
						8

* حروف مشابه بعد از اعداد در هر سترن نمایانگر عدم وجود اختلاف معنی دار بین آنها است (از میان چند اصله ای دانکن).

* Numbers followed by similar letters in each column are not significantly different according to Duncan's Multiple Range Test.

برای کنترل مطلوب علفهای هرز و عملکرد بالا، علفکش‌های توصیه شده و یا شعله افکن باستی همراه با یکبار و چین استفاده شوند. علفکش پاراکوات را میتوان مانند شعله افکن هنگامیکه پیاز در مرحله حدود ۵ سانتیمتری است در مزرعه پاشید بدون اینکه خسارتی به پیاز وارد آید. در این مرحله کلیه علفهای هرز سبز شده از میان میروند و هر علف هرزی که بعد از سمپاشی سبز شود از بذر خواهد بود، که یکبار و چین آنها را نیز حلقه خواهد نمود.

استفاده از شعله افکن در مرحله ۵ سانتیمتری، پیاز را در وحله اول پژمرده میسازد ولی خیلی سریع به حالت اول باز میگردد و به رشد معمول خود ادامه میدهد. این یافته با گزارشات ۱۹۹۰ Parish و ۲۰۰۳ Diver، گزارشات ۱۹۹۰ Parish و ۲۰۰۳ Diver، شعله افکن نه تنها علفهای هرز سبز شده را کنترل می‌نماید، بلکه بذر علفهای هرز را در سطح زمین می‌سوزاند و از جوانه زدن آنها جلوگیری بعمل می‌آورد. این خاصیت امتیازی است برای شعله افکن.

در مجموع نتایج دو سال آزمایش نشان می‌دهد که، استفاده از شعله افکن میتواند جانشین مناسبی برای علفکشها باشد. همانگونه که در متابع نیز آمده است، شعله افکن بعنوان یک وسیله مناسب برای مبارزه با علفهای هرز مزارع پیاز در کشت‌های ارگانیک استفاده می‌شود. (Tie et al., 1999; Milander, 1998; Ascard & Bellinder, 1996; Anonymous, 2003).

نشانی نگارندگان : پرویز شیمی، سیداحمد فقیه. بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران صندوق پستی ۱۴۵۴-۱۹۳۹۵.