

مطالعه مورفولوژیک و بیولوژیک مگس سفید گلخانه

[*Trialeurodes vaporariorum* Westwood (Homoptera: Aleyrodidae)]

در اصفهان

حسن قهاری و بیژن حاتمی^۱

چکیده

مشکل مبارزه با مگس سفید گلخانه روی گیاهان زراعی و گلخانه‌ای، مطالعات و تحقیقات وسیعی را در مناطق مختلف ایران ضروری می‌سازد. بررسی‌های مورفولوژیک و مطالعات زیست‌شناسی بر روی گونه شایع *Trialeurodes vaporariorum* Westwood در اصفهان به عمل آمد.

در این بررسی، به غیر از *T. vaporariorum* ۵ گونه (*Lantana camara* sp.) و شاه پسند درختی (*Althaea* sp.) مگس سفید دیگر شامل *B. hancoki* Corbett و *B. argentifolii* Bellows & Perring, *Bemisia tabaci* Gennadius از روی *Rosa* sp. از روی *Aleyrodes rosae* Mask, *Brassica* sp., *Aleyrodes proletella* L. و *Aleyrodes vaporariorum* Mask (ظاهری *T. vaporariorum*) و مراحل مختلف رشدی آن شامل جمع‌آوری، و با استفاده از کلیدهای تشخیص شناسایی گردید. مطالعات زیستی این حشره بر روی گیاه بادمجان تخم، پوره‌های سنین ۱، ۲، ۳، ۴ و حشره کامل اندازه‌گیری، و با رسم شکل ارائه گردید. طول وسایعی این حشره در شبانه روز، در آزمایشگاه انجام گرفت. طول مراحل رشدی برای تخم 65 ± 5 درصد، و دوره نوری ۱۶ ساعت روشناختی در شبانه روز، در مداری 24 ± 1 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی 45 ± 5 درصد، و دوره نوری ۱۶ ساعت در مدت سوم 26 ± 1 ، سن چهارم 23 ± 1 ، سن پنجم 22 ± 1 ، سن ششم 21 ± 1 و سیزدهم 20 ± 1 روز بود. تعداد تخم این حشره در مدت ۲۴ ساعت، بین یک تا ده و به طور متوسط 1.67 ± 0.13 شمارش گردید. طول عمر حشره نر بین ۱۹ تا ۲۳ و با متوسط 21.04 ± 1.05 و برای حشره ماده ۲۰ تا ۲۸ و با متوسط 24.44 ± 1.17 روز اندازه‌گیری گردید. چهار سن پورگی برای مگس سفید گلخانه تفکیک، و برای سن چهارم پورگی نیز سه زیر مرحله با خصوصیات مورفولوژیک معین تشخیص داده شد. بین سنین پورگی و میانگین طول و عرض بدن هم بستگی مثبتی وجود داشت. در این بررسی، ماده‌های با کره مگس سفید گلخانه فقط نتاج نر تولید نمودند، لذا نزد این مگس سفید در اصفهان از نوع نزاد اروپایی شناخته شد.

واژه‌های کلیدی: مگس سفید گلخانه، چرخه زیستی، بادمجان

۱. به ترتیب دانشجوی سایق کارشناسی ارشد و استادیار حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مقدمه

بررسی‌های زیادی صورت نگرفته، و به غیر از نوشه‌های پراکنده‌ای که درباره یک یا دو گونه موجود می‌باشد، فقط می‌توان به بررسی‌های فونستیکی در استان فارس توسط آل منصور^(۱)، و تهیه کلید شناسایی مگس‌های سفید استان فارس توسط ضرابی^(۴) اشاره نمود.

با توجه به تعداد زیاد نسل در اغلب مگس‌های سفید، در بین جمعیت‌های یک گونه مربوط به مناطق و نواحی مختلف، تفاوت‌هایی از لحاظ ترجیح گیاه میزبان، دوره زندگی و توانایی انتقال بیماری‌های گیاهی مشاهده می‌شود، که در واقع نشانگر نزادها و بیوتیپ‌های^۲ مختلف آن گونه می‌باشد. برای تحقیق و مطالعه بیوتیپ‌ها و شناسایی آنها، نیاز به توسعه و تکمیل روش‌های مختلفی چون الکتروفورز^۳، سلول شناسی^۴، تجزیه هیدروکربن‌های کوتیکول^۵ و DNA پروب^۶ است. برای مثال *B. tabaci* نوع درون‌گونه‌ای قابل توجهی نشان می‌دهد. سابقاً بیش از ۱۸ گونه برای آن ذکر شده بود، اما بعداً معلوم گردید که آنها تغییرات مورفو‌لوزیک *B. tabaci*^۷ می‌باشند^(۱۱). پرینگ و همکاران^(۱۸)، به وسیله الکتروفورز و با روش IEF^۷، بیوتیپ *B. tabaci* را در شناسایی نمودند. خسارت بیوتیپ *B* در مزارع پنبه آمریکا، به ویژه در سال‌های اخیر، بسیار شدید بوده، که در مقایسه با بیوتیپ قدیمی *A* از لحاظ دامنه میزبانی، میزان تخم ریزی، مقدار عسلک دفع شده و ایجاد گیاه‌سوزی دارای تفاوت‌هایی می‌باشد.

اساس مبارزه با آفات، در واقع شناخت و مطالعه زیست‌شناسی آنها است. بنابراین روش مبارزه با مگس‌های سفید، مانند بسیاری از آفات دیگر، تنها شامل پاشیدن محلول‌های شیمیایی روی آنها نیست، بلکه مجموعه‌ای از روش‌های مبارزه است، که در استفاده از آنها مطالعه دقیق زیست‌شناسی و اکولوژی آفت بسیار ضروری می‌باشد^(۱۰).

مواد و روش‌ها

نمونه‌هایی از مگس‌های سفید، از روی گیاهان ختمی چینی

کاربرد سومون متعدد در مبارزه با آفات، عواقب سوء فراوانی در برداشته است. از آن جمله می‌توان به ایجاد مقاومت در آفات، طغیان آفات جدید، انهدام دشمنان طبیعی (پارازیتوئیدها و شکارگرها) و غیره اشاره کرد. از جمله آفاتی که ره‌آورد مبارزه‌های شیمیایی مستمر و عدم مدیریت صحیح بوده‌اند، مگس‌های سفید (Aleyrodidae) می‌باشند. مگس‌های سفید آفاتی با انتشار جهانی هستند که در اکثر گلخانه‌ها، روی بسیاری از گیاه‌های زراعی و زینتی دیده می‌شوند. این حشرات به شدت میزان تولید را کاهش می‌دهند، و رشد و توسعه قارچ‌های ساپروفیت، روی عسلک دفع شده آنها نیز موجب کاهش کیفیت محصول می‌گردد. در حال حاضر، به دلیل افزایش قدرت مقاومت مگس‌های سفید در برابر انواع سومون، مشکل مگس‌های سفید روی تعداد زیادی از گیاهان زراعی و زینتی حادتر شده است (۱۰ و ۱۸). تاکنون ۱۲۰۰ گونه مگس سفید از سراسر جهان معرفی شده است^(۷)، هر چند ممکن است تعداد واقعی آنها بیش از این باشد.

مگس‌های سفید حشراتی گیاه‌خوار، با قطعات دهانی زننده - مکننده و دهان‌زیر^۱ هستند. بدن آنها پوشیده از گرد موی سفیدرنگ است. مراحل مختلف زندگی آنها شامل تخم، پوره‌های سنین اول تا چهارم و حشره کامل می‌باشد، و در سال ۴-۱۵ نسل دارند. حشرات کامل *Trialeurodes vaporariorum* ناقل انواع ویروس‌های بیماری‌زای گیاهی نیز می‌باشند. این حشرات از دامنه میزبانی بسیار وسیع در جهان برخوردارند. برای مگس سفید گلخانه، ۲۴۹ جنس گیاه میزبان گزارش شده است. این حشرات با استخراج مقدار زیادی از شیره آوند آبکش گیاهان میزبان، به آنها خسارت وارد نموده، موجب کاهش عملکرد محصول تا ۵۰ درصد می‌گردد^(۱۹ و ۷).

در مورد شناسایی و طبقه‌بندی مگس‌های سفید ایران،

1. Opisthognathus 2. Biotype 3. Electrophoresis 4. Cytology 5. Cuticular hydrocarbon analysis

۶. Probe قطعه کوتاهی از اسیدنوكلئیک است که به عنوان مکمل ترتیب خاصی از بازهای اسیدنوكلئیک نمونه مورد نظر می‌باشد.
7. Isoelectric focusing

گردید. به علاوه طول تخم، طول و عرض بدن با بالهای باز در حشرات کامل نر و ماده در شش تکرار اندازه گیری شد. در تعیین چرخه زیستی، مطالعه طول مدت هر یک از مراحل رشدی، حداکثر تعداد تخم گذاشته شده، طول عمر حشرات کامل نر و ماده، و بررسی پدیده پارتنتوژنز^۲ (بکرزایی)، در شرایط ثابت از لحاظ دما، رطوبت نسبی و روشنایی به عمل آمد. برای این منظور، از دستگاه انکوباتور از نوع سرماساز استفاده گردید. رطوبت نسبی و دمای داخل انکوباتور در این آزمایش، به ترتیب 65 ± 5 درصد، و 24 ± 1 درجه سانتی گراد، و طول مدت روشنایی ۱۶ و تاریکی ۸ ساعت تنظیم شد. نور مورد نیاز به وسیله چهار لامپ مهتابی ۶۰ واتی، با ترکیبی از نورهای زرد و سفید، به صورت خودکار تأمین گردید. در این مطالعه از ۹ قفس استوانه ای، از جنس پلاستیک شفاف به قطر ۱۵ و ارتفاع ۲۵ سانتی متر استفاده به عمل آمد. داخل هر قفس، گلدانی از جنس پی وی سی به قطر دهانه ۱۱ و ارتفاع ۹ سانتی متر، که دارای یک بوته سه برگی بادمجان بود، قرار داده شد. برای ایجاد تهویه و یکسان نمودن شرایط داخل قفسها با شرایط داخل انکوباتور، سقف قفس برداشته و با پارچه توری مسدود شد. سپس در هر قفس شش جفت مگس سفید نر و ماده تازه خارج شده رها گردید. پس از ۲۴ ساعت، مگس های سفید از قفس بیرون آورده شدند. پس از تخم گذاری مگس ها، به ازای هر برگ یک تخم در نظر گرفته شد، و بقیه تخم های روی برگ با سوزن باریکی حذف گردیدند. به منظور افزایش دقیق در بررسی مراحل رشدی، به هر یک از سه برگ موجود روی هر بوته، یک شماره از یک تا سه تعلق گرفت. بدین ترتیب طول دوره مراحل مختلف رشدی مگس سفید گلخانه جمعاً در ۲۷ تکرار بررسی گردید. در تعیین میزان تخم گذاری و طول عمر مگس سفید گلخانه، از ۹ بوته دو برگی بادمجان استفاده به عمل آمد. این بوتها در قفس های استوانه ای شفاف با مشخصات فوق قرار داده شدند. برای سهولت در امر رهاسازی و خارج نمودن

(*Lantana camara* sp.)، رز (Rosa sp.) و گلم (Brassica sp.)، در پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان جمع آوری، و با تغییرات جزئی در روش آل منصور (۱) و فرخی (۵)، از نمونه ها پرپاراسیون تهیه، و به وسیله کلیدهای تشخیص (۴، ۱۰ و ۱۴) شناسایی، و به منظور تأیید نیز برای پروفسور ون لترن و دکتر ون رورموند^۱ ارسال شد. برای مطالعات زیست شناسی، نمونه هایی از مگس های سفید، از روی گیاه ختمی و شاه پسند درختی موجود در گلخانه دانشکده کشاورزی جمع آوری گردید. سپس این نمونه ها روی گیاه بادمجان (*Solanum melongena* sp.)، که برگ آن دارای بافت نسبتاً نرم و کرک های ریز زیبادی است، پرورش داده شدند. محل پرورش گلخانه ای، به ابعاد $12 \times 3 \times 2$ متر، با دمای متغیر $30 - 18$ درجه سانتی گراد (حداقل و حداکثر حرارت شباهه روز) و رطوبت نسبی $70 - 60$ درصد بود. یک گلدان از جنس پی وی سی و به قطر ۲۶ و ارتفاع ۲۰ سانتی متر، که حاوی یک بوته $10 - 6$ برگی بادمجان بود، داخل قفس چوبی قرار داده شد، و در مجموع از ۱۴ قفس استفاده گردید. هر قفس چوبی به ابعاد $70 \times 70 \times 70$ سانتی متر بود، که از شش جهت با پارچه توری ۵۰ مش پوشیده شده بود. بوتهاي داخل قفسها به حشرات کامل مگس سفید گلخانه آلووه گردیدند. به منظور افزایش سطح برگ گیاه میزبان، پس از این که ارتفاع بوتهاي جوان به حدود ۲۵ سانتی متر رسید، جوانه انتهایی آنها قطع گردید.

از آن جایی که پوره های مگس سفید بلا فاصله بعد از پوست اندازی حالت مسطح و ورقه ای پیدا می کنند، در تفکیک سنین مختلف پورگی اندازه های میکروسکوپی طول و عرض بدن آنها مورد استفاده قرار گرفت. اندازه گیری ها، با استفاده از یک بینوکولر با عدسی چشمی مدرج به عمل آمد. برای این کار قطعاتی از برگ های حاوی سنین مختلف پورگی روی لام قرار داده شد. سپس اندازه هر یک از سنین پورگی در شش تکرار تعیین، و رابطه سنین پورگی با طول و عرض بدن محاسبه

۱. استادان دانشگاه Wageningen و H. J. W. Van Roermund و J. C. Van Lenteren.
۲. Parthenogenesis

آوری مگس‌های سفید از برگ‌ها، برای جلوگیری از فرار آنها، هر یک از این برگ‌ها ابتدا درون کیسهٔ پلاستیکی مخصوص، و سپس از ناحیه دم برگ قطع می‌شدند. بعد کیسه‌های پلاستیکی محتوی مگس‌های سفید، به قسمت یخدان یخچال معمولی منتقل، و به مدت یک ساعت نگهداری می‌گردید. پس از توقف حرکت و فعالیت حشرات کامل، کیسه‌ها از یخچال خارج و تراکم دوگونه گرفت. هم چنین، تراکم مرحله شفیرگی این دوگونه تعیین شد. خصوصیات رفتاری مراحل مختلف زندگی مگس سفید گلخانه نیز در آزمایشگاه، و با استفاده از یک بینوکولر با بزرگ نمایی ۴۰ برابر مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج

نمونه‌های جمع آوری شده از روی گیاهان ختمی و شاه‌پسند درختی، مگس سفید گلخانه (*T. vaporariorum* Westwood) شناسایی گردید. از روی شاه‌پسند درختی، گونه‌های دیگری به *B. argentifolii* و *Bemisia tabaci* Gennadius نام *B. tabaci* Bellows & Perring، که بیوتیپ *B. tabaci* می‌باشد، و نیز گونه *B. hancocki* Corbett جمع آوری گردید، اما تراکم آنها کمتر از *T. vaporariorum* بود. نمونه‌های جمع آوری شده از روی کلم (*A. brassicae* Walk) و *Aleyrodes proletella* L. از روی بوته‌های رز *Aleyrodes rosae* Mask شناسایی شد. مگس سفید گلخانه در مرحله بلوغ حشره‌ای کوچک و سفیدرنگ است. متوسط طول بدن نر و ماده به ترتیب $1/14 \pm 0/14$ و $1/11 \pm 0/14$ میلی متر و متوسط عرض بدن با بالهای باز در نر و ماده به ترتیب $1/09 \pm 0/10$ و $2/34 \pm 0/10$ میلی متر است. ماده‌ها دارای تخریز و نرها دارای یک جفت قلاب و یک استیله میانی در انتهای شکم می‌باشند. سطح بدن و یالها پوشیده از یک ماده مومنی سفیدرنگ است. شاخک هفت مفصلی بوده، مفصل اول کروی، مفصل دوم الیپسوئیدی یا گلابی شکل، و مفصل سوم آن بلندتر از سایر مفاصل است. خرطوم چهار مفصلی است، که سه استیله

مگس‌های سفید، سوراخی به قطر دو سانتی‌متر در بذنة هر قفس ایجاد گردید. این سوراخ در طول آزمایش، برای جلوگیری از خروج مگس‌ها، توسط پنبه مسدود شده بود. در هر یک از قفس‌ها یک جفت مگس سفید نر و ماده، که تازه از شفیره خارج شده بودند، رها گردید. بیست و چهار ساعت پس از عمل رهاسازی، تخم‌ها شمارش شدند. هنگام شمارش، تمام قسمت‌های گیاه، قفس و گلدان نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. برای جلوگیری از بروز خطأ، هر تخم پس از شمارش به وسیله سوزن باریکی حذف می‌شد. در زمان شمارش تخم‌ها، مگس‌های سفیدی که با استفاده از آسپیراتور از قفس‌ها خارج شده بودند در داخل شیشه‌های کوچک نگهداری می‌شدند، و پس از پایان شمارش تخم‌ها، حشرات کامل مجدداً به داخل قفس‌ها بازگردانده می‌شدند. طول عمر هر یک از جنس‌های نر و ماده مگس‌های سفید، با بازرسی مرتب و شمارش مگس‌های زنده داخل هر قفس، تا پایان آزمایش اندازه گیری شد.

در بررسی پدیده پارتنوژنز، از ۹ قفس استوانه‌ای شفاف، که هر یک حاوی گلدانی با یک بوته دوبرگی بادمجان بود، استفاده گردید. داخل هر یک از قفس‌ها یک مگس سفید ماده جفت‌گیری نکرده رها، و پس از ۷۲ ساعت مگس‌های سفید از قفس‌ها خارج شده، با طی مراحل مختلف رشدی از تخم تا حشره کامل، جنسیت آنها تعیین گردید. برای تهیه مگس‌های ماده جفت‌گیری نکرده، از تعداد زیادی شفیره، که به صورت انفرادی به سطح برگ چسبیده بودند، استفاده شد. هر شفیره به طور جداگانه در داخل یک قفس استوانه‌ای شفاف قرار داده شد. سپس با بازدیدهای مرتب روزانه، به محض خروج حشرات کامل مگس سفید، ۹ حشره ماده با کره شناسایی و انتخاب گردید.

با توجه به حضور فعال و توانم دوگونه *T. vaporariorum* و *B. tabaci*، مقایسه‌ای از نظر مورفولوژیک و اکولوژیک بین این دوگونه به عمل آمد. برای این منظور، پنج بوته شاه‌پسند درختی به طور تصادفی انتخاب و بر روی هر یک از بوتهای چهار برگ انتهایی (در مجموع ۲۰ برگ) که از نظر ظاهری تا حدود زیادی مشابه هم بودند، انتخاب گردید. هنگام جمع

بلافاصله بعد از تغیریخ دارای جلد شفاف و برآقی هستند، ولی جلد آنها در پایان مرحله رشدی تا اندازه‌ای کدر و مات می‌شود. در این مرحله سه جفت پا، یک جفت شاخک و خرطوم نیز قابل تشخیص است. پوره سن اول در ابتدا متحرک است و پس از آن که در محل مناسبی ثابت شد شروع به تغذیه می‌کند، و با ترشح مقدار کمی مواد مومی سفیدرنگ سطح بدن را می‌پوشاند. این پوره‌ها دارای تاخره‌گی‌ها یا چین‌هایی در سطح شکمی خود می‌باشند، که احتمالاً در امر تنفس و انتقال هوا به روزنه‌های تنفسی نقش دارند (۱۰)، زیرا پوره‌ها دارای بدنی پهن و کاملاً چسبیده به سطح برگ می‌باشند و این امر تنفس را مشکل می‌کند. جلد پوره‌های سنین دوم، سوم و چهارم نیز مانند پوره سن اول بعد از پوست اندازی شفاف و برآق بوده ولی بعداً به رنگ زرد مایل به سفید درمی‌آید. سنین دوم و سوم پورگی بدنی شفاف دارند، به طوری که اندام‌های داخلی آنها، به ویژه میستوم‌ها^۷، از بیرون کاملاً مشخص است. سنین دوم، سوم و چهارم پورگی برخلاف پوره سن اول ثابت و بدون تحرك بوده و پاهای در آنها تحلیل رفته است. بعد از پوست اندازی پوره سن سوم و ظهر پوره سن چهارم، خارهای کناری بدن شروع به رشد می‌کنند، و در هر دو طرف حاشیه بالای بدن دو عدد برآمدگی سفیدرنگ دیده می‌شود که چین تراشه‌ای سینه‌ای^۸ (۱۰) نام دارد. چشم‌های قمزرنگ در طرفین بدن نیز کاملاً مشخص است (شکل ۴). دو لکه زرد نیز در قسمت میانی شکم و یک جفت موی نسبتاً بلند در انتهای بدن مشاهده می‌شود. آغاز مرحله شفیرگی با برجسته شدن دیواره بدن پوره سن چهارم همراه است. شفیره بیضی شکل و به رنگ زرد روشن بوده و اندازه آن با پوره سن چهارم مطابقت دارد. در مرحله شفیرگی سطح پشتی و شکمی کاملاً از یکدیگر فاصله گرفته و بین آنها را دیواره‌ای مومی پر می‌کند. در سطح پشتی شفیره ضمایم مومی خار مانندی نیز نمایان می‌گردد. چشم‌ها در بخش


نازک را دربر می‌گیرد. پاهای عقبی بلندتر از پاهای جلویی و میانی است. پنجه پاهای دو مفصلی می‌باشد، که مفصل اول طویل‌تر از دومی است، و در انتهای به یک جفت ناخن ختم می‌شود. بر روی آخرین مفصل شکم هر دو جنس نرو ماده، سوراخی بنام روزنه مخرجی^۱ وجود دارد، که این سوراخ توسط دربوش^۲ پوشیده می‌شود. در زیر دربوش و درون سوراخ، اندام زبان مانندی بنام زبانک^۳ قرار گرفته است. ساختمان روزنه مخرجی، یکی از فاکتورهای مهم در تفکیک دو گونه^۴ *B. tabaci* و *T. vaporariurum* محسوب می‌شود (شکل ۱). چشم‌ها دو قسمتی و به رنگ قرمز تیره است. تعداد فاست‌ها^۵ (عدسی‌ها) در بخش تحتانی بیشتر از بخش فوقانی می‌باشد. شکل چشم مرکب است، و وضعیت فاست‌های آن نیز می‌تواند عاملی در تفکیک دو گونه مذکور محسوب گردد (شکل ۲). بال فقط دارای یک رگ طولی رادیال^۶ بدون انشعاب است.

تخم به شکل بیضی کشیده و رنگ آن شیری بوده، ولی پس از چند ساعت به رنگ زرد روشن، و درنهایت به رنگ قهوه‌ای تیره در می‌آید. اندازه آن $24-0/24-0$ و متوسط آن $24\pm 0/0-0$ میلی‌متر است. قاعده تخم متصل به یک پایه کوچک بوده که توسط آن به بافت برگ اتصال می‌یابد. جدا کردن تخم‌ها از سطح برگ بامجان و قرار دادن آنها در شرایط مطلوب، باعث توقف روند تکامل و خشک شدن آنها شد. این مسئله حاکی از آن است که پایه تخم در جذب رطوبت، و احتمالاً سایر مواد و عناصر، از برگ و انتقال آن به داخل تخم نقش اساسی دارد. تخم مگس سفید گلخانه تنها مرحله‌ای از زندگی حشره است که قادر هر گونه ترشحات مومی است، و کاملاً شفاف و برآق می‌باشد.


مگس سفید گلخانه دارای چهار سن پورگی است، که طول و عرض سنین مختلف و معادله رگرسیون خطی آن به ترتیب در جدول ۱ و شکل ۳ نشان داده شده است. پوره‌های سن اول

1. Vasiform orific 2. Operculum 3. Lingula 4. Facet 5. Radial vein 6. Pedicel



۷. Mycetomes: باکتری‌های هم‌زیست داخلی در مگس‌های سفید، در سلول‌های تخصیص بافه‌ای به نام میستومیت وجود دارند، که به صورت ساختمان‌های جفت شده گروه بندی می‌شوند، که به میستوم موسوم‌اند. این موجودات زنده در شکم مراحل بالغ و نابالغ وجود دارند، و جزو پرتوپریاکتری‌های ۸. Thoracic tracheal fold گاما محسوب می‌شوند (۹).




شکل ۱. روزنه مخرجی در *B. tabaci* و *T. vaporariorum* (راست) و (چپ) (۴۰۰ برابر)



شکل ۲. چشم مرکب در *B. tabaci* و *T. vaporariorum* (راست) و (چپ) (۴۰۰ برابر)



شکل ۳. رابطه طول (الف) و عرض (ب) بدن با سن پورگی مگس سفید گلخانه




شکل ۴. شفیره مگس سفید گلخانه (۲۰۰ برابر)

جدول ۱. حداقل، حداقل و میانگین طول و عرض سنین مختلف پورگی مگس سفید گلخانه بر حسب میلی متر


سن پورگی	حداقل			حداقل			حداقل		
	عرض	طول	عرض	طول	عرض	طول	عرض	طول	
پوره سن اول	$0/141 \pm 0/002$	$0/26 \pm 0/011$	$0/16$	$0/31$	$0/12$	$0/22$			
پوره سن دوم	$0/218 \pm 0/006$	$0/378 \pm 0/013$	$0/26$	$0/43$	$0/19$	$0/33$			
پوره سن سوم	$0/340 \pm 0/008$	$0/531 \pm 0/009$	$0/37$	$0/57$	$0/30$	$0/50$			
پوره سن چهارم	$0/478 \pm 0/014$	$0/768 \pm 0/019$	$0/54$	$0/84$	$0/42$	$0/71$			

تخم‌های مگس سفید گلخانه اغلب در سطح زیری برگ قرار داشتند، و در سطح رویی برگ تعداد بسیار کمی تخم مشاهده گردید، به طوری که از ۱۲۸۱ تخم گذاشته شده در مدت ۲۴ روز، تنها در ۳۴ مورد ($2/65$ درصد) تخم‌گذاری در سطح رویی برگ اتفاق افتاد. در هر صورت، تعداد متوسط تخم یک حشره ماده مگس سفید گلخانه در مدت ۲۴ روز $42/4$ ، و متوسط آن برای یک مگس سفید در یک روز $67/1$ و 93 ± 5 عدد شمارش


جلویی دیواره جانبی، و به رنگ قرمز می‌باشد. در کناره‌های بدن شفیره غدد ترشح کننده موم قوارگرفته‌اند، که شبیه مژه‌هایی به رنگ سفید در سراسر حاشیه بدن نمایان هستند. در پایان مرحله شفیرگی و قبل از ظهور حشره بالغ، آثار ظهور بال در طرفین بدن شفیره‌ها دیده می‌شود. سرانجام، در سطح پشتی شفیره و در نقطه مقابل روزنه مخرجی، شکافی به شکل T ایجاد شده، حشره کامل از آن خارج می‌گردد (شکل‌های ۵ و ۶).



شکل ۵. سطح پشتی شفیره مگس سفید گلخانه (۲۰۰ برابر)



شکل ۶. سطح شکمی شفیره مگس سفید گلخانه (۲۰۰ برابر)



شکل ۷. رابطه بین طول عمر (سن) و متوسط تعداد تخم گذاشته شده توسط مگس سفید گلخانه

است که توسط آل منصور (۱) به عنوان فون استان فارس معرفی گردیده است. در بین گونه‌های شناسایی شده در منطقه اصفهان، *Bemisia* گونه *Aleyrodes proletella* L. و نیز بیوتیپ *argentifolii* Bellows & Perring از نخستین مرتبه از ایران گزارش می‌شوند. به هر حال در زمینه انتشار، دامنه میزانی و دشمنان طبیعی این گونه‌ها، به خصوص مگس سفید کلم (*A. proletella* L.) و مگس سفید رز (*Aleyrodes rosae* Mask) لازم است مطالعات جامعی صورت گیرد.

مقایسه دو گونه *B. tabaci* و *T. vaporariorum* نشان می‌دهد که گونه اول کوچک‌تر بوده، و در حالت استراحت بالهای خود را با زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطح برگ قرار می‌دهد و به صورت دو سطح شبیدار روی شکم خود نگه می‌دارد، ولی *T. vaporariorum* بالهای خود را در حالت

گردید (شکل ۷). الگوی تخم‌گذاری مگس سفید گلخانه بر روی گیاه بادنجان انفرادی، و در موارد بسیار نادر به صورت کمان یا نیم دایره بود.

طول عمر حشره نر $23-19 \pm 1/54$ و متوسط آن $20/88 \pm 1/54$ روز، در حالی که طول عمر ماده $28-25 \pm 1/17$ روز اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش‌های مربوط به طول دوره هر یک از مراحل رشدی مگس سفید گلخانه در جدول ۲ نشان داده شده است.

جنس نتاج حاصل از ماده‌های باکره مگس سفید گلخانه همگی نر بود. به عبارت دیگر ماده باکره مگس سفید گلخانه منحصرآ دارای تولید نتاج نر^۱ می‌باشد.

بحث

گونه‌های جمع آوری شده در اصفهان، تا حدودی شبیه گونه‌هایی

1. Arrhenotokous Parthenogenesis

جدول ۲. طول دوره هر یک از مراحل رشدی مگس سفید گلخانه

مرحله رشدی	طول دوره (روز)	خطای استاندارد \pm میانگین
تخم	۷-۸	۷/۳۳ \pm ۰/۴۸۰
پوره سن اول	۳-۴	۳/۳۷ \pm ۰/۵۱۸
پوره سن دوم	۳-۴	۲/۲۵ \pm ۰/۴۴۷
پوره سن سوم	۲-۳	۲/۵۱ \pm ۰/۲۶۱
پوره سن چهارم	۲-۳	۲/۳۳ \pm ۰/۵۱۷
پیش شفیره	۲-۳	۲/۱۶ \pm ۰/۴۰۹
شفیره	۳-۴	۳/۶۶ \pm ۰/۵۱۷
حشره کامل	۲۲-۲۹	۲۴/۱۲ \pm ۰/۵۰

پیش شفیره نیز انجام نمی شود، ولی در مرحله پیش شفیرگی، چشم ها به صورت دو نقطه قرمز رنگ کوچک در طرفین سر قابل روئیت هستند. بنابراین تفکیک این سه مرحله با در نظر گرفتن این خصوصیات امکان پذیر است. نتایج به دست آمده در زمینه مطالعات مورفولوژیک تخم، با اندکی اختلاف، به خصوص از نظر اندازه و رنگ، با نظریات اغلب پژوهشگران (۷، ۱۰ و ۱۵) مطابقت زیادی دارد.

بین سنین پورگی و میانگین طول و عرض بدن هم بستگی مشتبی وجود داشت. به هر حال، بررسی های مورفولوژیک در مورد پوره سن اول، با اختلاف جزئی در اندازه های طول و عرض بدن، مشاهدات فرخی (۵)، بیرون و بیلاس (۷) و جرلينگ (۱۰) را تأیید می کنند. در مورد پوره های سنین ۲، ۳، ۴ و نیز حشره کامل، نتایج به دست آمده با اختلاف جزئی مشاهدات صلواتیان (۳)، فرخی (۵)، بیرون و بیلاس (۷) و گیل (۱۱) را تأیید می نماید. اختلافات موجود می تواند ناشی از ساختمان برگ و نوع گیاه میزبان، شرایط محیطی، و حتی بیوتیپ حشره مورد مطالعه باشد. به هر حال، ساختمان برگ و نوع گیاه میزبان، اختلافات مورفولوژیک فاحشی را در مراحل مختلف رشدی مگس های سفید موجب می گردد (۱۵). بنابراین وجود اختلافات مورفولوژیک در مگس های سفید، و روی

استراحت به صورت یک پوشش روی شکم، و کمی موازی با سطح برگ قرار می دهد. اگرچه در ابتدا موارد مذکور می توانند به عنوان شاخص های مناسبی در تفکیک دو گونه *B. tabaci* و *T. vaporariorum* از یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند، ولی شناسایی دو گونه با استفاده از کلیدهای تشخیص ضروری می باشد.

تفکیک چهار سن پورگی برای مگس سفید گلخانه در این تحقیق، با مشاهدات اکثر پژوهشگران، تغییر خوازی پاکدل (۲)، گیل (۱۱) و بیرون و بیلاس (۷) مطابقت دارد، اما با آنچه که نیکوکز و تابر (۱۶) اظهار می دارند (حتی پس از آزمایش های دقیق نیز نمی توان مراحل مشخصی را حد واسط سن چهارم پورگی و حشره کامل در نظر گرفت) مطابقت ندارد، زیرا سه زیر مرحله سن چهارم پورگی از نظر مورفولوژیک تا اندازه ای قابل تفکیک است، گرچه این اختلافات چندان برجسته و عمیق نیست که بتوان مرز کاملاً مشخصی بین این مراحل قایل شد. آنچه که در این بررسی به عنوان وجه تمایز پوره سن چهارم و شفیره محسوب گردید برجسته شدن دیواره بدن پوره سن چهارم در آغاز مرحله شفیرگی بود، هر چند که اندازه این دو زیر مرحله کاملاً یکسان است و پوست اندازی صورت نمی گیرد. به علاوه پوست اندازی در حد فاصل بین مرحله چهارم پورگی و

از آن جایی که تولید نتاج منحصراً نر^۱ توسط مگس سفید گلخانه مبین نژاد اروپایی است (۳)، در این بررسی نیز مگس سفید گلخانه در حالت بکر زایی فقط نتاج نر تولید نمود. لذا نژاد مورد مطالعه از نوع اروپایی، یا نژادی بسیار شبیه به آن می‌باشد. به هر حال این مشاهدات با نظریه بیرن و بیلاس (۷)، مبنی بر این که «مگس‌های سفید عمدتاً نتاج نر تولید می‌کنند» مطابقت دارد.

الگوی تخم گذاری مگس سفید گلخانه بر روی برگ‌های صاف و فاقد کرک و پرز به صورت دایره است (۷ و ۱۰). این الگو، در این مطالعه روی برگ‌های بادمجان مشاهده نگردید، که احتمالاً به دلیل وجود کرک‌های ریز فراوان بر روی سطح برگ بادمجان است که الگوی تخم گذاری را تحت الشاعع قرار می‌دهد. نکته جالب توجه این بود که مگس سفید گلخانه در چند مورد تخم‌های خود را بروی دم برگ گیاه بادمجان گذاشته بود. بررسی منابع مختلف علمی موجود نشان داد که مگس‌های سفید فقط در سطوح زیری و رویی برگ تخم گذاری می‌کنند، و به تخم گذاری بر روی دم برگ در هیچ یک از منابع اشاره‌ای نشده است. در هر صورت، دلیل تخم گذاری مگس سفید گلخانه روی دم برگ ممکن است مربوط به فشار بار تخم^۲، یا ناشی از بی‌تجربگی ماده‌های جوان و تازه خارج شده، و یا احتمالاً مربوط به مشابهت نسبی بافت دم برگ با پهنه‌ک برگ در گیاه بادمجان باشد. در هر حال، لازم است در موارد فوق، و نیز در زمینه امکان و درصد بقا و تفریخ تخم‌ها در سطوح مختلف گیاه میزان، بررسی‌های بیشتری به عمل آید.

نمونه برداری از شاه‌پستند درختی نشان داد که گونه *T. vaporariorum* نسبت به گونه *B. tabaci* غالیب و فراوان‌تر است. این غالیت اکولوژیک احتمالاً به خاطر جثه بزرگ‌تر گزارش لیو (۱۳)، در مورد غالیت گونه *T. vaporariorum* نسبت به گونه *T. tabaci* می‌باشد. این مشاهده با گزارش لیو (۱۳)، در مورد غالیت گونه *T. vaporariorum* نسبت به گونه *B. tabaci* بر روی گیاه برگ رنگ و لویبا مطابقت دارد.

میزان‌های گیاهی مختلف، کم و بیش قابل توجیه می‌باشد. در این بررسی مدت زمان لازم جهت تکمیل چرخه زندگی مگس سفید گلخانه از تخم تا حشره کامل ۲۹–۲۲ روز به دست آمد، که با آنچه توسط فرخی (۵) و برنت (۶) گزارش شده است مطابقت دارد. اندک اختلاف موجود با نظریات سایر پژوهشگران، احتمالاً ناشی از اختلاف در درجه حرارت، رطوبت، نوع گیاه میزان و بیوتیپ مگس سفید مورد مطالعه می‌باشد.

مگس‌های سفید تازه خارج شده از شفیره، بلافتسله قادر به تخم گذاری بر روی میزان گیاهی نیودند، به طوری که در هیچ یک از موارد، تا ۲۴ ساعت بعد از ظهرور، هیچ گونه تخم گذاری مشاهده نگردید. با توجه به نیاز مگس سفید به بلوغ جنسی برای شروع تخم گذاری (۱۰)، به نظر می‌رسد که مگس در این مرحله (فاصله زمانی بین ظهرور و تخم گذاری) هنوز از نظر جنسی بالغ شده و بالهای آن شفاف و بدون لایه موئی است. در حالی که بعد از ۲۴ ساعت، هم‌زمان با ترشح ذرات موم روی بال‌ها و بدن، بالغ شده و شروع به تخم گذاری می‌کند. بنابراین، ترشح ذرات موم می‌تواند به عنوان شاخصی برای پی‌بردن به بلوغ جنسی مگس سفید گلخانه به کار رود.

در این تحقیق معلوم شد که ماده‌های مگس سفید گلخانه بیشتر از نرها زندگی می‌کنند. حداقل طول عمر آنها ۲۸ روز بود، و حداقل میزان تخم گذاری در فاصله زمان ۱۱–۹ روزگی اتفاق افتاد. این نتایج با اندکی اختلاف با مشاهدات اومر (۱۷) منطبق است، اگرچه با مشاهدات فرخی (۵) اختلاف بیشتری دارد. به غیر از شرایط محیطی، و عواملی نظر نوع گیاه میزان و بیوتیپ حشره، چون در این بررسی به منظور دقت بیشتر در شمارش تخم‌ها، مگس‌ها با استفاده از آسپیراتور از قفس خارج می‌شدند و مجدداً به قفس بازگردانده می‌شدند، احتمالاً این جایه جایی‌ها بر روی میزان تخم گذاری مگس سفید گلخانه تأثیر منفی داشته است، به طوری که ممکن است موجب استرس‌های نوری، حرارتی، رطوبتی، و از همه مهم‌تر مکانیکی روی حشره شده باشد.

1. Arrhenotoky

2. Eggload

نشان می‌دهند (۷). بنابراین، می‌توان چنین استنباط نمود که با حذف برگ‌های مسن زردرنگ در شرایط گلخانه و مزرعه، می‌توان حداقل از جلب بیشتر مگس‌های سفید تا حد زیادی کاست، و احتمالاً میزان خسارت را کاهش داد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از پروفسور ون لترن و دکتر ون رورموند، استادان گروه حشره‌شناسی دانشگاه واگنینگن هلند، که با ارسال مقالات ارزشمند خود، و تیز تشخیص نمونه‌ها ما را باری نمودند کمال تشکر را می‌نماییم. هم چنین این تحقیق با استفاده از اعتبارات دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت کشاورزی به اجرا در آمده است که بدین وسیله تشکر و قدردانی می‌گردد.

بررسی رفتاری پوره‌ها نشان داد که پوره‌های سنین سوم و چهارم نسبت به سنین اول و دوم عسلک بیشتری تولید می‌کنند، که این خود احتمالاً ناشی از تغذیه و فعالیت بیشتر این سنین پورگی است. به علاوه، میزان ترشیح عسلک در حشرات بالغ در صیح بیشتر از عصر است. این مشاهدات با آنچه لی (۱۲) گزارش نموده، مطابقت دارد.

مشاهدات رفتاری مگس سفید گلخانه نشان داد که حشره به برگ‌های سبز مایل به زرد گیاه میزان حساسیت بیشتری نشان می‌دهد، و به سمت آنها جلب می‌شود. به عنوان مثال، تراکم مگس سفید گلخانه روی برگ‌های مسن‌تر بادمجان که سبز مایل به زرد بودند، بیشتر از برگ‌های کاملاً سبزرنگ بود. اگر چه در این بررسی دلیل این گونه ترجیح میزانی مشخص نگردید، ولی براساس مطالعات پژوهشگران دیگر، برگ‌های سبز مایل به زرد با طول موج ۵۰۰-۶۰۰ نانومتر جاذب‌تر از سایر برگ‌ها می‌باشند، و مگس‌های سفید به چنین طول موجی حساسیت

منابع مورد استفاده

۱. آل منصور، ح. ۱۳۷۴. انتشار، دامنه میزانی و دشمنان طبیعی عسلک پنبه (*Bemisia tabaci*) در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
۲. خرازی پاکدل، ع. ۱۳۶۲. بررسی زیست‌شناسی (*Trialeurodes vaporariorum* (Hom.: Aleurodidae) هفتمین کنگره گیاه پژوهشکی ایران، دانشکده کشاورزی کرج، ص. ۳۸.
۳. صلوانیان، م. ۱۳۶۶. عسلک پنبه و طرق مبارزه با آن. انتشارات سازمان ترویج کشاورزی، تهران.
۴. ضرابی، م. ۱۳۷۰. فون مگس‌های سفید (Hom: Aleurodidae) در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
۵. فرخی، ش. ۱۳۷۵. بررسی زیست‌شناسی و کارایی دو گونه زنبور (Hym.: Aphelinidae) *E. formosa* و *Encarsia inaron* (Hym.: Encarsiadidae) (Hom.: Aleurodidae) (*Trialeurodes vaporariorum*). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
6. Burnett, T. 1949. The effect of temperature on an insect host parasite population. Ecol. 30: 113-134.
7. Byrne, D. N. and T. S. Bellows. 1991. Whitefly biology. Annu. Rev. Entomol. 36: 431-457.
8. Cock, A., I. Ishaya, M. Veire and D. Degheele. 1995. Response of Buprofezin-susceptible and resistant strains of *Trialeurodes vaporariorum* (Hom: Aleurodidae) to pyriproxyfen and diafenthion. J. Econ. Entomol. 88: 763-767.
9. Costa, H. S., N. C. Toscano and T. J. Henneberry. 1996. Mycetocyte inclusion in the oocytes of *Bemisia tabaci* (Homoptera: Aleyrodidae). Ann. Entomol. Soc. Am. 89(5): 694-699.
10. Gerling, D. 1990. Whiteflies: Their Bionomics, Pest Status and Management. 348 p. Intercept, Wimborne. UK.
11. Gill, R. J. 1990. The morphology of whiteflies. In: D. Gerling. Whiteflies: Their Bionomics Pest Status and Management. pp. 13-46. Intercept Ltd., UK.

12. Lei, H. and R. M. Xu. 1993. Studies on honeydew excretion by greenhouse whitefly, *Trialeurodes vaporariorum* on its host plant, *Cucumis sativus*. J. Appl. Entomol. 115: 43-51.
13. Liu, T. X., R. D. Oetting and G. D. Buntin. 1994. Evidence of interspecific competition between *Trialeurodes vaporariorum* and *Bemisia tabaci* on some greenhouse-grown plants. J. Entomol. Sci. 29: 55-56.
14. Martin, J. H. 1987. An identification guide to common whitefly pest species of the world (Homoptera: Aleyrodidae). Trop. Pest. Manage. 33: 298-322.
15. Mound, L. A. and S. H. Halsey. 1978. Whitefly of the Word. A Systematic Catalogue of the Aleyrodidae with Host Plant and Natural Enemy Data. British Museum (Natural History), 340 p., UK.
16. Nechols, J. R. and M. J. Tauber. 1977. Age specific interaction between the greenhouse whitefly and *Encarsia formosa*, influence of host on the parasites oviposition and development. Environ. Entomol. 6: 143-149.
17. Omer, A. D., T. F. Leight, J. R. Carey and J. Granett. 1992. Demographic analyses of organophosphate-resistant and susceptible-strain of greenhouse whitefly, *Trialeurodes vaporariorum* on three cotton cultivars. Entomol. Exp. Appl. 65: 21-30.
18. Perring, T. M., A. Cooper and D. J. Kazmer. 1992. Identification of the poinsettia strain of *Bemisia tabaci* on broccoli by electrophoresis. J. Econ. Entomol. 85: 1278-1284.
19. Stenseth, C. 1985. Biology of pests and natural enemies. In: N. W. Hussey and N. Scopes. Biological Pest Control. pp. 30-33. Blandford Press.