

فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
جلد ۲۰ شماره ۳، صفحه ۲۹۹-۲۹۱ (۱۳۸۳)

عناصر معدنی در ژنوتیپهای مختلف *Rosa damascena* Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان

محمدباقر رضایی^۱، محمود نادری حاجی باقرکندی^۲ و سیدرضا طبایی عقدایی^۱

چکیده

در این تحقیق نهال چهار ژنوتیپ *Rosa damascena* از استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان جمعآوری و در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشت و به منظور جهت بررسی مواد معدنی مهم گیاه، از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد سال ۱۳۸۲ اقدام به جمعآوری اندامهای گیاه گردید.

جهت اندازه‌گیری عناصر معدنی سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، منگنز، روی، مس، فسفر و ازت از دستگاههای ICP و Kjeltce Spectrophotometric استفاده شد.

نتیجه تجزیه گلبرگ ژنوتیپ گیاه استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان به ترتیب عبارت بودند از: سدیم (۱۶۰/۴-۱۲۷/۴ ppm)، پتاسیم (۸۸/۵-۴۸/۴ ppm)، منیزیم (۹/۱۱-۱۰/۶۱ ppm)، کلسیم (۶۰/۵۴-۶۵/۴ ppm)، منگنز (۰/۰۷۳-۰/۰۹۴ ppm)، روی (۰/۱۷۷-۰/۰۱۶۲ ppm)، مس (۰/۱۹۰-۰/۲۸ mg/kg)، فسفر (۰/۲۰۷-۰/۳۰ ppm) و ازت (۰/۰۹۵). در کاسبرگ میزان سدیم (۱۰/۲-۲۷۷/۷ ppm)، پتاسیم (۲۵/۷۲-۳۸/۵ ppm)، منیزیم (۱۲/۳۶-۲۴/۲ ppm)، کلسیم (۵۷/۶۳-۱۹۶/۳ ppm)، منگنز (۰/۱۰۵-۰/۱۸۵ ppm)، روی (۰/۱۵۶-۰/۰۶۲ ppm)، مس (۰/۱۶۶-۰/۳۲ ppm)، فسفر (۰/۰۲۳-۰/۳۹ mg/kg) و ازت (۰/۲۶۶-۰/۲۹۰٪) تعیین گردید.

واژه‌های کلیدی: گل محمدی، عناصر معدنی، استخراج، اندازه‌گیری

۱- عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

E-mail: mrezaee@rifr-ac.ir

۲- کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی ۱۱۶-۱۳۱۸۵.

مقدمه

گل محمدی (*Rosa damascena Mill.*) به عنوان یکی از مهمترین گیاهان معطر، در ابتدا به صورت وحشی روییده و هنوز هم به صورت خودرو در سوریه، مراکش و استرالیا رویش دارد، از ایران نیز به عنوان منشأ این گیاه یاد شده است (Chevallier ۱۹۹۶). از فرآوردهای گیاهان جنس *Rosa* در طب سنتی تا دهه‌های اول سده بیستم به عنوان دارو استفاده می‌شده است (Ody, ۱۹۹۵). گل محمدی از لحاظ درمانی بسیار مفید و به عنوان گیاهی آرامبخش بکار می‌رود. از عصاره بدست آمده از تقطیر گل محمدی در سده‌های وسطی و عهد رنسانس برای درمان افسردگی استفاده می‌شد در صورتی که میزان بعضی از مواد معدنی در این نوع گیاهان مورد بررسی قرار نگیرد ممکن است باعث کاهش ارزش غذایی و یا تأثیر بر میزان مواد مؤثر (اسانس) گیاه شود. از آنجا که عناصری همچون کلسیم، منیزیم، فسفر و غیره باید در حد مجاز مورد استفاده قرار گیرند. این مواد از جمله کلسیم و فسفر در تشکیل استخوانها و در تنظیم انقباضات عضلانی و تحریک پذیری عصبی، نقش مهمی دارند (خلدی، ۱۳۷۸ و سعادت نوری، ۱۳۷۲).

مواد و روشها

ژنتیکهای مختلف گل محمدی جمع‌آوری شده از استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع واقع در ۱۵ کیلومتری شمال غربی تهران با طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۱۰ دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۴ دقیقه شمالی و ارتفاع

۱۳۲۰ متر از سطح دریا، کشت گردید. در هر تکرار ۳ نهال از هر نمونه در چاله‌هایی با قطر و عمق ۱ متر غرس شد. فاصله نهالها روی ردیف ۲/۵ متر و فاصله ردیفها از یکدیگر ۲ متر در نظر گرفته شد. بستر کاشت با مخلوطی از خاک زارعی، ماسه و کود حیوانی فراهم و برای عملیات آبیاری روش قطراهای بکار گرفته شد. در موقع لازم و چین علفهای هرز با دست انجام شد. گلبرگ و کاسبرگ گیاه گل محمدی را پس از جمع آوری و خشک کردن توسط دستگاه آسیا خورد کرده بعد نسبت به تهیه خاکستر، گلبرگ را تا ۵۵۰ درجه سانتیگراد حرارت داده تا رسوب سفید رنگی (بدون کربن) تهیه گردید (Indian Standard، ۱۹۷۲). برای اندازه‌گیری عناصر (پتاسیم، فسفر، ازت، سدیم، منیزیم و کلسیم) از محلول اسید نیتریک یک مولار (الف) استفاده شد. در این روش جهت تعیین مقدار عنصر کلسیم، ۱ میلی‌لیتر از محلول الف را در داخل اrlen ۲۵۰ میلی‌لیتر ریخته، بعد به آن سود ۱۰٪ و مخلوط مورکساید^۱ اضافه می‌نماییم، بعد به روش تیتراسیون با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید^۲ میزان کلسیم (Ca) تعیین می‌گردد (غازان شاهی، ۱۳۷۶) و (WalshL، ۱۹۷۱).

جهت تعیین مقدار منیزیم نیز ۱ میلی‌لیتر از محلول (الف) را در داخل اrlen میلی‌لیتر ریخته و به آن محلول بافر (PH = ۱۰)، معرف اریکروم بلک تی^۳ اضافه می‌نماییم، بعد به روش تیتراسیون با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید^۴ مقدار منیزیم را تعیین نمودیم (غازان شاهی، ۱۳۷۶).

جهت بررسی سدیم و پتاسیم، ۱ میلی‌لیتر از محلول رقیق شده پس از مقایسه با منحنی استاندارد تعیین درصد گردید میزان سدیم و پتاسیم در محلول، با دستگاه فلیم فتومنتر مدل PFP7 اندازه‌گیری شد (Qupta، ۲۰۰۰ و Tandom، ۱۹۹۵).

1- Moroxaed

2- Ethylenediaminetetra acetic acid (EDTA)

3- Eriochrome black T

4- Kjeltce

جهت تعیین میزان ازت، مقدار $0/2$ گرم برگ گیاه را با اسید سولفوریک و سولفات پتاسیم و سولفات مس مخلوط نموده تا 400 درجه سانتیگراد حرارت می‌دهیم. ازت محلول را به دستگاه کجل تک^۱ منتقل نمودیم، در پایان با قرائت عدد تیتر شده، درصد ازت تعیین گردید (Rowell, ۱۹۹۴).

برای تعیین مقدار فسفر، اقدام به رقیق کردن 1 میلی‌لیتر از محلول (الف) و اضافه نمودن معرف نیترو - واندادو - مولبیدات و در نهایت خواندن عدد جذب نمونه، بوسیله دستگاه اسپکتروفوتومتری^۲ در طول موج 430 nm اقدام گردید (Cottenie, ۱۹۸۰). برای اندازه‌گیری املاح روی، مس، و منگنز از دستگاه پلاسمای جفت شده القایی^۳ استفاده می‌شود که اساس این دستگاه بر مبنای اندازه‌گیری انرژی نشر شده توسط اتمها، در اثر انتقال از حالت برانگیخته بالاتر به حالت برانگیخته پایین‌تر است.

نتایج

نتایج اندازه‌گیری املاح در اندامهای گلبرگ و کاسبرگ گل محمدی که در مؤسسه کشت شده است در جدول و نمودار زیر ارائه گردیده است.

1- pectromic 21

2- Induced coupled plasma (ICP)

جدول شماره ۱- نتایج اندازه‌گیری املح گل محمدی (*Rosa damascena* Mill) در استانهای مختلف کشور

ردیف	استان	نام محل	نام آنالیز	٪ خاکستر	سدیم ppm	پتاسیم ppm	منیزیم ppm	کلسیم ppm	منگنز ppm	روی ppm	مس ppm	فسفر mg/kg	٪ ازت
۱	آذربایجان شرقی	گلبرگ	۴	۱۵۱/۰	۲۷/۹۲	۱۰/۶۱	۶۰/۴۱	۰/۰۹۴	۰/۲۸۹	۰/۲۱۴	۰/۲۸	۰/۲۸	۱/۷۷
۲		کاسبرگ	۶	۱۱۰/۲	۳۸/۵۳	۱۲/۷۳	۵۷/۶۳	۰/۱۶۲	۰/۱۵۶	۰/۲۰۱	۰/۳۹	۰/۲۲	۲/۲۶
۳		گلبرگ	۲	۱۲۷/۴	۲۴/۴۸	۹/۱۱۰	۶۰/۵۴	۰/۰۷۵	۰/۳۵	۰/۳۰	۰/۱۹	۰/۹۵	۰/۹۵
۴		کاسبرگ	۶	۱۷۹/۳	۲۵/۷۲	۱۲/۳۶	۱۲۵/۲	۰/۱۰۵	۰/۶۲	۰/۳۲	۰/۲۳	۰/۹۰	۲/۹۰
۵		گلبرگ	۶	۱۶۰/۴	۳۵/۸۸	۱۰/۴۱	۶۰/۱۸	۰/۰۷۳	۰/۱۶۲	۰/۲۰۷	۰/۲۱	۰/۲۱	۱/۳۴
۶	گلستان	کاسبرگ	۱۴	۲۷۷/۷	۳۷/۸۱	۲۴/۲۷	۱۹۶/۳	۰/۱۸۴۶	۰/۱۸۸۳	۰/۱۶۶	۰/۳۴	۰/۳۴	۲/۴۹

بحث

در این تحقیق میزان عناصر مهم در گل محمدی که تأثیر بسزایی در رشد گیاه و مواد آلی آن خواهد گذاشت به روشهای مختلف تعیین گردیده است. ترکیبها در گیاهان در مناطق مختلف کشور دارای میزان متفاوتی می‌باشند (فریدون، ۱۳۷۵).

عناصر آلی و معدنی در گیاهان به میزان متفاوت یافت می‌شود، به طور مثال همانطور که در نتایج مشاهده می‌نمایند بیشترین میزان را ترکیب سدیم و کلسیم دارا می‌باشد که با $(4/4\text{ ppm})$ و $(4/54\text{-}65\text{/}4\text{ ppm})$ ، می‌باشد همچنین بیشترین میزان در کاسبرگ، ترکیب‌های سدیم برابر $(25/27\text{-}38\text{/}53\text{ ppm})$ ، در $(110/2\text{-}277\text{/}7\text{ ppm})$ ، $(127/4\text{-}160\text{/}4\text{ ppm})$ و $(12/36\text{-}24\text{/}27\text{ ppm})$ و کلسیم $(12/32\text{-}196\text{/}3\text{ ppm})$ و $(57/63\text{-}196\text{/}3\text{ ppm})$ ، تعیین گردیده است. بنابراین از نتایج مشخص است که میزان مواد در ژنوتیپ‌های مختلف متفاوت است و این امر یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر رشد و میزان مواد مؤثر گیاه از جمله اسانس می‌باشد.

(جدول شماره ۱)


با توجه به مقایسه نتایج بدست آمده از بررسی املاح در گلبرگ و کاسبرگ گیاه گل محمدی مشخص شد که میزان تمامی املاح مورد تجزیه در کاسبرگ بیشتر از گلبرگ می‌باشد. همچنین مقادیر این املاح در برگ گیاه کنار نیز برای سدیم 211 ppm ، منزیم $16/32\text{ ppm}$ ، کلسیم $140/8\text{ ppm}$ ، منگنز $40/62\text{ ppm}$ ، مس $0/24\text{ ppm}$ بدست آمده که میزان‌های تعیین شده کمتر از مقدار املاح اندامهای گیاه گل محمدی می‌باشد. همچنین از تحلیل نتایج مشخص شد که مقدار خاکستر در اندام کاسبرگ بیشتر از گلبرگ بوده که نشان دهنده وجود بیشتر ترکیب‌های غیر آلی در کاسبرگ نسبت به گلبرگ می‌باشد.

سپاسگزاری


از مسئولان محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و همکاران بخش تحقیقات گیاهان دارویی که ما را یاری نمودند سپاسگزاریم.

منابع مورد استفاده


- خلدی، ن. ۱۳۷۸. اصول تغذیه راینسون. انتشارات سالمی. چاپ اول، صفحه ۱۲۳.
- سعادت نوری، م. ۱۳۷۲. اصول نوین تغذیه در سلامتی. انتشارات اشرفی. صفحات ۴۱۶-۳۹۰.
- فریدون، ا. ۱۳۷۵. جغرافیای تغذیه. چاپ دوم. انتشارت دانشگاه تهران. شماره ۲۳۳ صفحه ۱۱۳.
- ازان شاهی، ج. ۱۳۷۶. تحلیل خاک و گیاه. انتشارت مترجم. صفحات ۲۳۷ و ۲۷۴ و ۲۶۳.
- Chevallier, A., 1996. The encyclopedia of medicinal plants. Dorling Kindersley, London, pp 336.
- Cottenie, A., 1980. Soil and plant testing as a basis of fertilizer recommendation. FAO Soil Bulletin, 38, 2, Rome.
- Indian Standard, 1972. specefication for acacia (arabic) gum, foodgrade, 6795. appendix a.
- Ody, P., 1995. The herb societys complete medicinal herbal. Dorling Kindersley, London, pp 192.
- Gupta, P.K., 2000, Soil, Plant, Water and Fertilizer Analysis. Agrobios (India).
- Rowell, D.L., 1994. Boden Kunde untersuchung methode und ihre anwendung. Springer Verlag.
- Tandom HLS, 1995, Methods of Analysis of soils, plants, Water and Fertiliser. New Dehli, India.
- Walsh L.M. 1971. Instrumental methods for analysis of soils and plant tissue. Soil science society of America. Inc. Madison, Wisconsin, USA, 222p.




نمودار شماره ۱- بررسی املاح گلبرگ گیاه گل محمدی (*Rosa damascena*)
در مناطق مختلف ایران



نمودار شماره ۲- بررسی املاح گلبرگ گیاه گل محمدی (*Rosa damascena*)
در مناطق مختلف ایران



نمودار شماره ۳- بررسی املاح کاسبرگ گل محمدی (*Rosa damascena*) در مناطق مختلف ایران



نمودار شماره ۴- بررسی املاح کاسبرگ گل محمدی (*Rosa damascena*) در مناطق مختلف ایران

Vol. 20 No. (3), 291-299 (2004)

Comparative study on inorganic elements of different genotypes of *Rosa damascena* Mill from different provinces of Iran

M. B. Rezaee¹, M. Naderi Hagy Bagher Candy¹
and S.R.Tabaei Aghdaei¹

Abstract

Contents of inorganic elements are very important traits in plants. Some of the elements have causal effects on plant growth. Also, their effects on plant metabolism and therefore quality and quantity of essential oils. Thus, to obtain relatively good results, different parts of *Rosa damascena* Mill. genotypes were analyzed.

In this research, plants collected from different provinces, including Tehran, Qazvin, East Azarbaijan and Golestan provinces and cultivated in the national botanical Garden (Tehran - Kraj highway), and samples were collected in May 2003.

For determination and comparative study of inorganic elements like Na, K, Mn, Ca, Mg, Zn, Cu, P and N used different apparatus like induced Coupled Plasma (ICP), Kjeltce and spectrophotometer. Results are from different genotypes on petals and sepals of *Rosa damascena* Mill. from different states like Tehran, East Azarbaijan and Golestan were Na (127.4 – 160.4 ppm), K (24.48 – 35.88 ppm), Mg (9.11 – 10.61 ppm), Ca (60.54 – 65.41 ppm), Mn (0.073 – 0.094 ppm), Zn (0.162 – 0.35 ppm), Cu (0.207 0.30 ppm), P (0.19 – 0.28 mg/kg) and N (0.95 – 1.77 %) in petals, and Na (110.2– 277.7 ppm), K (25.72 – 38.53 ppm), Mg (12.36 – 24.27 ppm), Ca (57.63 – 196.3 ppm), Mn (0.105 – 0.185 ppm), Zn (0.156 – 0.62 ppm), Cu (0.166 0.32 ppm), P (0.23 – 0.39 mg/kg) and N (2.26 – 2.90 %) in sepals.

Key words: *Rosa damascena* Mill., inorganic elements, extraction, determination, comparative

1- Research Institute of Forests and Rangelands, P.O.Box: 13185-116 Tehran, Iran.
E-mail: mrezaee@rifr.ac.ir.