

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (*Nepeta schiraziana* Boiss.)

محمدرضا اخگر^۱ و مهران مرادعلیزاده^۲

۱ - نویسنده مسئول، استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، پست الکترونیک: m_akhgar2000@yahoo.com

۲ - استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

تاریخ پذیرش: دی ۱۳۸۹

تاریخ اصلاح نهایی: آذر ۱۳۸۹

تاریخ دریافت: مهر ۱۳۸۹

چکیده

جنس *Nepeta* (تیره نعناع) با نام فارسی "پونه‌سا" در ایران شامل ۶۷ گونه است که پونه‌سای شیرازی با نام علمی *Nepeta schiraziana* Boiss. از گونه‌های انحصاری آن می‌باشد. هدف از این مطالعه، شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس ساقه، گل و برگ گونه *Nepeta schiraziana* بود. بدین منظور، این گیاه از منطقه سپیدان واقع در شمال غرب استان فارس جمع‌آوری گردید و از ساقه، گل و برگ آن به‌طور جداگانه به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شد. ترکیب‌های تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) جداسازی و شناسایی شدند. در هر یک از روغن‌های اسانسی ساقه و گل، ۱۴ ترکیب شناسایی شد که ۸،۱-سینئول (۴۵/۶٪ و ۳۹/۴٪)، جرماکرن D (۱۷/۴٪ و ۱۵/۸٪) و بتا-کاریوفیلین (۱۱/۷٪ و ۱۰/۶٪) ترکیب‌های عمده، به‌ترتیب در اسانس ساقه و گل بودند. از طرف دیگر، از میان ۱۸ ترکیب شناسایی شده در اسانس برگ، ۸،۱-سینئول (۳۸/۵٪)، بتا-کاریوفیلین (۱۴/۲٪) و کاریوفیلین اکسید (۱۱/۷٪) ترکیب‌های اصلی اسانس را تشکیل می‌دادند. در نتیجه در هر سه اندام مورد بررسی، ۸،۱-سینئول بیشترین درصد اسانس را به خود اختصاص داده و ایزومرهای نپتالاکتون که در بسیاری از گونه‌های *Nepeta* گزارش شده، در گونه *Nepeta schiraziana* شناسایی نشد.

واژه‌های کلیدی: پونه‌سای شیرازی (*Nepeta schiraziana* Boiss.)، روغن اسانسی، ۸،۱-سینئول، بتا-کاریوفیلین، جرماکرن D، کاریوفیلین اکسید.

مقدمه

اغلب گونه‌های این جنس به دلیل داشتن اثرهای درمانی، در طب سنتی استفاده شده‌اند (Sajjadi, 2005). مثلاً گونه *N. cataria* جهت درمان سرماخوردگی، *N. menthoides* برای تسکین درد معده و به‌عنوان مسکن و تب‌بر، *N. bracteata* به‌عنوان داروی ضدنفخ و ضدآسم و همچنین *N. racemosa* به‌عنوان ضدعفونی‌کننده و اشتهاآور مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Mojab et al.,

جنس *Nepeta* از تیره نعناع (Labiatae) است و بیش از ۲۵۰ گونه دارد که در آسیا، اروپا و شمال آفریقا پراکنده می‌باشند (Rechinger, 1982). این جنس در ایران با نام فارسی "پونه‌سا" شامل ۶۷ گونه است که ۳۹ گونه از آنها، از جمله پونه‌سای شیرازی (*Nepeta schiraziana* Boiss.)، انحصاری ایران می‌باشند (مظفریان، ۱۳۷۷).

در این مطالعه، ترکیب‌های موجود در اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (*Nepeta schiraziana*) توسط دستگاه‌های کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) مورد بررسی قرار گرفتند. تاکنون در زمینه ترکیب شیمیایی اسانس گونه پونه‌سای شیرازی گزارشی منتشر نشده است.

مواد و روشها

جمع‌آوری گیاه و استخراج اسانس

گونه *Nepeta schiraziana* از منطقه سپیدان واقع در شمال غرب استان فارس (ارتفاع ۲۲۰۰-۲۰۰۰ متری) در خرداد ماه ۱۳۸۹ جمع‌آوری گردید. ساقه، گل و برگ گیاه در سایه و دمای محیط خشک شد. از هر نمونه به میزان ۱۰۰ گرم به‌طور جداگانه با استفاده از دستگاه کلونجر (Clevenger) اسانس‌گیری انجام شد و اسانس مربوط به آنها به روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) به مدت ۳ ساعت استخراج شد. پس از جداسازی روغن‌های اسانسی از آب، برای حذف رطوبت مقداری سولفات سدیم انیدرید به آنها اضافه شد و بازده اسانس‌ها با توجه به وزن خشک هر نمونه، تعیین گردید. روغن‌های اسانسی تا زمان تجزیه دستگاهی در ظرف‌های شیشه‌ای تیره و در دمای یخچال نگهداری شدند.

شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی

مشخصات دستگاه GC

کروماتوگراف گازی Shimadzu 15A، مجهز به ستون DB-5 به طول ۵۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر، ضخامت لایه فاز ساکن ۰/۲۵ میکرومتر و

خواص دارویی گونه‌های مختلف *Nepeta*، به‌طور کلی به روغن‌های اسانسی و همچنین فلاونوئیدهای موجود در این گونه‌ها نسبت داده می‌شود (Ghanadi et al., 2003; Jamzad et al., 2003).

تاکنون تحقیقات متعددی در خصوص اجزای تشکیل‌دهنده اسانس گونه‌های مختلف *Nepeta* موجود در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است. براساس این تحقیقات، در بیشتر گونه‌های این جنس، ایزومرهای نپتالاکتون یا ۸،۱-سینتول بیشترین درصد اسانس را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال، در گونه‌های *N. crassifolia* (Dabiri & Sefidkon, 2003)، *N. pogonosperma* (Sefidkon & Akbarinia, 2003)، *N. sintenisii* (Sajjadi, 2005)، *N. meyeri* (Esmaeili et al., 2006) و *N. eremophila* (Sefidkon et al., 2006)، نپتالاکتون بیشترین درصد اسانس را به خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر، در برخی از گونه‌ها مانند *N. ispahonica*، *N. crispa* و *N. rivularis* (Sefidkon et al., 2006)؛ *N. haussknechtii* (Jamzad et al., 2006) و *N. menthoides* (Sonboli et al., 2009)، بیشترین درصد اسانس متعلق به ۸،۱-سینتول می‌باشد. با این حال، در بعضی از گونه‌ها نیز ترکیب‌هایی مانند بتا-کاریوفیلن، کاریوفیلن اکسید، اسپاتولنول و یا لینالول بیشترین درصد اسانس را به خود اختصاص می‌دهند. به‌عنوان مثال، در گونه *N. daenensis* بتا-کاریوفیلن (Sajjadi & Mehregan, 2005)؛ در *N. cilicia*؛ و در کاریوفیلن اکسید (Kökdil et al., 1997) و در *N. satureioides* لینالول (Hadian et al., 2006) بیشترین درصد اسانس را تشکیل می‌دهند.

نتایج

بازده روغن‌های اسانسی مربوط به ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (*Nepeta schiraziana*) با توجه به وزن خشک هر نمونه، به ترتیب ۰/۷، ۱/۱ و ۰/۸ (w/w) بود. جدول ۱، ترکیب‌های شناسایی شده، شاخص‌های بازداري و درصد هر ترکیب را در روغن‌های اسانسی گیاه نشان می‌دهد. از بین ۱۴ ترکیب شناسایی شده در اسانس ساقه که ۹۷/۶٪ اسانس را تشکیل می‌دادند، ۸،۱-سینئول (۴۵/۶٪)، جرماکرن D (۱۷/۴٪) و بتا-کاریوفیلین (۱۱/۷٪) اجزاء اصلی اسانس بودند. همچنین ۱۴ ترکیب در اسانس گل شناسایی گردید که ۹۵/۷٪ اسانس را شامل می‌شدند. بنابراین ۸،۱-سینئول (۳۹/۴٪)، جرماکرن D (۱۵/۸٪) و بتا-کاریوفیلین (۱۰/۶٪) ترکیب‌های عمده اسانس بودند. از طرف دیگر، ۱۸ ترکیب در اسانس برگ شناسایی شد که ۹۴/۸٪ اسانس را تشکیل می‌دادند. بدین ترتیب ۸،۱-سینئول (۳۸/۵٪)، بتا-کاریوفیلین (۱۴/۲٪) و کاریوفیلین اکسید (۱۱/۷٪) اجزاء اصلی اسانس بودند.

بحث

همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، در هر سه روغن اسانسی درصد منوترپن‌ها بیشتر از سزکوئی‌ترپن‌ها می‌باشد. همچنین در هر سه اندام گیاه مورد بررسی، ۸،۱-سینئول بیشترین درصد اسانس را تشکیل می‌دهد. به‌علاوه، جرماکرن D که جزء ترکیب‌های اصلی اسانس ساقه و گل می‌باشد، در اسانس برگ شناسایی نشده‌است. از طرف دیگر، ایزومرهای نپتالاکتون که در بسیاری از گونه‌های *Nepeta* به‌عنوان ترکیب اصلی اسانس گزارش شده‌اند، در گونه *Nepeta schiraziana* شناسایی نشدند.

دمای محفظه تزریق ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد بود. در برنامه‌ریزی حرارتی، دمای اولیه ستون به مدت ۳ دقیقه در ۶۰ درجه سانتی‌گراد نگه‌داشته شد و تا دمای ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد با سرعت ۵ درجه سانتی‌گراد در دقیقه افزایش یافت و در دمای ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه متوقف شد. آشکارساز از نوع FID (آشکارساز یونیزاسیون شعله‌ای) با دمای ۲۷۰ درجه سانتی‌گراد و گاز حامل، هلیوم با سرعت جریان ۱ میلی‌لیتر بر دقیقه بود.

مشخصات دستگاه GC/MS

طیف‌سنج جرمی Hewlett-Packard مدل 5973 متصل به کروماتوگراف گازی HP 6890، ستون HP-5MS به طول ۳۰ متر، قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌متر و ضخامت لایه فاز ساکن ۰/۲۵ میکرومتر و دمای محفظه تزریق و آشکارساز به ترتیب ۲۵۰ و ۲۷۰ درجه سانتی‌گراد بود. برنامه‌ریزی حرارتی ستون از ۶۰ تا ۲۴۰ درجه سانتی‌گراد با افزایش دمای ۵ درجه سانتی‌گراد در دقیقه، گاز حامل، هلیوم با سرعت جریان ۱ میلی‌لیتر در دقیقه و انرژی یونیزاسیون معادل ۷۰ الکترون ولت بود. شاخص‌های بازداري (RI) برای تمام اجزاء، با تزریق آلکان‌های نرمال (C₇-C₂₅) به‌عنوان استاندارد، تحت شرایط یکسان با تزریق اسانس‌ها، تعیین گردید. شناسایی ترکیب‌های موجود در روغن‌های اسانسی با مقایسه طیف‌های جرمی و شاخص‌های بازداري بدست‌آمده، با طیف‌های جرمی و شاخص‌های بازداري ترکیب‌های استاندارد صورت گرفت (Adams, 2004؛ Davies, 1990). درصد نسبی هر یک از ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس‌ها با توجه به سطح زیر منحنی آن در طیف کروماتوگرام بدست آمد.

جدول ۱- ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ در گونه *Nepeta schiraziana*

ترکیب	شاخص بازداری	ساقه (%)	گل (%)	برگ (%)
α -pinene	۹۳۶	۱/۶	۳/۶	۴/۵
sabinene	۹۷۴	۲/۶	۲/۷	-
β -pinene	۹۸۰	۱/۳	۵/۳	۱/۱
<i>p</i> -cymene	۱۰۲۶	۳/۴	۱/۲	۲/۸
1,8-cineole	۱۰۳۰	۴۵/۶	۳۹/۴	۳۸/۵
γ -terpinene	۱۰۶۰	-	۱/۳	۰/۶
linalool	۱۰۹۵	-	۱/۹	-
<i>cis</i> -verbenol	۱۱۴۰	۲/۱	-	-
camphor	۱۱۴۴	۵/۲	-	-
α -terpineol	۱۱۹۰	-	۱/۵	۱/۲
myrtenol	۱۱۹۵	-	-	۳/۶
carvacrol	۱۲۹۷	-	-	۱/۹
δ -elemene	۱۳۳۲	۳/۳	-	۳/۱
α -copaene	۱۳۷۴	-	۰/۴	۰/۸
β -bourbonene	۱۳۸۵	-	۲/۴	۰/۴
β -elemene	۱۳۹۱	۱/۴	-	۵/۱
β -caryophyllene	۱۴۱۸	۱۱/۷	۱۰/۶	۱۴/۲
α -humulene	۱۴۵۱	۰/۷	-	۰/۳
germacrene D	۱۴۸۵	۱۷/۴	۱۵/۸	-
bicyclogermacrene	۱۴۹۷	-	۲/۴	۱/۲
γ -cadinene	۱۵۱۵	۰/۲	-	۱/۴
δ -cadinene	۱۵۲۶	-	-	۲/۴
caryophyllene oxide	۱۵۸۰	۱/۱	۷/۲	۱۱/۷
منوترپین‌ها	-	۶۱/۸	۵۶/۹	۵۴/۲
سزکوئی‌ترین‌ها	-	۳۵/۸	۳۸/۸	۴۰/۶
مجموع	-	۹۷/۶	۹۵/۷	۹۴/۸

با بررسی تحقیقات انجام شده بر روی ترکیب شیمیایی اسانس گونه‌های مختلف *Nepeta*، این گونه‌ها را می‌توان در چند گروه کلی طبقه‌بندی نمود.

گروه اول: ترکیب اصلی اسانس نپتالاکتون است و به‌طور کلی ۸،۱-سینئول نیز جزء ترکیب‌های عمده اسانس می‌باشد. گونه‌هایی همچون *N. pogonosperma* (Sefidkon & Akbarinia, 2003)، *N. kotschyi* (Nori) و *N. eremophila* (Shargh et al., 2006) و *N. eremophila* (Sefidkon et al., 2006) در این گروه قرار می‌گیرند.

منابع مورد استفاده

مظفریان، و.، ۱۳۷۷. فرهنگ نامهای گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ۷۴۰ صفحه.

- Adams, R.P., 2004. Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography/Quadrupole Mass Spectroscopy. Allured Publishing Corporation, Illinois, USA, 456p.
- Dabiri, M. and Sefidkon, F., 2003. Chemical composition of *Nepeta crassifolia* Boiss. & Buhse oil from Iran. *Flavour and Fragrance Journal*, 18(3): 225-227.
- Davies, N.W., 1990. Gas chromatographic retention indices of monoterpenes and sesquiterpenes on methyl silicon and Carbowax 20M phases. *Journal of Chromatography*, 503: 1-24.
- Esmaceli, A., Rustaiyan, A., Masoudi, S. and Nadji, K., 2006. Composition of the essential oils of *Mentha aquatica* L. and *Nepeta meyeri* Benth. from Iran. *Journal of Essential Oil Research*, 18(3): 263-265.
- Ghannadi, A., Aghazari, F., Mehrabani, M., Mohagheghzadeh, A. and Mehregan, I., 2003. Quantity and composition of the SDE prepared essential oil of *Nepeta macrosiphon* Boiss. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, 2: 103-105.
- Habibi, Z., Masoudi, S. and Rustaiyan, A., 2004. Essential oil of *Nepeta makuensis* Jamzad et Mozaffarian from Iran. *Journal of Essential Oil Research*, 16(3): 214-215.
- Hadian, J., Sonboli, A., Nejad Ebrahimi, S. and Mirjalili, M. H., 2006. Essential oil composition of *Nepeta satureioides* from Iran. *Chemistry of Natural Compounds*, 42(2): 175-177.
- Jamzad, M., Rustaiyan, A., Masoudi, S. and Jamzad, Z., 2008. Composition of the essential oils of *Nepeta sessilifolia* Bunge and *Nepeta haussknechtii* Bornm. from Iran. *Journal of Essential Oil Research*, 20(6): 533-535.

گروه دوم: ترکیب اصلی اسانس ۸،۱-سینئول بوده و نپتالاکتون نیز جزء ترکیب‌های عمده اسانس گزارش شده‌است. گونه‌های *N. menthoides* (Sonboli et al., 2009) و *N. crispa* (Sefidkon et al., 2006) در این گروه جای دارند.

گروه سوم: ترکیب اصلی اسانس ۸،۱-سینئول است و نپتالاکتون در ترکیب اسانس وجود ندارد. گونه‌های *N. ispahanica* (Salehi et al., 2007) و *N. gloeocephala* (Safaei-Ghomi et al., 2006) و *N. involucrate* (Sonboli et al., 2005) نمونه‌هایی از این گروه می‌باشند.

گروه چهارم: گونه‌هایی که در آنها منوترپن‌ها یا سزکوئی‌ترین‌هایی مانند لینالول، آلفا-پینن، بتا-کاریوفیلن، کاریوفیلن اکسید، اسپاتولنول و یا ویریدیفلورول، ترکیب اصلی اسانس را تشکیل می‌دهند و نپتالاکتون در ترکیب اسانس وجود ندارد. گونه‌هایی مانند *N. sessilifolia* (Hadian et al., 2008) و *N. depauperata* (Mehrabani et al., 2006) و *N. makuensis* (Habibi et al., 2004) در این گروه قرار می‌گیرند.

گروه پنجم: ترکیب اصلی اسانس ۸،۱-سینئول است و نپتالاکتون در ترکیب اسانس وجود ندارد. گونه‌های *N. makuensis* (Habibi et al., 2004) و *N. makuensis* (Habibi et al., 2004) در این گروه قرار می‌گیرند.

گروه ششم: ترکیب اصلی اسانس ۸،۱-سینئول است و نپتالاکتون در ترکیب اسانس وجود ندارد. گونه‌هایی مانند *N. sessilifolia* (Hadian et al., 2008) و *N. depauperata* (Mehrabani et al., 2006) و *N. makuensis* (Habibi et al., 2004) در این گروه قرار می‌گیرند.

- Sajjadi, S.E. and Mehregan, I., 2005. Chemical constituents of essential oil of *Nepeta daenensis* Boiss. Journal of Essential Oil Research, 17(5): 563-564.
- Sajjadi, S.E., 2005. Analysis of the essential oil of *Nepeta sintenisii* Bornm. from Iran. Daru Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(2): 61-64.
- Salehi, P., Sonboli, A. and Allahyari, L., 2007. Antibacterial and antioxidant properties of the essential oil and various extracts of *Nepeta ispahanica* from Iran. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 10(4): 324-331.
- Sefidkon, F. and Akbarinia, A., 2003. Essential oil composition of *Nepeta pogonosperma* Jamzad et Assadi from Iran. Journal of Essential Oil Research, 15(5): 327-328.
- Sefidkon, F., 2001. Essential oil of *Nepeta glomerulosa* Boiss. from Iran. Journal of Essential Oil Research, 13(6): 422-423.
- Sefidkon, F., Jamzad, Z. and Mirza, M., 2006. Chemical composition of the essential oil of five Iranian *Nepeta* species (*N. crispa*, *N. mahanensis*, *N. ispahanica*, *N. eremophila* and *N. rivularis*). Flavour and Fragrance Journal, 21(5): 764-767.
- Sonboli, A., Gholipour, A., Yousefzadi, M. and Mojarrad, M., 2009. Antibacterial activity and composition of the essential oil of *Nepeta menthoides* from Iran. Natural Product Communications, 4(2): 283-286.
- Sonboli, A., Salehi, P. and Allahyari, L., 2005. Essential oil composition of *Nepeta involucrata* from Iran. Chemistry of Natural Compounds, 41(6): 683-685.
- Jamzad, Z., Grayer, R.J., Kite, G.C., Simmonds, M.S.J., Ingrouille, M. and Jalili, A., 2003. Leaf surface flavonoids in Iranian species of *Nepeta* (Lamiaceae) and some related genera. Biochemical Systematics and Ecology, 31(6): 587-600.
- Kökdil, G., Tanker, M. Kurucu, S. and Topcu, G., 1997. Essential oil analysis of *Nepeta cilicia* Boiss. Flavour and Fragrance Journal, 12(2): 99-101.
- Mehrabani, M., Asadipour, A. and Amoli, S. S., 2004. Chemical constituents of the essential oil of *Nepeta depauperata* Benth. from Iran. Daru Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(3): 98-100.
- Mojab, F., Nickavar, B. and Hooshdar Tehrani, H., 2009. Essential oil analysis of *Nepeta crispa* and *N. menthoides* from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(1): 43-46.
- Nori Shargh, D., Baharvand, B., Raftari, S. and Deyhimi, F., 2006. The volatile constituents analysis of *Nepeta kotschyi* Boiss. from Iran. Journal of Essential Oil Research, 18(3): 237-238.
- Rechinger, K.H., 1982. Labiatae. In Flora Iranica. No. 150, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz, Austria, 590p.
- Rustaiyan, A., Jamzad, M., Masoudi, S. and Ameri, N., 2006. Volatile constituents of *Nepeta hellotropifolia* Lam., *Mentha mozaffarianii* Jamzad and *Ziziphora persica* Bunge., three Labiatae herbs growing wild in Iran. Journal of Essential Oil Research, 18(3): 348-351.
- Safaei-Ghomi, J., Bamoniri, A., Haghani, M. and Batooli, H., 2006. Essential oil composition of *Nepeta gloeocephala* Rech. f. from Iran. Journal of Essential Oil Research, 18(6): 635-637.

Chemical composition of the essential oils from stems, flowers and leaves of *Nepeta schiraziana* Boiss.

M.R. Akhgar^{1*} and M. Moradalizadeh²

1*- Corresponding author, Department of Chemistry, Faculty of Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
E-mail: m_akhgar2000@yahoo.com

2- Department of Chemistry, Faculty of Science, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

Received: October 2010

Revised: December 2011

Accepted: January 2011

Abstract

The genus *Nepeta* (Labiatae) with the common Persian name of “Pune-sa” includes 67 species in Iran and *Nepeta schiraziana* Boiss. is one of its endemic species. In this study, the stems, flowers and leaves of *Nepeta schiraziana* were collected from Sepidan region in north-west of Fars Province. The essential oils of stems, flowers and leaves of the plant were separately obtained by hydrodistillation and analyzed by GC and GC/MS. In each oils of the stem and flower, fourteen components were identified with 1,8-cineole (45.6% and 39.4%), germacrene D (17.4% and 15.8%), and β -caryophyllene (11.7% and 10.6%) as the main constituents, respectively. Furthermore, 1,8-cineole (38.5%), β -caryophyllene (14.2%), and caryophyllene oxide (11.7%) were the major components among the 18 constituents characterized in the leaf oil. As a result, 1,8-cineole was the dominant compound in the investigated oils while nepetalactone isomers reported in many *Nepeta* species, were not identified in *Nepeta schiraziana*.

Key words: *Nepeta schiraziana* Boiss., essential oil, 1,8-cineole, β -caryophyllene, germacrene D, caryophyllene oxide.