

## Effect of Oral Prednisolone on Visual Outcomes and Complications after Scleral Buckling

Dehghan MH, MD; Feghhi M, MD; Ahmadieh H, MD; Soheilian M, MD; Azarmina M, MD; Moradian S, MD; Ramezani AR, MD; Tavallali A, MD

**Purpose:** To evaluate the effect of oral prednisolone on visual outcome and complications of scleral buckling (SB) in patients with rhegmatogenous retinal detachment (RRD).

**Methods:** In a randomized double-blind placebo-controlled trial, patients with acute RRD who underwent SB were randomly divided into two groups. Oral prednisolone was administered for the treatment group and placebo for the control group. The two groups were compared for visual acuity (VA), retinal detachment (RD), cystoid macular edema (CME), and proliferative vitreoretinopathy (PVR).

**Results:** The trial was performed on 25 patients in the treatment group and 27 patients in the placebo group. Mean preoperative VA (LogMAR) was  $1.46 \pm 0.81$  overall, including  $0.85 \pm 0.62$  in the treatment group and  $0.26 \pm 0.61$  in the placebo group ( $P=0.39$ ). Extent of RD, hypotony and RD location were equal in both groups. Choroidal detachment was seen in 3 eyes in the treatment group and 4 eyes in the placebo group. ( $P=0.45$ ) Significant PVR was seen in one eye in the treatment group and 3 eyes in the placebo group. ( $P=0.33$ ) CME was seen in 3 eyes in the treatment group and 5 eyes in the placebo group. ( $P=0.39$ )

**Conclusion:** Postoperative oral prednisolone does not seem to affect visual outcomes and complications of scleral buckling in phakic patients.

**Key words:** scleral buckling, prednisolone

- Bina J Ophthalmol 2005; 11 (2): 176-182.

### تأثیر پردنیزولون خوراکی بر پیامدهای ناشی از عمل جراحی باکلینگ صلبیه

دکتر محمد حسین دهقان<sup>۱</sup>، دکتر مصطفی فقهی<sup>۲</sup>، دکتر حمید احمدیه<sup>۳</sup>، دکتر مسعود سهیلیان<sup>۴</sup>، دکتر محسن آذرمنا<sup>۵</sup>، دکتر سیامک مرادیان<sup>۶</sup>، دکتر علیرضا رمضانی<sup>۷</sup> و دکتر علی توکلی<sup>۸</sup>

#### چکیده

هدف: ارزیابی تأثیر پردنیزولون خوراکی در بهبود دید نهایی و کاهش برخی از عوارض عمل جراحی باکلینگ صلبیه در بیماران مبتلا به جداشده‌گی شبکیه.

روش پژوهش: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار با تجویز دارونما و دوسوکور بر روی بیمارانی انجام شد که به دلیل جداشده‌گی رگماتوزن حاد شبکیه به بیمارستان شهید لبافی نژاد مراجعه می‌کردند. بیماران پس از اعمال معیارهای ورود و خروج مطالعه، توسط گروه شبکیه تحت عمل جراحی باکلینگ صلبیه قرار گرفتند. پس از عمل، بیماران به طور تصادفی به دو گروه درمان و شاهد تقسیم شدند. در گروه درمان، پردنیزولون خوراکی و در گروه شاهد، دارونمای مشابه با داروی موثر تجویز گردید. بیماران دو گروه از نظر حدت بینایی، جداشده‌گی شبکیه، ادم سیستویید ماکولا و ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو (PVR) مقایسه شدند.

دکتر محمدحسین دهقان- پردنیزولون خوراکی بعد از جراحی باکلینگ صلبیه

**یافته‌ها:** تعداد ۵۲ بیمار شامل ۲۵ بیمار در گروه درمان و ۲۷ بیمار در گروه دارونما بررسی شدند. بیماران شامل ۳۴ مرد (۶۵/۴ درصد) و ۱۸ زن (۳۴/۶ درصد) بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه  $۴۴/۸ \pm ۱۵/۷$  سال بود. اختلاف مدت زمان جداشده شبکیه تا زمان عمل جراحی در دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. اختلاف دید در دو گروه قبل از عمل ( $۱/۴۷ \pm ۰/۸۱$ ) لوگمار در گروه درمان و  $۱/۴۴ \pm ۰/۸۲$  لوگمار در گروه دارونما) و بعد از عمل ( $۰/۶۲ \pm ۰/۳۹$ ) لوگمار در گروه درمان و  $۰/۷۸ \pm ۰/۰۵۸$  لوگمار در گروه دارونما) به لحاظ آماری معنی دار نبود. در یک بیمار از گروه درمان (۴ درصد) و ۳ بیمار از گروه دارونما (۱۱/۱ درصد) PVR مشاهده شد ( $P=0/۳۳$ ). ادم ماکولای بعد از عمل، براساس آنژیوگرافی با فلورسین، در ۳ بیمار از گروه درمان (۱۲ درصد) و ۵ بیمار از گروه دارونما (۱۸/۵ درصد) مشاهده شد ( $P=0/۳۹$ ). در هیچ کدام از بیماران، چروکیدگی ماکولا (macular pucker) به تنها یی مشاهده نشد.

**نتیجه‌گیری:** تجویز استروپید بعد از عمل جراحی باکلینگ صلبیه، به طور همگانی پیشنهاد نمی‌شود و باید بسته به شرایط تجویز گردد.

• مجله چشم‌پزشکی بینا ۱۳۸۴؛ دوره ۱۱، شماره ۲: ۱۷۶-۱۸۲.

#### • پاسخ‌گو: دکتر محمدحسین دهقان (mhdehghan5@hotmail.com)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴

تاریخ تایید مقاله: ۱۷ مهر ۱۳۸۴

۱- دانشیار- چشم‌پزشک - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- استادیار- چشم‌پزشک - دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۳- استاد- چشم‌پزشک - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴- استادیار- چشم‌پزشک- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵- فلوشیپ زجاجیه و شبکیه- چشم‌پزشک - بیمارستان دکتر خدادوست  
تهران- پاسداران- بوستان نهم- بیمارستان شهید لبافی نژاد- مرکز تحقیقات چشم

شبکیه (RPE) و گلیاهای شبکیه‌ای در منطقه ماکولا، غشای پرهرتیمال تشکیل می‌گردد<sup>۱</sup> که منجر به افت شدید دید می‌شود و میزان بروز آن ۳-۱۷ درصد است<sup>۲</sup>.

• ویتریورتینوپاتی پرولیفراطیو (PVR) که در ۱۰-۵ درصد موارد رخ می‌دهد و منجر به جداشده شد شبکیه می‌گردد<sup>۳</sup>.

کورتیکواستروپیدها، جهت کاهش التهاب داخل چشمی در بیماری‌های چشمی، برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ استفاده شدند<sup>۴</sup>. سازوکار اصلی عملکرد استروپیدها، مهار ساخت و کاهش آزاد شدن پروستاگلندین‌ها و مهار تولید هیستامین است<sup>۵</sup>. یکی از اثرات استروپیدها، جلوگیری از پرولیفراش فیبروبلاست‌ها و جلوگیری از ساخت پروتئین‌ها توسط این یاخته‌هاست که می‌تواند در مهار روند بروز PVR موثر باشد<sup>۶</sup>.

با این که تاکنون مطالعات منتشرشده محدودی مبنی بر مفید بودن کورتیکواستروپید سیستمیک در جلوگیری از بروز عوارض فوق در دسترس می‌باشند؛ در بعضی از مراکز، پس از

#### مقدمه

درمان جراحی جداشده شدگی رگماتوزن شبکیه (RRD) به روش باکلینگ صلبیه، از جمله جراحی‌های متداول چشم است که در بخش‌های چشم انجام می‌شود. این شیوه درمانی دارای عوارض متعددی است که برخی از آن‌ها عبارتند از:

• جداشده شدگی مشیمیه با بروز حدود ۴۰ درصد که به طور معمول ۲-۴ روز بعد از جراحی رخ می‌دهد و در بعضی موارد می‌تواند منجر به بروز گلوكوم زاویه‌بسته شود<sup>۷</sup>.

• ادم سیستوپید ماکولا (CME) که ۴-۶ هفته بعد از عمل رخ می‌دهد<sup>۸</sup>. این عارضه به دنبال بیماری‌های التهابی و سایر جراحی‌های چشمی نیز رخ می‌دهد. ترشح پروستاگلندین‌ها را در پاتوژن آن دخیل می‌دانند<sup>۹</sup> و می‌تواند به افت دید منجر شود<sup>۱۰</sup>.

• چروکیدگی ماکولا (macular pucker) یکی از علل عمدۀ افت دید بعد از عمل باکلینگ صلبیه محسوب می‌شود. در این عارضه، در اثر تجمع یاخته‌های اپی‌تلیوم پیگمانته

مبتلایان به جداشدگی‌های طول‌کشیده شبکیه (long standing RD)، بیماران دارای سابقه جراحی زجاجیه و شبکیه، موارد PVR، نزدیکی‌بینی بالای ۶ دیوبتر، استحاله ماکولا، سوراخ ماکولا، بروز عوارض حین عمل مانند خون‌ریزی از ناحیه اسکلروتومی محل درناز مایع زیر شبکیه، تمام‌ضخامت شدن بخیه صلبیه به طوری که شبکیه در محل گیر بیفتند و یا زجاجیه خارج شود گاز به داخل فضای زجاجیه حین عمل جراحی و بیمارانی که منع مصرف یا سابقه مصرف طولانی‌مدت کورتون سیستمیک داشتند؛ وارد مطالعه نشدند.

بیماران تحت بررسی کامل چشم‌پزشکی از نظر سابقه جداشدگی شبکیه چشم مقابله، سابقه ضربه غیرنافذ چشم، حدت بینایی، عیب انکساری هر دو چشم، میزان نقص نسبی آوران مردمکی (RAPD)، فشار داخل چشمی، وسعت RD، وجود ضایعات مستعد‌کننده RD در محیط شبکیه، میزان PVR، وجود عالیم استحاله ناشی از نزدیکی‌بینی و تعداد، محل و وسعت سوراخ‌ها و پارگی‌های شبکیه قرار گرفتند.

باکل صلبیه، به صورت پریتوسی ۳۶۰ درجه و بخیه‌های کششی ۴ ماهیچه راست خارج چشمی، تعیین محل پارگی و سوراخ شبکیه و کرایوی محل با انجام بخیه‌های لازم جهت کار گذاشتند باکل و یا اسفنج انجام شد و در موارد اندیکاسیون باند دورتادوری (encircling) شامل جداشدگی کامل، سوراخ‌های متعدد شبکیه، نیافتن سوراخ مشخص شبکیه، استحاله لاتیس وسیع و نزدیکی‌بینی بالا، باند دورتادوری گذاشته شد. پس از درناز مایع زیر شبکیه (درصورت لزوم)، به وسیله سفت کردن باند و یا محکم نمودن بخیه‌های باکل و یا با کشیدن بخیه‌های ماهیچه‌ها، از هایپوتونی جلوگیری می‌شد.<sup>۱</sup>

نوع باند و باکل، روش کارگذاری باکل، تعداد نقاط کرایو، تزریق مایع داخل چشم، پیدا نشدن سوراخ، یافتن سوراخ‌های جدید حین عمل نیز ثبت شدند. پس از عمل، بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در یک گروه، به مدت ۱۰ روز، قرص پردنیزولون خوراکی به میزان یک میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن همراه با آنتی‌اسید تجویز شد (گروه درمان) و یک گروه نیز قرص‌های ویتمین B<sub>6</sub> که همنگ و هماندازه پردنیزولون می‌باشند؛ به عنوان دارونیما مصرف می‌کردند (گروه دارونیما). قرص‌ها در ۲ جعبه با شماره ۱ و ۲ مشخص شده

عمل باکلینگ صلبیه، به طور همگانی از پردنیزولون خوراکی به صورت کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.<sup>۱۱</sup>

استرووید خوراکی دارای عوارض متعددی است که در مصرف دراز‌مدت شایعند و به ندرت در مصرف کوتاه‌مدت نیز بروز می‌کنند. عوارض موضعی ناشی از مصرف سیستمیک استروویدها عبارتند از گلوكوم، کدورت زیرکپسولی خلفی عدسی، اتساع مردمک، افتادگی بلک، ادم پابی، فعل شدن عفونت‌های چشمی و تاخیر در ترمیم زخم.<sup>۱۲</sup>

عارض سیستمیک مصرف استروویدها عبارتند از زخم گوارشی (peptic ulcer)، پوکی استخوان، شکستگی پاتولوژیک استخوان‌ها، نکروز آسپتیک سر فمور، آتروفی پوست و ماهیچه، هایپرگلیسمی، فشار خون بالا و افزایش وزن.<sup>۱۳</sup>

در مطالعه‌ای که Valone و Moser<sup>۱۴</sup> بر روی ۱۳۴ بیمار دچار RRD انجام دادند؛ موثر بودن استرووید سیستمیک در جلوگیری از جداشدگی مشیمیه، نتایج مثبت آناتومیک و بهبود دید نهایی را گزارش نمودند. در این مطالعه از کورتون داخل سیاهه‌گی همراه با آنتی‌بیوتیک استفاده کردند که چون مصرف دارو به صورت داخل سیاهه‌گی بود و همه عوارض بعد از عمل را نیز شامل نشده بود؛ نمی‌تواند پاسخ‌گوی کامل نیاز ما در این زمینه باشد.<sup>۱۱</sup>

Gopal و Sharma<sup>۱۵</sup> از تجویز کورتون خوراکی قبل از عمل در درمان جداشدگی شبکیه همراه با جداشدگی مشیمیه در بیمارانی که تحت درمان ویترکتومی اولیه قرار گرفته بودند؛ استفاده کردند و توصیه نمودند که در این گونه بیماران، از استرووید سیستمیک استفاده شود ولی چون شیوه درمان ویترکتومی بود؛ نتیجه را نمی‌توان به بیماران کاندید عمل جراحی باکلینگ صلبیه تعمیم داد. با انجام پژوهش حاضر، تاثیر پردنیزولون خوراکی در کاهش بعضی از عوارض عمل باکلینگ صلبیه و تاثیر نهایی آن بر روی دید بیماران بررسی می‌گردد.

## روش پژوهش

مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار دوسوکور با تجویز دارونما انجام شد. همه بیماران دچار جداشدگی رگماتوژن حاد شبکیه که به لحاظ PVR در مراحل A یا B قرار داشتند و کاندید جراحی باکلینگ صلبیه شدند؛ مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران آفاک یا سودوفاک، افراد دیابتی،

۳۴۶ درصد) بودند که ۱۷ مرد (۶۸ درصد) و ۸ زن (۲۲ درصد) در گروه درمان و ۱۷ مرد (۶۳ درصد) و ۱۰ زن (۳۷ درصد) در گروه دارونما قرار داشتند ( $P=0.46$ ).

توزیع فراوانی بیماران براساس مدت زمان RD تا زمان عمل جراحی باکلینگ صلبیه، در جدول (۱) ارایه شده است. میانگین مدت زمان RD در گروه درمان  $9.2 \pm 6.7$  و در گروه دارونما  $6.9 \pm 3.2$  بود ( $P=0.38$ ).

**جدول ۱- توزیع فراوانی بیماران براساس مدت زمان جداشده شبکیه تا عمل جراحی به تفکیک گروه‌ها**

گروه‌ها: تعداد (درصد)			
مدت زمان (n=۵۲)	درمان (n=۲۵) دارونما (n=۲۷)	جمع (n=۵۲)	تعداد (درصد)
۴۲ (۸۰/۸)	۲۴ (۸۸/۹)	۱۸ (۷۲)	تا یک هفته
۷ (۱۳/۵)	۳ (۱۱/۱)	۴ (۱۶)	تا ۳۰ روز
۳ (۵/۸)	.	۳ (۱۲)	بیش از ۳۰ روز

توزیع فراوانی بیماران براساس دید قبل و بعد از عمل در جدول (۲) آمده است. میانگین دید قبل از عمل، در کل بیماران  $1.46 \pm 0.81$  لوگمار، در گروه درمان  $1.47 \pm 0.81$  لوگمار و در گروه دارونما  $1.44 \pm 0.82$  لوگمار بود ( $P=0.9$ ). میانگین دید بعد از عمل بر حسب لوگمار در کل بیماران  $5.7 \pm 0.5$  بود که در گروه درمان  $3.9 \pm 0.62$  و در گروه دارونما  $7.8 \pm 0.58$  بود ( $P=0.39$ ).

بودند که تنها مسؤول پرستاری بخش از آن اطلاع داشت. قرص‌ها براساس جدول اعداد تصادفی به بیماران داده می‌شدند و پزشک معالج و بیمار از نوع قرص مصرفی اطلاعی نداشتند.

اطلاعات مربوط به مدت زمان بستری در بیمارستان شامل حدت بینایی، فشار داخل چشمی، وجود جداشده شبکیه و سعیت آن، عدم چسبیدن کوآدران‌های شبکیه، عمل مجدد شامل تزریق گاز (SF<sub>6</sub>) و یا باکل مجدد نیز ثبت شدند. حدت بینایی براساس تابلوی استلن تعیین می‌شد و جهت تحلیل آماری، به مقیاس لوگمار (LogMAR) تبدیل می‌گشت.

بی‌گیری بیماران به صورت مراجعات در هفته‌ها اول، چهارم و ششم و ماه سوم و ششم انجام شد. معاينات چشمی مربوط به مراجعات بیمار شامل تعیین حدت بینایی، میزان عیب انکساری (پس از ۳ ماه)، فشار داخل چشمی، میزان واکنش اتفاق قدامی، چسبیدن شبکیه، وجود جداشده شبکیه، ادم سیستویید ماکولا، چروکیدگی ماکولا، وجود PVR و نوع و سعیت آن بودند. جهت تعیین ادم سیستویید ماکولا، ۶ هفته بعد از عمل، آژیوگرافی با فلورسین (FA) انجام شد.

### یافته‌ها

تعداد ۵۸ بیمار وارد مطالعه شدند که ۵۲ بیمار شامل ۲۵ بیمار در گروه درمان و ۲۷ بیمار در گروه دارونما، بی‌گیری کامل داشتند و مورد واکاوی (آنالیز) آماری قرار گرفتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در مجموع  $44.8 \pm 15.7$ ، در گروه درمان  $48 \pm 14$  سال و در گروه دارونما  $42 \pm 17$  سال بود ( $P=0.12$ ). بیماران شامل ۳۴ مرد (۶۵٪) و ۱۸ زن

**جدول ۲- توزیع فراوانی بیماران براساس دید قبل و بعد از عمل، به تفکیک گروه‌ها و در کل**

گروه‌ها: تعداد (درصد)							میزان دید	
جمع (n=۵۲)		دارونما (n=۲۷)		درمان (n=۲۵)				
بعد	قبل	بعد	قبل	بعد	قبل	قبل		
۱۶ (۳۰/۸)	۴۰ (۷۶/۹)	۸ (۲۹/۶)	۱۹ (۷۰/۴)	۸ (۳۲)	۲۱ (۸۴)	.	HM	
۲۳ (۴۴/۲)	۱۱ (۲۹/۲)	۱۳ (۴۸/۱)	۷ (۲۵/۹)	۱۰ (۴۰)	۴ (۱۶)	.	CF-1/10	
۱۳ (۲۵)	۱ (۱/۹)	۶ (۲۲/۲)	۱ (۳/۷)	۷ (۲۸)	.	.	>1/10	
بین دو گروه $0.14$				<۰.۰۰۰۱			* میزان	

HM: hand motion, CF: count finger

\* آزمون Mc Nemar

**جدول ۳- توزیع فراوانی بیماران براساس محل پارگی شبکیه به تفکیک گروه‌ها**

گروه‌ها: تعداد (درصد)			
درمان (n=۵۲)	دارونما (n=۲۵)	دارونما (n=۲۷)	مجموع (n=۷۲)
۴۲ (۸۰/۸)	۲۴ (۸۸/۹)	۱۸ (۷۲)	فوقانی
۷ (۱۳/۵)	۳ (۱۱/۱)	۴ (۱۶)	تحتانی
۳ (۵/۸)	.	۳ (۱۲)	فوقانی و تحتانی

آزمون مربع کای و  $P=0,35$

**جدول ۴- توزیع فراوانی بیماران براساس وسعت جداشدگی شبکیه به تفکیک گروه‌ها**

گروه‌ها: تعداد (درصد)			
وسعت پارگی درمان (n=۵۲)	وسعت پارگی دارونما (n=۲۵)	دارونما (n=۲۷)	مجموع (n=۷۲)
۹ (۱۷/۳)	۴ (۱۴/۸)	۵ (۲۰)	موضعی
۲۹ (۵۵/۸)	۱۶ (۵۹/۳)	۱۳ (۵۲)	ناتکامل
۱۴ (۲۶/۹)	۷ (۲۵/۹)	۷ (۲۸)	کامل

آزمون مربع کای و  $P=0,84$

**جدول ۵- مقایسه دو گروه از نظر میزان شیوع جداشدگی مشیمیه، PVR و ادم ماکولا بعد از عمل**

میزان	گروه‌ها: تعداد (درصد)				ویژگی‌ها
	p	مجموع (n=۵۲)	دارونما (n=۲۷)	درمان (n=۲۵)	
۰,۴۵	۷ (۱۳/۵)	۳ (۱۱/۱)	۴ (۱۶)	جداشدگی مشیمیه	
۰,۳۳	۴ (۷/۷)	۳ (۱۱/۱)	۱ (۴)	(یک هفته پس از عمل)	
۰,۳۹	۸ (۱۵/۴)	۵ (۱۸/۵)	۳ (۱۲)	PVR (۶ ماه پس از عمل)	
				ادم ماکولا ۶ هفته بعد از عمل	

PVR: proliferative vitreoretinopathy

می‌گردد. علاوه بر بهبود در کیفیت عمل، تلاش‌هایی برای کاهش عوارض پس از عمل صورت گرفته‌اند که از جمله آن‌ها، استفاده از استریویید سیستمیک به منظور کاهش و کنترل بعضی از عوارض می‌باشد. کورتیکواستریوییدها با سازوکارهای مختلفی عمل می‌کنند که برخی از آن‌ها عبارتند از<sup>۱۵،۱۶</sup>:

- تولید مقادیر زیادی نوتروفیل را در مغز استخوان القا می‌کنند و هم‌زمان، مانع چسبیدن این یاخته‌ها به آندوتیلیوم عروق و در نتیجه مانع از ورود آن‌ها به بافت و رسیدن آن‌ها به محل التهاب می‌شوند.

در هیچ‌کدام از بیماران، چروکیدگی ماکولا به تنها‌یی دیده نشد؛ گرچه در مواردی که منجر به PVR و جداشدگی مجدد شبکیه شده بودند؛ وجود غشای روی شبکیه‌ای نیز به عنوان بخشی از PVR محسوب گردید.

### بحث

عمل جراحی باکلینگ صلبیه، یکی از روش‌های موثر در درمان RD محسوب می‌شود که دارای عوارض متعددی است و در بسیاری از موارد، منجر به کاهش دید و شکست درمانی

سایر عوارض ناشی از عمل جراحی باکلینگ صلبیه در مواردی که پیش اگهی بدی مورد انتظار نیست؛ تاثیری ندارد. همچنین این بررسی نشان داد که استرووید خوراکی با مقدار و مدت زمان تجویز شده در این مطالعه، در بهبود دید پس از عمل بی تاثیر است و مشخص شد که میزان بهبود دید در گروه درمان شده با استرووید خوراکی در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند؛ از نظر آماری معنی دار نبود و بیشتر از همه تحت تاثیر میزان دید هنگام مراجعته قرار داشت (جدول ۵).

### نتیجه گیری

پیش رفت فن آوری و پدید آمدن وسایل دقیق در معاینه افتالموسکوپی بیماران و در نتیجه، تشخیص موارد ابتدایی پارگی شبکیه، همچنین گسترش و تکامل دانش فارماکولوژی و درک بیشتر فواید، مضار، سازوکارهای اثر استروویدها و در نتیجه استفاده روزافزون و دایم آن در درمان بسیاری از بیماری‌ها و پس از انجام بسیاری از اعمال جراحی از جمله باکلینگ صلبیه و از طرفی عدم مطالعه‌ای قاع دنده و پاسخ‌گو به این سوال که "آیا استفاده از استروویدهای خوراکی در تمام بیمارانی که تحت عمل جراحی باکلینگ صلبیه قرار می‌گیرند؛ مفید است؟" ما را بر آن داشت که این مطالعه را انجام دهیم و به این نتیجه رسیدیم که جواب سوال فوق منفی است و تجویز استرووید به طور معمول در هر بیمار پس از عمل جراحی باکلینگ صلبیه پیشنهاد نمی‌شود و باید بسته به شرایط تجویز گردد. انجام مطالعات گسترده‌تر برای بررسی اثر استرووید در هر کدام از شرایطی که موقوفیت عمل جراحی را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ توصیه می‌گردد.

### منابع

- اوزنوفیل‌ها و مونوسیت‌های در گردش را کاهش می‌دهند.
  - با کاهش در فعال‌سازی ماکروفازها و جلوگیری از چسبیدن آن‌ها به آندوتیلیوم عروق، منجر به تغییر پاسخ‌های ایمنی وابسته به یاخته (CMI) می‌گردد.
  - با مهار عامل رشد آندوتیلیوم عروقی (VEGF)، باعث کاهش نشت عروقی و برطرف شدن ادم بافتی (شامل ادم شبکیه و CME) می‌شوند<sup>۱۷ و ۱۸</sup>.
- موفقیت آناتومیک جراحی باکلینگ صلبیه در بیماران RD به چندین عامل بستگی دارد؛ از جمله وجود ویترورتینوپاتی، مصدومیت، نزدیک‌بینی، بیماری زمینه‌ای، رتینوباتی نوزادان نارس، محل لنز داخل چشمی، PVR، یوویت و جداشگی مشیمیه قبل از عمل. نتایج بینایی نیز به وضعیت ماقولا، دید قبل از عمل و نوع بیماری همراه با RD بستگی دارند<sup>۱۹</sup>.
- Moser و Valone<sup>۱۱</sup> برای جلوگیری از جداشگی مشیمیه پس از عمل جراحی RD، از استرووید داخل سیاهرگی استفاده نمودند و نتایج مشیت آناتومیک و بهبود دید نهایی را گزارش کردند. Sharma و Gopal<sup>۱۲ و ۱۴</sup> در مطالعات دیگری همین تجربه را با کورتون خوراکی در بیمارانی که قبل از عمل، تحت ویترکتومی اولیه قرار گرفته بودند؛ ارایه نمودند. در مطالعه ما که دارای گروه شاهد با تجویز دارونما بود و بروز چندین عارضه مدنظر قرار گرفت؛ تفاوت معنی‌داری بین دو گروه دیده نشد.
- بیماران مورد بررسی در مطالعه ما، فاقد عوامل و شرایطی بودند که نتایج جراحی باکلینگ صلبیه را به مخاطره می‌اندازد؛ یعنی پیامدها و عوارض ذکر شده جراحی در این بیماران، به مراتب کمتر بود. مطالعه ما نشان داد که مصرف کوتاه‌مدت استرووید خوراکی پس از عمل، در کاهش میزان PVR و CME و
- 1- Williams GA, Aaberg TM. Techniques of scleral buckling. In: Ryan SJ. Retina. 3rd ed. St. Louis, Mosby; 2001: 1961-2035.
  - 2- Packer A, Maggiano JM, Aaberg TM, Meridith TA, Reeser FH, Kingham JD. Serous choroidal detachment after retinal detachment surgery. *Arch Ophthalmol* 1983;101:1221-1224.
  - 3- Miyake K, Miyake Y, Maexubo X, Asakora M, Manabe R. Incidence of cystoid macular edema after retinal detachment surgery and the use of topical indomethacin. *Am J Ophthalmol* 1986;95:451-456.
  - 4- Meridith TA, Reserf H, Topping TM, Aaberg TM. Cystoid macular edema after retinal detachment surgery. *Ophthalmology* 1980;87:1090-1095.
  - 5- Ackerman AL, Tpillow H. Reduced incidence of cystoid macular edema, following retinal detachment surgery using diathermy. *Ophthalmology* 1985;92:1092-1095.
  - 6- Rubsamen PE, Flynn HW, Civantos JM, Smiddy WE, Murray TG, Nicholson DH, et al.

- Treatment of massive subretinal hemorrhage from complication of scleral buckling procedure. *Am J Ophthalmol* 1994; 118:299-303.
- 7- Rachal WF, Burton TC. Changing concepts of failure after retinal detachment surgery. *Arch Ophthalmol* 1979; 97:480-843.
- 8- Jonas JB, Hayler JK, Jonas SP. Intravitreal injection of crystalline cortisone as adjunctive treatment of proliferative vitreoretinopathy. *Br J Ophthalmol* 2000; 84:1064-1067.
- 9- Peymen GA, Schulman JA. Intravitreal surgery: principles and practice. 2nd ed. Appleton and Lange, Norwalk, CT; 1994:923-950.
- 10- Tano Y, Sugita G, Abrams O, Machemer R. Inhibition of intraocular proliferation with intravitreal corticosteroids. *Am J Ophthalmol* 1980; 89:131-136.
- 11- Valone J, Moser D. Management of rhegmatogenous retinal detachment with macular detachment, steroid, choroidal detachment and acuity. *Ophthalmology* 1980; 93:1413-1417.
- 12- American Academy of Ophthalmology. Rheumatic disorders. In: Basic and Clinical Science Course. Section 1, update on general medicine. San Francisco: LEO; 2000-2001: 151-152.
- 13- Sharma T, Gopal L, Badrinath SS. Primary vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment associated with choroidal detachment. *Ophthalmology* 1998; 105:2282-2285.
- 14- Sharma T, Gopal L, Reddy RK, Kasinathan N, Shah NA, Sulochana KN, et al. Primary vitrectomy for combined rhegmatogenous retinal detachment and choroidal detachment with or without oral corticosteroids: a pilot study. *Retina* 2005; 25:152-157.
- 15- Foster CS. Topical steroid treatment of ocular inflammation. *Ophthalmol Clin North Am* 1997; 3:389-403.
- 16- Vitale AT, Foster CS. Corticosteroids. In: Foster CS, Vitale AT. Diagnosis and treatment of uveitis. 1st ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 2002: 142-157.
- 17- Gardner TW, Antonetti DA, Barber AJ, La Noue KF, Leviston SW, The Penn State Retina Research Group. Diabetic retinopathy: more than meets the eye. *Surv Ophthalmol* 2002; 47(suppl. 2): S253-S262.
- ۱۸- علیزاده قویدل لیلا، کوهستانی نسیم، سهیلیان مسعود. مصرف روزافزون کورتیکواستروییدها در چشمپزشکی. مجله چشمپزشکی بینا؛ ۱۳۸۳؛ سال ۹، شماره ۳، ۲۶۱-۲۸۲.
- 19- Hartnett ME. Primary rhegmatogenous retinal detachment. In: Schepens CL, Hartnett ME, Hirose T. *Retinal Detachment and allied diseases*. 2nd ed. Boston: Butterworth-Heinemann; 2000: 322-323.