

بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد تشنجی عصاره آبی گیاه آکلیل کوهی و فنوباریتال در موش سفید آزمایشگاهی

محمد طاهر بروشکی^{۱*} (Ph.D)، فرهاد ملک^۲ (M.D)، ابوالقاسم بهارلو (M.D)

۱-دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، بخش فارماکولوژی

۲-دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه طب داخلی

خلاصه

سابقه و هدف: با توجه به مزمن بودن بیماری‌های تشنجی و مصرف طولانی مدت داروهای ضد تشنج و همچنین عوارض فراوان این داروها، اخیراً استفاده از گیاهان دارویی جهت کنترل حملات تشنجی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گیاه آکلیل کوهی (*Rosmarinus officinalis*) در کنترل تشنجات ناشی از پتیلن ترازاول در موش سفید آزمایشگاهی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: مقادیر متفاوتی از عصاره آبی گیاه آکلیل کوهی (۱۲ ml/kg، ۹، ۶، ۳) به گروه‌های مختلف موش به وزن ۲۵-۳۰ گرم به صورت داخل صفاتی (i.p.) تزریق گردید. گروه کنترل سرم فیزیولوژیک (۶ ml/kg) و گروه‌های شاهد فنوباریتال (۴۰ mg/kg، ۳۰، ۲۰، ۱۰) دریافت نمودند. در آزمون پتیلن ترازاول (۸۰ mg/kg, i.p.)، تغییرات رفتاری، زمان شروع تشنج، طول مدت تشنج و مرگ و میر ۲۴ ساعته در تمامی گروه‌ها ثبت گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهند که تمامی مقادیر عصاره گیاه موجب تأخیر در زمان شروع تشنج گردیده‌اند اما مؤثرترین مقدار عصاره ۱۲ ml/kg بود که قابل مقایسه با دوز ۳۰ mg/kg فنوباریتال می‌باشد. در مورد طول مدت تشنج به جز مقدار ۳ ml/kg عصاره، بقیه مقادیر نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری را نشان داده‌اند. در ارتباط با کاهش درصد مرگ و میر ۲۴ ساعته، در گروه شاهد هیچ‌گونه مرگ و میر مشاهده نگردید، در گروه کنترل ۴۵٪ و در گروه‌های مورد آزمایش با مقادیر ۱۲ mg/kg عصاره حدود ۱۰٪ مرگ و میر مشاهده گردید که بیانگر تأثیر گیاه مذکور در کاهش میزان مرگ و میر می‌باشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های فوق نشان می‌دهند که مقدار ۱۲ ml/kg عصاره آبی گیاه آکلیل کوهی اثرات قابل توجهی بر روی زمان شروع تشنج، طول مدت تشنج و درصد مرگ و میر ۲۴ ساعته دارا می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: آکلیل کوهی، پتیلن ترازاول، فنوباریتال، تشنج

آن دارای مصارف دارویی می‌باشد در طب قدیم، برای

این گیاه خواص درمانی متعددی مانند درمان ورم مفاصل، مدر، درمان اسهال و همچنین اثرات ضد تشنجی قائل بوده‌اند [۱]. تحقیقات متعددی در نقاط مختلف جهان بر روی اثرات درمانی این گیاه صورت گرفته که از آن جمله می‌توان اثرات مهار آزاد شدن

مقدمه

آکلیل کوهی (*Rosmarinus officinalis*) از قدیم‌الایام مورد شناسایی مردم بوده است. گیاهی است پایا، بسیار معطر و دارای ساقه‌های چوبی که به حالت خود رو در منطقه مدیترانه به خصوص نواحی ساحلی آن تا آسیای صغیر می‌روید. برگ و سرشاخه‌های گل دار

داروها. گیاه خشک شده آکلیل کوهی تهیه شده از شرکت کندلوس چالوس و آمپول فنوباریتال (۱۰۰ mg/ml) پنتیلن ترازوول (شرکت سیگما) در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.

روش تهیه عصاره گیاه آکلیل کوهی. برای تهیه عصاره این گیاه، ۱۰ گرم از پودر گیاه تام را در یک اrlen ریخته و با اضافه نمودن ۱۰۰ ml آب مقطر و مسدود نمودن دهانه آن با فویل الومینیوم، به مدت ۷۲ ساعت در دمای اتاق قرار دادیم. سپس عصاره بدست آمده را با پارچه‌ای تمیز صاف و در یخچال نگهداری نمودیم و در زمان آزمایش با غلظت مشخص استفاده شد.

گروه‌های آزمایشی. تمامی حیوانات به طور تصادفی و پس از تطابق با محیط، در گروه‌های مختلف (هر گروه ۲۰ موش) به شرح زیر قرار گرفتند:

۱ - گروه کنترل. این گروه ابتدا سرم فیزیولوژیک (۶ ml/kg) و بعد پنتیلن ترازوول دریافت نمود.

۲ - گروه‌های شاهد (۴ گروه). این گروه‌ها به ترتیب یکی از دوزهای (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ mg/kg) فنوباریتال و بعد پنتیلن ترازوول دریافت کردند.

۳ - گروه‌های مورد آزمایش (۴ گروه). این گروه‌ها به ترتیب یکی از دوزهای (۱۲ ml/kg) عصاره آبی آکلیل کوهی و متعاقب آن پنتیلن ترازوول دریافت نمودند. به همه گروه‌ها، ۴۵ دقیقه بعد از تزریق اولیه، ابتدا پنتیلن ترازوول (۸۰ mg/kg) به صورت داخل صفاتی تزریق و سپس زمان شروع تشنج (مرحله تونیک - کلونیک)، طول مدت تشنج، تعداد مرگ و میر ۲۴ ساعته در مورد تمامی آنها ثبت گردید [۲].

روش بررسی تشنج. در این بررسی علائم تشنج حاصله به طریق زیر تقسیم بندی گردیدند [۹]:

مرحله صفر (D_0): هیچ تشنجی مشاهده نگردید ولی حالت لرزش بدن یا تکان در گوش یا صورت دیده شد.

مرحله یک (D_1): انقباضات میوکلونیک، پرش (کنده شدن از زمین توسط چهار دست و پا)

مرحله دو (D_2): کلونوس پای جلو، بدون از دست دادن حالت تعادل، گرفتگی عضله گردن

انسولین و هیپرگلیسمیک این گیاه در خرگوش [۳]، اثرات ضد میکروبی جهت حفاظت مواد غذایی و ضد قارچی [۷، ۸، ۱۰]، جلوگیری از سمیت کبدی [۱۰] و اثرات ضد تومور عصاره متابولی این گیاه را بر روی موش ذکر نمود [۵].

حدود ۱٪ از جمعیت جهان مبتلا به بیماری‌های تشنجی می‌باشد که پس از سکته‌های مغزی، دومین علت شایع بیماری‌های نوروولوژیک می‌باشد. با درمان استاندارد حدود ۸۰٪ از بیماران کنترل می‌شوند ولی با این وجود میلیون‌ها نفر در سراسر جهان دچار صرع غیر قابل کنترل هستند [۶]. قبل از کشف داروهای ضد تشنج، درمان بیماران صرعی شامل سوراخ کردن جمجمه (Cupping)، حجامت (Trehphining) و استفاده از داروهای گیاهی و حیوانی بوده است. در سال ۱۸۵۷ برای اولین بار برومور پتابسیم در درمان صرع به کار رفت، سپس در سال ۱۹۱۲ فنوباریتال، به عنوان اولین داروی رسمی، جهت درمان حملات تشنجی وارد بازار مصرف گردید [۶].

با توجه به مزمن بودن بیماری‌های تشنجی و مصرف طولانی مدت داروهای ضد تشنج و همچنین عوارض فراوان این داروها، استفاده از گیاهان دارویی جهت کنترل حملات تشنجی اخیراً مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گیاه آکلیل کوهی (*Rosmarinus officinalis*) در کنترل تشنجات ناشی از پنتیلن ترازوول و مقایسه آن با فنوباریتال بر روی موش سفید آزمایشگاهی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

حیوانات. موش سفید آزمایشگاهی به وزن ۲۵-۳۰ گرم و سن ۴-۶ هفته (اتاق حیوانات دانشکده پزشکی مشهد) در شرایط استاندارد دما ($23 \pm 1^\circ\text{C}$)، نور (۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی) نگهداری شدند و آب و غذا (شرکت جوانه خراسان) آزادانه در اختیار حیوانات بود.

در جدول ۲ نشان داده شده است. در این گروه میزان مرگ و میر حدود ۴۵٪ و میانگین طول دوره تونیک - کلونیک (D₄) $0/43 \pm 14/8$ ثانیه می باشد.

۳ - اثرات ضد تشنجی فنوباریتال نیز در جدول ۲ نشان داده شده است. تمامی مقادیر فنوباریتال، به جز دوز ۱۰ mg/kg از نظر میزان مهار تشنجات با گروه کنترل اختلافی معنی دار داشتند ($p < 0.001$). تمام مقادیر فنوباریتال علاوه بر محافظت کامل حیوانات در برابر مرگ و میر، طول دوره تشنج را نیز در گروه های شاهد کاهش داده اند که اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان می دهد ($p < 0.01$) برای دوز ۱۰ mg/kg و ($p < 0.001$) برای سایر دوزها).

۴ - اثرات ضد تشنجی عصاره آبی گیاه اکلیل کوهی نیز در جدول ۲ نشان مشاهده می شود. تمامی مقادیر عصاره، به جز دوز ۳ ml/kg از نظر درصد مهار تشنجات ($p < 0.05$) برای دوز ۶ ml/kg و ($p < 0.001$) برای سایر مقادیر) طول مدت تشنج ($p < 0.001$) و همچنین درصد مرگ و میر با گروه کنترل اختلاف معنی داری داشتند.

مرحله سه (D₃): کلونیک شدید، با از دست دادن حالت تعادل

مرحله چهار (D₄): تشنج تونیک - کلونیک همراه با کشیدگی شدید بدن آنالیز آماری. تمامی تایع به صورت میانگین \pm خطای معیار بیان شده اند. برای مقایسه آنها از آنالیز واریانس یک طرفه و تست استفاده به عمل آمد. مقادیر $p < 0.05$ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شده است.

نتایج

۱ - جدول ۱ زمان شروع تشنج را در گروه های مختلف حیوانات نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود عصاره آبی گیاه توانسته است زمان شروع تشنج را از ۹ دقیقه (گروه کنترل) به ۱۲-۱۷ دقیقه برساند که از لحاظ آماری فقط با مقدار ۱۲ ml/kg عصاره معنی دار می باشد ($p < 0.01$). زمان شروع تشنج با دوزهای ۳۰ و ۲۰ mg/kg می باشد.

۲ - اثرات تشنج زایی پنتیلن ترازوول در گروه کنترل

جدول ۱. زمان شروع تشنج در حیوانات مورد آزمایش با مقادیر مختلف فنوباریتال و عصاره آبی گیاه اکلیل کوهی

گروه		متوسط زمان شروع تشنج (دقیقه)	انحراف معیار
کنترل		۸/۱۲	۰/۰۷
فنوباریتال	۱۰ mg/kg	۸/۵۶	۰/۱۴
فنوباریتال	۲۰ mg/kg	۱۲/۱۶	۰/۱۰
فنوباریتال	۳۰ mg/kg	۱۷/۱۵*	۰/۱۳
فنوباریتال	۴۰ mg/kg	۲۰/۶۹**	۰/۲۲
اکلیل کوهی kg	۳ml/kg	۸/۹	۰/۱۳
اکلیل کوهی kg	۶ml/kg	۹/۶۲	۰/۱۶
اکلیل کوهی kg	۹ml/kg	۱۱/۷۵	۰/۱۴
اکلیل کوهی kg	۱۲ml/kg	۱۶/۸۵*	۰/۱۷

* $P < 0.001$ و ** $P < 0.001$ در مقایسه با گروه کنترل

جدول ۲. اثرات ضد تشنجی فنوباربیتال و آکلیل کوهی

درو	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	تعداد مرحله	میانگین طول دوره تشنجه (ثانیه)	میانگین طول دوره تونیک کلونیک	درصد مهار تشنج	درصد مغیر	دانگین	درصد
۴۰	-	۰/۸۶±۰/۰۴	۱/۲۴±۰/۰۶	۱/۵۴±۰/۰۷	۱/۷۹±۰/۳۶	۶۱	۹/۰۸±۰/۳۶	۱۲/۸±۰/۴۳	۱۲/۲۱±۰/۷۴**	۹/۵۴ ^{NS}	-	۴۰
*	۰/۹±۰/۰۴	۰/۹±۰/۰۴	۱/۲۹±۰/۰۶	۱/۷±۰/۰۶	۱/۹۸±۰/۰۶	۴۶	۹/۹۵±۰/۴۶	۱۲/۲۱±۰/۷۴**	۹/۵۴ ^{NS}	*	فیزیولوژیک ۶ml/kg	*
*	۱/۰۹±۰/۰۷	۱/۰۹±۰/۰۷	۱/۵۰±۰/۰۷	۲/۳۰±۰/۰۶	۲/۷۸±۰/۰۸	۳۱	۱۳/۲۰±۰/۴۸	۱۰/۰۷±۰/۴۶***	۱۰/۰۷±۰/۴۶***	۴۷/۲۸***	*	فتوباربیتال ۱۰mg/kg
*	۱/۰۴±۰/۱۱	۱/۰۴±۰/۱۱	۲/۱۲±۰/۰۸	۲/۹۶±۰/۱۰	۳/۱۹±۰/۱۰	۲۷	۱۴/۱۰±۰/۰۸	۸/۱۰±۰/۳۳***	۸/۱۰±۰/۳۳***	۵۵/۷۸***	*	فتوباربیتال ۲۰mg/kg
*	۲/۵۰±۰/۱۰	۲/۵۰±۰/۱۰	۴/۳۲±۰/۰۲	۴/۱۲±۰/۰۸	۵/۹۳±۰/۱۲	۲۲	۲۲/۴۲±۰/۹۷	۷/۰۸±۰/۴۸***	۷/۰۸±۰/۴۸***	۱۴۶/۸۳***	*	فتوباربیتال ۴۰mg/kg
۴۰	۰/۸۷±۰/۰۷	۰/۸۹±۰/۰۶	۱/۲۷±۰/۰۷	۱/۶۳±۰/۰۶	۱/۹۲±۰/۰۶	۵۶	۹/۴۱±۰/۶۳	۱۴/۴۱±۰/۴۶ ^{NS}	۱۴/۴۱±۰/۴۶ ^{NS}	۳/۲۹ ^{NS}	۴۰	۴۰
*	۰/۸۹±۰/۰۶	۱/۲۹±۰/۰۶	۱/۴۹±۰/۰۶	۲/۱۷±۰/۰۸	۲/۸۳±۰/۷۱	۴۷	۱۰/۸۳±۰/۷۱	۱۱/۸۶±۰/۴۳***	۱۱/۲۲*	*	اکلیل کوهی ۶ml/kg	*
*	۱/۱۲±۰/۰۸	۱/۱۲±۰/۰۸	۱/۷۲±۰/۰۶	۲/۳۷±۰/۰۷	۲/۵۰±۰/۰۸	۴۵	۱۲/۸۷±۰/۶۲	۱۱/۲۰±۰/۴۳***	۴۰/۶۴***	*	اکلیل کوهی ۹ml/kg	*
*	۱/۴۹±۰/۰۷	۱/۴۹±۰/۰۷	۱/۸۶±۰/۰۶	۲/۵۷±۰/۰۷	۲/۸۱±۰/۰۶	۳۶	۱۶/۹۸±۰/۷۸	۹/۹۷±۰/۴۰***	۸۶/۹۷***	*	اکلیل کوهی ۱۲ml/kg	*

در همه گروه‌ها، ۴۵ دقیقه بعد از تزریق اول (سرم فیزیولوژیک یا فتوباربیتال یا اکلیل کوهی)، پنتیلن تترازول (۸۰ mg/kg) به صورت داخل صفاتی تزریق گردیده، سپس زمان شروع تشنج (مرحله تونیک - کلونیک)، طول مدت تشنج و تعداد مرگ و میر ۲۴ ساعته در مورد تمامی گروه‌ها ثبت گردید. (D₀): عدم مشاهده تشنج؛ (D₁): انقباضات میوکلونیک؛ (D₂): کلونوس پای جلو؛ (D₃): تشنجات کلونیک شدید و (D₄): تشنجات تونیک - کلونیک).

p < 0.01, n.s: no significant ** p < 0.05 *** p < 0.01 در مقایسه با گروه کنترل

قاطع صرع، منجر به معرفی یک داروی مؤثر برای این بیماری نشده است، بنابراین، پژوهش در این زمینه ادامه دارد. امروزه استفاده از عصاره‌های مختلف گیاهی که دارای سابقه کاربرد دیرینه در طب سنتی می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است که آکلیل کوهی یکی از همین گیاهان است و در طب سنتی ایران به اثرات ضد تشنجی آن اشاره شده است ولی تاکنون مطالعه علمی جهت

بحث

تشنجات رویدادهای زودگذر ناشی از اختلال عمل مغز محسوب می‌شوند که در اثر دشارژ غیرطبیعی نرونها مغزی رخ می‌دهند. با توجه به مزمن بودن بیماریهای تشنجی و مصرف طولانی مدت داروهای ضد تشنج و همچنین عوارض فراوان این داروها و از آنجاییکه تاکنون همه کوشش‌های انجام شده برای درمان

می باشد. در مورد درصد مرگ و میر، عصاره گیاه این میزان را از ۴۵ درصد (گروه کنترل) به ۱۰ درصد (با مقدار 12ml/kg عصاره) و ۳۰ درصد (با مقدار 9 ml/kg عصاره) تقلیل داده است (جدول ۲).

هیچ گونه مرگ و میری با دوزهای مختلف فنوباربیتال مشاهده نگردید. بالاخره این که عصاره گیاه تعداد تشنجات تونیک - کلونیک (مرحله D_4) را از ۶۱ مورد (گروه کنترل) به ۳۶ مورد با مقدار 12ml/kg کاهش داده است.

اگرچه در این مطالعه، شاهد کاهش درصد مرگ و میر گروه مورد آزمایش از ۴۵ درصد (3ml/kg) تا ۱۰ درصد (12ml/kg) عصاره بودیم ولی هیچ گاه اثر محافظتی گیاه با مقادیر حداکثر بکار برده شده در این آزمایش، برابر با حتی مقادیر پایین فنوباربیتال، نبوده است. هم چنان که در این مطالعه نشان داده شده است، با افزایش دوز عصاره از 3ml/kg به 12ml/kg ، اثرات محافظتی نیز بیشتر شده است. لذا این احتمال وجود دارد که با تجویز مقادیر بالاتر از عصاره گیاه شاهد اثرات محافظتی بیشتر نیز باشیم که قابل مقایسه با فنوباربیتال باشد. با توجه به تحقیقات مشابهی که بر روی این گیاه در فلسطین انجام گرفته است، از نظر میزان مهار تشنجات اثر مقدار 12ml/kg عصاره این گیاه در فلسطین با 12ml/kg عصاره در این بررسی قابل مقایسه و برابر است که بیانگر تأثیر شرایط اقلیمی (آب و هوا، ارتفاع و pH خاک) در میزان ماده موثره در این گیاه و در مناطق مختلف می باشد. مقدار 6 ml/kg عصاره این گیاه در فلسطین حدود ۲۰ درصد مرگ و میر نشان داده است [۲].

از آنجائی که داروهای مهارکننده تشنج با مکانیسم‌های متعددی از قبیل افزایش آستانه تحریک سورونها، افزایش فعالیت رسپتورهای گابا و تغییر ترانسپورت یونی از غشاها تحریک پذیر عصبی، اثر خود را اعمال می کنند، لذا می توان مکانیسم اثر عصاره گیاه آکلیل کوهی را به یک یا چند مورد از مکانیسم‌های فوق نسبت داد. این ایده با نتایج حاصل از تحقیقات

بررسی اثرات گیاه فوق در این خصوص به عمل نیامده است. لذا هدف این تحقیق بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گیاه آکلیل کوهی در کنترل تشنجات تجربی ایجاد شده، ناشی از تزریق پنتیلن ترازوول بر روی موش سفید آزمایشگاهی و مقایسه آن با فنوباربیتال می باشد.

در این مطالعه از بین روش‌های مختلف القاء تشنج (الکتروشوك، شیمیایی و صوت)، روش شیمیایی به دلیل قابل دسترس بودن و این که تغییرات رفتاری مشهودی ایجاد می کند انتخاب گردید [۶]. نتایج نشان می دهد که عصاره آبی گیاه آکلیل کوهی با مقادیر 12ml/kg و 9 ml/kg دارای اثربخشی خوبی بوده و موجب تأخیر در شروع تشنج و کاهش طول دوره تشنج و میزان مرگ و میر می شود که با دوزهای 20 mg/kg و 30 mg/kg فنوباربیتال قابل مقایسه می باشد.

عصاره گیاه توانسته است زمان شروع تشنج را از ۹ دقیقه (گروه کنترل) به $12-17$ دقیقه برساند که از لحاظ آماری فقط با مقدار 12ml/kg عصاره معنی دار می باشد.

زمان شروع تشنج با دوزهای 20 و 30 ml/kg فنوباربیتال نیز حدود $12-17$ دقیقه می باشد (جدول ۱). گرچه زمان شروع تشنج در گروه‌های مورد آزمایش 12ml/kg و 9 ml/kg عصاره آکلیل (و شاهد) (جدول ۱) فنوباربیتال برابر می باشد ولی از نظر تعداد حملات تشنجی تونیک - کلونیک در مرحله D_0 مقدار 12ml/kg عصاره اثربخشی معادل 10mg/kg فنوباربیتال را دارا می باشد که بیانگر قدرت اثر کمتر این مقادیر از عصاره در مقایسه با مقادیر $20-30\text{ mg/kg}$ فنوباربیتال می باشد.

در مورد طول مدت تشنج (تونیک - کلونیک)، عصاره گیاه با دوز 12ml/kg ، این زمان را از $0/43 \pm 0/40$ ثانیه (گروه کنترل) به $0/40 \pm 0/97$ ثانیه کاهش داده است. این زمان در مورد مقادیر 20 و 30 mg/kg فنوباربیتال به ترتیب $0/33 \pm 0/00$ و $0/46 \pm 0/05$ ثانیه می باشد (جدول ۲) که بیانگر قابل مقایسه بودن اثرات این گیاه با فنوباربیتال می باشد. به این معنی که قدرت اثر 12ml/kg عصاره از نظر کاهش طول مدت تشنج تقریباً برابر با مقدار 20 mg/kg فنوباربیتال

- T. and Lov, Y.R., Skin tumorigenesis by Rosmary and its constituents carnosil and ursolic acid, *Cancer Res.*, 54 (1994) 701-708.
- [6] Katzung, B.G., Basic and clinical pharmacology, 8th edition, Mc Graw-Hill, New York, 2001.
- [7] Panizzi, L., Flamini, G., Cioni, P.L. and Morelli, I. Composition and antimicrobial properties of essential oils of four Meditranian Lamiaceae, *J. Ethnopharm.*, 39 (1993) 167-70.
- [8] Pizzocaro, F., Senesi, E. and Babbini, G. Protective effect of fresh Rosemary and sage on frozen beefhamburgers, *Pinerollo.*, 33 (1994) 289-294.
- [9] Rosenberg, H.C., Tiets, I. and Ted, H.. Differential tolerance to the antipenthylentetrazol activity of benzodiazepines in flurazepam treated rats, *Pharmacol., Biochem. Behav.*, 39 (1991) 712.
- [10] Shibuya, Y., Cohinata, H., Yonei, Y., Ono, T. and Susuki, J. Preparation of carnosol as antimicroibial agents for food preservation, *Pharmacol. Appl.*, 92 (1994) 221.

دیگران مبنی بر این که تزریق داخل صفاقی عصاره آبی درصد این گیاه مقدار گابا در کورتکس مغز را افزایش می دهد، تقویت می شود [۲]. ولی این که کدام ماده موجود در عصاره این گیاه باعث چنین عملی می شود ناشناخته بوده و نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

منابع

- [۱] زرگری، ع.، گیاهان دارویی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۷۱-۷۵.
- [2] Abdul-ghani, A.S., EI-Lati, S.G., Sacaun, A.I., Suleiman, M.S. and Amin, R.M., Anticonvulsant effects of some arab medicinal plants, *Int. J. Crud Drug Res.*, 25 (1987) 39-43.
- [3] Al-Hadar, A.A., Hasan, Z.A. and Aqel, M.B., Hyperglycemic and insulin release inhibitory effects of Rosmarinus, *J. Ethnopharmacol.*, 43 (1994) 217-221.
- [4] Concepcion-Navaro, M., Pilar-Montilla, M., Martin, A., Jimenez, J. and Pilar-Utrilla , M., Free radical scavengers and antihepatotoxic activity of Rosmarinus officinalis, *Planta Med.*, 56 (1993) 312-314.
- [5] Hung, M.T., Ho, C.T., Wang , Z.Y., Ferraro,