

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوره ۲۷ شماره ۳ پاییز ۱۳۸۴ صفحات ۷۸-۷۵

ارتباط بین c-erb B-2 و درگیری گره های لنفاوی در سرطان پستان

دکتر اشرف فخرجو: دانشیار گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ نویسنده رابط

E-mail : a_fakhr_ir@yahoo.com

دکتر محمود طاهری: دستیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
احمدآزاده: مربی آمار کاربردی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دریافت: ۸۳/۷/۶، بازنگری نهایی: ۸۳/۱۱/۹، پذیرش: ۸۳/۱۲/۵

چکیده

زمینه و اهداف: درگیری گره های لنفاوی مهمترین عامل پروگنوستیک در سرطان پستان می باشد و در انتخاب نوع درمان سیستمیک مهم است. آگاهی از درگیری یا عدم درگیری گره های لنفاوی مستلزم تشریح گره های لنفاوی زیر بغل است. c-erb B-2 یک انکوپروتئین غشایی است که HER2/neu نامیده میشود و اساساً در سرطان پستان بروز می کند ولی الزاماً در همه ی موارد سرطان پستان دیده نمیشود.

می خواهیم ببینیم بین درگیری گره های لنفاوی زیر بغل و مثبت شدن c-erb B-2 ارتباطی وجود دارد؟ اگر ارتباطی وجود دارد؛ می توان از آن بعنوان یک مارکر بیولوژیک برای پی بردن به وضعیت گره های لنفاوی و تعیین پروگنوز استفاده کرد، قبل از آنکه احتیاج به تشریح گره های لنفاوی زیر بغل باشد.

روش بررسی: در این تحقیق روی ۹۰ مورد سرطان پستان بلوکهای پارافینی تهیه و رنگ آمیزی ایمونو هیستوشیمی برای انکوپروتئین c-erb B-2 با روش Biotin-Avidin Peroxidase Complex صورت گرفت و نتایج با و استفاده از آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: از ۹۰ مورد، ۸۵ مورد (۹۴/۴٪) سرطان داکتال مهاجم، ۲ مورد (۲/۲٪) سرطان لوبولر مهاجم، ۲ مورد (۲/۲٪) سرطان موسینی و ۱ مورد (۱/۱٪) سرطان نوع مدولری بودند. از میان ۹۰ مورد، در ۵۴ مورد ماستکتومی همراه با تشریح گره لنفاوی زیر بغل وجود داشت که ۳۹ مورد درگیری گره لنفاوی داشتند و ۱۵ مورد نداشتند. کلاً ۴۰٪ موارد برای c-erb B-2 مثبت بودند. بین بالا بودن درجه بدخیمی و مثبت شدن c-erb B-2 ارتباط مستقیم وجود داشت (P = ۰/۰۴۱). بین درگیری غدد لنفاوی و یا تعداد گره های لنفاوی درگیر و c-erb B-2 ارتباط معنی داری وجود نداشت (P = ۰/۹۸).

نتیجه گیری: ارتباطی بین درگیری گره های لنفاوی و مثبت شدن c-erb B-2 وجود ندارد و نمی توان از آن به عنوان یک مارکر بیولوژیک برای تعیین درگیری گره های لنفاوی استفاده کرد. لذا در تعیین پروگنوز و تصمیم گیری برای شروع یا عدم شروع درمان سیستمیک جایگزین تشریح گره های لنفاوی زیر بغل نمی باشد. مثبت بودن پروتئین c-erb B-2 صرفاً یک عامل پروگنوستیکی و انتخاب پروتکل درمانی خاصی را شامل نمیشود.

کلید واژه ها: سرطان پستان، c-erb B-2، درگیری گره لنفاوی، ایمونو هیستوشیمی

مقدمه

ولگی به نظر می رسد در آنهایی که این انکو پروتئین با درجه تومور ارتباط نزدیکی دارد (۲ و ۳)، و در سرطانهایی که c-erb B-2 مثبت دارند، درگیری گره های لنفاوی بعنوان مهمترین فاکتور پروگنوستیک می باشد (۱ و ۲ و ۴). مثبت شدن c-erb B-2 روی بقاء و انتخاب نوع درمان سیستمیک مؤثر است و تعداد گره های لنفاوی دیگر نیز در پروگنوز و انتخاب روش درمان مؤثر می باشد. یکی از روشهای درمانی گره های لنفاوی درگیر، دادن اشعه است (۱).

مواد و روش ها

مطالعه ما یک مطالعه مقطعی - تحلیلی می باشد که روی ۹۰ مورد سرطان پستان (بیوپسی و ماستکتومی) که از مهرماه ۸۱ لغایت آبان ۸۲

سرطان پستان شایعترین سرطان در خانمها است و مشکلات فراوان و مرگ و میر زیادی را بدنبال دارد (۱). دانشمندان سعی کرده اند عواملی را که در پروگنوز و درمان این سرطان نقش دارد شناسایی کنند. از عوامل مهم در پروگنوز این بیماران درجه میکروسکوپی و درگیری گره های لنفاوی می باشد.

c-erb B-2 یا HER2/neu یک انکوپروتئین غشایی ۱۸۵ کیلو دالتونی را کد می کند که مرتبط با خانواده تیروزین کیناز بوده و اساساً در سرطان پستان بروز می کند، ولی در سایر تومورها مثل تخمدان نیز دیده می شود. ژن آن روی کروموزوم ۱۷q قرار دارد. در مورد نقش این انکوژن بعنوان یک عامل پروگنوستیک اختلاف نظر وجود دارد.

۶۰ / ارتباط بین B-2-erb c و درگیری گره های...

۲۶	۹	۱۰	۷	مثبت
%۱۶۶۵	%۱۸۵	%۱۳		
۵۶	۱۸	۳۸۹	۱۵	جمع
%۱۰۰	%۳۳۳	۳۸۹	۲۷/۸	

p=۰/۹۸

بحث

است و مثبت شدن c-erb B-2 با درجه ارتباط قوی دارد و مثبت شدن آن در داخل پارامتر درجه نهفته است (۱۲).

Christopher و همکاران با مطالعه ۱۸۵ مورد سرطان پستان و انجام IHC برای c-erb B-2 و پیگیری ۶۰ ماهه آنها نشان دادند، درگیری گره های لنفاوی مهمترین عامل پروگنوستیک است و مثبت شدن c-erb B-2 با منفی بودن رسیپتور ER و درجه ارتباط دارد ولی با گره های لنفاوی ارتباط ندارد. در ضمن آنها نتیجه گرفتند که c-erb B-2 یک عامل پروگنوستیک مستقل در پروگنوز سرطان پستان است. (۱۳)

در مطالعه‌ای که Silverstein و همکاران روی ۲۲۸۲ بیمار با سرطان پستان و تشریح گره های زیر بغل انجام دادند یازده پارامتر بالینی و پاتولوژیکی بررسی شد. مانند قابل لمس بودن تومور، تهاجم عروق خونی و لنفاتیک، درجه تومور، رسیپتور استروژنی و پروژستونی، سن، HER2/neu، نوع هیستولوژی، پلوییدی و TNM staging.

از بین اینها، چهارتای آنها شامل:

۱- درگیری عروق خونی و لنفاتیک

۲- اندازه تومور (بالتر یا کوچکتر از ۱۵ میلی متر)

۳- Nuclear grade (درجه هسته‌ای)

۴- قابل لمس بودن تومور

بعنوان فاکتورهای مستقل برای درگیری گره های لنفاوی تشخیص داده شد و HER2/neu یا همان c-erb B-2 جزو آنها نبود. از این چهار پارامتر می توان برای یافتن ریسک درگیری گره های لنفاوی و در نتیجه انتخاب روش درمان مناسب استفاده کرد. در تومورهایی که قابل لمس نیستند اگر بقیه سه عامل منفی باشد شانس متاستاز به عقده های لنفاوی ۰/۰۳ و اگر هر یک از سه تای دیگر به تنهایی باشد شانس متاستاز ۶٪ است (۴).

Hartmann و همکاران بین میزان درگیری گره های لنفاوی و میزان مثبت شدن c-erb B-2 ارتباطی پیدا کرده اند. (۵) ولی دیگر محققان نتوانسته اند چنین ارتباطی را پیدا کنند (۶، ۷ و ۸) و در بعضی از مطالعات یک ارتباط معکوس بین مثبت شدن c-erb B-2 و مثبت شدن رسیپتور استروژن پیدا کرده اند. (۹) و چندین روش برای تعیین بروز c-erb B-2 در سرطان وجود دارد که شامل ۴ مورد زیر است: RNA (Northern) blotting، DNA (Southern) hybridization، Immunoblotting (Western)، روش دیگر رنگ آمیزی ایمونوهیستو شیمیایی می باشد که می تواند آشکار شدن مستقیم آنکو پروتئین و محل آن را نشان می دهد و ارتباط نزدیک و خوبی بین این روشها وجود دارد (۵).

نتیجه گیری

در این تحقیق با توجه به اینکه ارتباطی بین درگیری گره های لنفاوی و مثبت شدن c-erb B-2 وجود ندارد و نمی توان از آن بعنوان یک مارکر بیولوژیکی برای تعیین درگیری گره های لنفاوی استفاده کرد، بنابراین از درخواست آزمایش c-erb B-2 که آزمایش نسبتاً

با توجه به نتایج بدست آمده ارتباط معنی داری بین درگیری گره های لنفاوی و مثبت شدن c-erb B-2 وجود نداشت (۰/۹۸). ولی با درجه تومور ارتباط داشت (۰/۴۱). در اکثر مطالعات دیگر نیز چنین نتیجه ای بدست آمده است.

Hartmann و همکاران با مطالعه روی ۳۵۴ بیمار با درگیری گره های لنفاوی به این نتیجه رسیدند که ارتباطی بین درجات درگیری گره های لنفاوی و مثبت شدن c-erb B-2 وجود ندارد (P=0.001) ولی شدت رنگ آمیزی، با درجه هسته ای و منفی بودن گیرنده ای استروژنی یک ارتباط معنی دار دارد (۶).

Rosen و همکاران با مطالعه ۴۴۰ بیمار با سرطان پستان و بدون درگیری گره های لنفاوی به این نتیجه رسیدند که c-erb B-2 ارزش پروگنوستیک ندارد (۷).

Hayes و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که c-erb B-2 یک مارکر بالینی مفید برای انتخاب روش درمان می باشد و به نظر می رسد که c-erb B-2 یک فاکتور پروگنوستیک ضعیف می باشد. هنگامی که شیمی درمانی Adjuvant مطرح است. افرادی که c-erb B-2 مثبت دارند از داروهای anthracycline بیشتر سود می برند و در آنهایی که متاستاز داده اند و c-erb B-2 مثبت است، استفاده از آنتی بادی anti c-erb B-2 یعنی trastuzamb حیاتی است (۸).

Hendriks و همکاران روی ۲۱۱ مورد سرطان پستان که حدود ۱۶ سال دنبال و پیگیری شدند ملاحظه کردند که در مطالعه Univariant در افرادی که گره های لنفاوی درگیر است، مثبت شدن c-erb B-2 ارزش پروگنوستیک دارد و آنهایی که گره های لنفاوی گرفتار ندارند، ارزش پروگنوستیک ندارند. ولی در مطالعه مولتی واریانت این مسئله مشاهده نشد و این ارتباط قوی نبود (۹).

Rilke و همکاران هم در مطالعه ای روی ۱۲۱۰ مورد سرطان پستان که ۱۹ سال آنها را پیگیری کردند چند پارامتر را بررسی نمودند مانند اندازه تومور و درگیری گره های لنفاوی، درجه تومور و انفیلتراسیون لنفوسیتی. آنها به این نتیجه رسیدند که c-erb B-2 روی پروگنوز آنها که درگیری گره های لنفاوی دارند، مؤثر بوده و پروگنوز آنها بدتر می باشد ولی در آنها که گره های لنفاوی درگیر نبود چنین ارتباطی وجود نداشت. ضمناً مثبت شدن c-erb B-2 بستگی به اندازه تومور - درجه آن و میزان التهاب داشت ولی ارتباطی با گره های لنفاوی نداشت (۱۰).

در یک مطالعه توسط Jeffrey و همکاران، بصورت مرور مقالات، ۵۲ مقاله که روی هم ۱۶۰۰۰ بیمار می شد، بررسی شد. آنها به این نتیجه رسیدند که ارزش پروگنوستیک c-erb B-2 مورد بحث است ولی در پاسخ به درمان مناسب است و آنها که مثبت می شوند به درمان مقاوم تر هستند. ضمناً مثبت شدن c-erb B-2 بطور مستقل ارتباطی با درگیری گره های لنفاوی نداشت ولی بصورت مولتی واریانت مرتبط بود (۱۱).

در مطالعه Tsuda و همکاران روی ۱۷۶ مورد سرطان پستان، نتیجه گرفتند که درگیری گره های لنفاوی و درجه روی پروگنوز مؤثر

را بررسی کرده و بتواند برای شروع یا عدم شروع درمان سیستمیک تصمیم بگیرد. ولی لازم به ذکر است که چنانچه تصمیم به شروع درمان سیستمیک گرفته شد از c-erb B-2 می توان برای انتخاب روش درمان Adjuvant مانند Anthracycline و Transtuzamb استفاده مفید کرد.

تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدر دانی خود را از جناب آقای دکتر ابراهیم نژاد، آقای اکبری و آقای اسفنجانی به خاطر همکاری در کارهای تکنیکی (برش بلوکهای پارافینی و رنگ آمیزی) ابراز می دارند.

گرانی می باشد برای بررسی پروگنوز و پیشگویی درگیری گره های لنفاوی باید خودداری شود و بیشتر برای انتخاب نوع درمان سیستمیک این آزمایش درخواست گردد. در ضمن می توان روی مارکرهای دیگری مطالعه کرد تا شاید بتوان در آینده با توسل به آن درگیری گره های لنفاوی را تعیین کند که گامی بزرگ در کاهش آلام بیماران با جلوگیری از تشریح گره های لنفاوی زیر بغل می باشد.

پیشنهاد

با توجه به عدم ارتباط بین c-erb B-2 و درگیری گره لنفاوی، نمی توان از c-erb B-2 بعنوان یک مارکر بیولوژیکی برای پروگنوز و تعیین درگیری یا عدم درگیری گره لنفاوی استفاده کرد و همچنان جراح باید متوسل به تشریح گره لنفاوی زیر بغل شود تا بتواند پروگنوز

References

1. Cotran R, Kumar V, Collins T: *Robbins Pathologic Basis of Diseases*, sixth Edition. Saunders, Philadelphia. 1999; P: 1114-1115.
2. Rosai J. *Ackerman's surgical pathology*, volume 2, Ninth Edition. Mosby, St, Louis, Missouri. 2004: PP: 1819-1823.
3. Elise R, Raymond R, Jonathan L, Myles and Gary W: HER 2/neu Amplification in Breast cancer. *Am J clin pathol*. 2002; **117**: 916-921.
4. Silverstein MJ, Skinner KA, Lomis TJ. Predicting axillary nodal positivity in 2282 patient with breast carcinoma. *World J.surg*. 2001; **25**(6): 767-72.
5. Dabbs D. Diagnostic immunohistochemistry, Churchill Livingstone, USA. 2002; 551.
6. Hartmann L, Ingle J, Wold L, Farr G, Grill J. Prognostic value of c-erbB-2 overexpression in axillary lymph node positive breast cancer. *CANCER*. 1994; **74** (11): 2956-2963.
7. Rosen PP, Lesser ML, Arroyo CD, Milicent C, Patrick B, et al. A study of epidemiologic risk factors, histologic features and prognosis. *CANCER*. 1995; **75**(6): 1320-1326.
8. Hayes DF, Thor AD. c-erb B-2 in breast cancer. Development of a clinically useful marker. *oncol*. 2002; **29**(3):231-45.
9. Hendriks S, Eriksson ET, Falkmer UG, Lars -Erik R, Hemming J, Anders F, Auer GU. Prognostic significance of I.H.C c-erb B-2 proto-oncogen expression and nuclear DNA content in human breast cancer. *Europ. J. Surg.oncol*. 1992; **18**: 530-537.
10. Rilke F, Colnaghi MI, Cascinelli N, Andreola S, Baldini MT, Bufalino R, et al. Prognostic significance of HER-2/neu expression in breast cancer and its relationship to other prognostic factors. *Int. J. cancer*. 1991; **49**: 44-49.
11. Jeffrey S, Fletcher JA: HER-2/neu (c-erb B-2) gene and protein in breast cancer. *Am clin pathol*. 1999; **112**(suppl.1): 53-67.
12. Tsuda H, Hirohashi S, Shimosato Y, Hirota T, Tsugane S, Watanabe S, et al. Correlation between histologic grade of malignancy and copy number of c-erb B-2 gene in breast carcinoma. *CANCER*. 1990; **65**: 1797-1800.
13. Christopher W, Brian A, Stewart NJ, Sainsbury RC, John C, William J, et al. Expression of c-erbB-2 oncoprotein: A prognostic indicator in Human Breast cancer. *CANCER. reserch*. 1989; **49**: 2087-2090.

