

## دقت تشخیص روش‌های *Frozen section* و *Touch imprint* غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه

### چکیده

زمینه و هدف: با توجه به توصیه کمورادیوتراپی نئواجون neoadjuvant در بیماران مبتلا به متاستاز غدد لنفاوی مدیاستن (N<sub>2</sub>) در کانسر ریه نوع non-small cell stage III<sub>A</sub>) تشخیص درگیری این غدد قبل از توراکوتومی اهمیت زیادی می‌یابد. تشخیص این درگیری، حین مدیاستینوسکوپی یا توراکوسکوپی، توسط روش‌های touch imprint و frozen section، این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز به توراکوتومی این عمل در یک جلسه بیهوشی انجام شود. روش بررسی: این بررسی طی سال ۱۳۸۵ بر روی ۵۸ نمونه غده لنفاوی مدیاستن که از ۲۷ بیمار مبتلا به کانسر ریه به دست آمده بود انجام شد. پس از نصف کردن غده لنفاوی و تهییه لام سیتوولوژی از هر نیمه، هر دو نیمه غده لنفاوی جداگانه جهت فروزن سکشن و نهایتاً پاتولوژی permanent ارسال شد. یافته‌ها: در گزارش فروزن سکشن یک مورد و در سیتوولوژی، دو مورد منفی کاذب وجود داشت. هیچ موردی از مشتبه کاذب در این دو روش مشاهده نشد. به این شکل حساسیت، ویژگی و دقت فروزن سکشن به ترتیب ۹۵/۵٪، ۱۰۰٪ و ۹۸/۲٪ در مورد سیتوولوژی به ترتیب ۹۰/۹٪، ۱۰۰٪ و ۹۶/۴٪ به دست آمد. نتایج هر دو روش از هر جهت مشابه بود ( $p > 0.05$ ). نتیجه‌گیری: هر دو روش دقت بالایی در تعیین درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه دارند. در مراکزی که فروزن سکشن موجود نیست می‌توان به کمک روش ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر touch imprint درگیری این غدد لنفاوی را کشف کرد.

**کلمات کلیدی:** سیتوولوژی، فروزن سکشن، کانسر ریه، غدد لنفاوی.

انجام توراکوتومی برای رزکسیون ریه یا ارجاع جهت کمورادیوتراپی تصمیم‌گیری شوند.<sup>۷</sup> مدیاستینوسکوپی و توراکوسکوپی تحت بیهوشی عمومی انجام می‌شود و چون در موارد عدم درگیری غدد لنفاوی مدیاستن بیمار کاندید توراکوتومی می‌شود برای جلوگیری از دو بار بیهوشی عمومی از frozen section (FS) برای ارزیابی این غدد لنفاوی استفاده می‌شود.<sup>۸</sup> متأسفانه در بسیاری از مراکز سطح کشور امکانات FS وجود ندارد. لذا با توجه به تحقیقات زیادی که بر روی روش سیتوولوژی (TI) در تشخیص حین عمل غدد لنفاوی sentinel در کانسر پستان<sup>۹-۱۱</sup> و تحقیقات معدودی که در بررسی درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه انجام شده است،<sup>۱۲-۱۴</sup> تصمیم گرفته شد که دقت تشخیصی هر دو روش در مورد درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه بررسی شود. بدیهی است روش TI روشی ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر بوده نیاز به تجهیزات خاصی ندارد لذا در مراکز بیشتری قابل اجراست. در صورتی که دقت آن مشابه دقت FS باشد می‌توان آن را به صورت روتین به کار گرفت.

محمد بنازاده<sup>۱</sup>

غلامرضا مهاجری<sup>\*</sup>

نصرور جمالی زواره‌ای<sup>۲</sup>

۱. گروه جراحی توراکس

۲. گروه پاتولوژی

بیمارستان امام حمینی، دانشگاه علوم پزشکی

تهران

\* نویسنده مسئول: اصفهان، خیابان صفوی، بیمارستان الزهرا

(س)، دفتر گروه جراحی توراکس

تلفن: ۰۳۱۱-۶۲۵۵۵۵۵

email: gh\_Mohajeri@yahoo.com


### مقدمه

کانسر ریه (Lung cancer) یکی از بدخیمی‌های شایع به ویژه در مردان و شایع‌ترین علت مرگ ناشی از بدخیمی در بسیاری از کشورهای است. همانند سایر بدخیمی‌ها staging در تصمیم‌گیری درمانی و پیش‌آگهی این کانسر بسیار مهم است.<sup>۱</sup> در staging این کانسر یکی از مهم‌ترین عوامل که به ویژه در تصمیم‌گیری بر انجام یا عدم انجام رزکسیون ریه مؤثر است وضعیت درگیری غدد لنفاوی مدیاستن (N<sub>2</sub>) می‌باشد.<sup>۲</sup> اهمیت موضوع به ویژه با نتایج تشویق‌کننده کمورادیوتراپی نئواجون neoadjuvant (قبل از عمل) در stage III<sub>A</sub> که بیشتر بر مبنای کشف درگیری غدد لنفاوی N<sub>2</sub> می‌باشد دو چندان شده است.<sup>۳-۶</sup> لذا لازم است غدد لنفاوی بزرگ مدیاستن که در CT اسکن Positron Emission Tomography (PET) دیده شده‌اند توسط روش‌هایی نظیر مدیاستینوسکوپی و توراکوسکوپی نمونه‌برداری شوند و سپس براساس درگیری یا عدم درگیری و نیز محل آنها نسبت به


گزارش کارسینوم تمایز نیافته داشتند. کانسر در ریه چپ و مابقی در راست بود. بیشتر خدد لنفاوی از نواحی پاراترائال (ایستگاه ۴)، ساپ کارینال (ایستگاه ۷) و ساپ آنورتیک (ایستگاه ۵) به دست آمد. در دو بیمار از دو ایستگاه نمونه برداری انجام گرفت. در بررسی گزارشات، FS، یک مورد و TI، سه مورد جواب مشکوک در داشت که اینها از بررسی حذف شدند. تمام این موارد مشکوک در پاتولوژی نهایی پاسخ منفی داشتند. FS در بین ۲۲ پاسخ نهایی مثبت و ۳۵ منفی، فقط یک مورد منفی کاذب داشت و TI در بین ۲۲ پاسخ نهایی مثبت و ۳۳ منفی، فقط دو مورد منفی کاذب داشت. هیچگدام از دو روش موردي از مثبت کاذب نداشتند. به این شکل ارزش تشخیصی هر دو روش محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۱ آمده است. دو نما با بزرگنمایی متفاوت از یکی از لام‌های مثبت TI در شکل ۱ و یک نما از یکی از لام‌های منفی TI در شکل ۲ آمده است.

جدول-۱: ارزش تشخیصی دو روش **Frozen section** و **Touch imprint** در تعیین درگیری خدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه

P	Frozen section	Touch imprint	ارزش تشخیصی
.۰/۴۴	%۱/۷	%۵/۲	موارد مشکوک
	%۱/۰۰	%۱/۰۰	ارزش اخباری مثبت
.۰/۳۱	%۹۷/۲	%۹۴/۳	ارزش اخباری منفی
.۰/۲۶	%۹۵/۵	%۹۰/۹	حساسیت
	%۱/۰۰	%۱/۰۰	ویژگی
.۰/۴۱	%۹۸/۲	%۹۶/۴	دقت



شکل-۱: دو نما از سلول‌های متاستاز کانسر ریه در لام سیتوولوژی یک خدد لنفاوی مدیاستن با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر و ۴۰۰ برابر؛ رنگ‌آمیزی پاپانیکلا



شکل-۲: نمای لام سیتوولوژی یک خدد لنفاوی مدیاستن که فاقد سلول بدخیم است. بزرگنمایی ۴۰۰ برابر؛ رنگ‌آمیزی پاپانیکلا

## روش بررسی

این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی انجام شد و برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و آزمون مقایسه نسبت‌ها در نرم افزار SPSS ویراست ۱۱/۵ استفاده شد. با توجه به اینکه در این بررسی، بیماران سیر عادی درمان خود را طی می‌کردند و هیچ مداخله اضافی برای این بررسی روی بیماران انجام نشد، ملاحظه اخلاقی خاصی وجود نداشت. این تحقیق طی سال ۱۳۸۵ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران بر روی بیماران مبتلا به کانسر ریه که در بخش جراحی توراکس بستری شده بودند انجام شد. تمام بیماران مبتلا به کانسر ریه از نوع non-small cell که خدد لنفاوی بزرگ مدیاستن داشتند (بزرگتر از ۱۰mm در مقطع عرضی) وارد تحقیق شدند. طی روند معمول جراحی این بیماران خدد لنفاوی از طریق مدیاستینوسکوپی یا توراکوتومی به دست آمد. خدد لنفاوی از محل ناف به دو نیمه تقسیم می‌شد، TI از هر دو نیمه جداگانه تهیه می‌شد و سپس هر دو نیمه خدد لنفاوی به صورت جداگانه جهت **permanent** FS و پاتولوژی blind ارسال می‌شد. نتایج FS بلا فاصله، ولی نتایج TI بعداً به صورت گرفته می‌شد. لام‌ها در اتاق عمل بلا فاصله با الكل ۹۶ درجه فیکس شدند و بعداً با رنگ‌آمیزی پاپانیکلا بررسی شدند. نتایج FS و TI هر نیمه خدد لنفاوی به صورت جداگانه با نتیجه پاتولوژی permanent همان نیمه مقایسه شد. با توجه به اینکه در مدیاستینوسکوپی در بسیاری از موارد فقط بخشی از یک خدد لنفاوی جهت پاتولوژی ارسال می‌شود در این بررسی هر نیمه خدد لنفاوی به صورت یک نمونه غله لنفاوی وارد تحقیق شد. در بیمارانی که بیش از یک خدد لنفاوی بزرگ در مدیاستن داشتند همه آنها به صورت جداگانه و با مشخص کردن محل نمونه گیری جهت آزمایشگاه ارسال شدند.

## یافته‌ها

در کل ۵۸ نمونه غله لنفاوی از ۲۷ بیمار وارد بررسی شدند. بیماران ۲۵ نفر مرد و دو نفر زن بودند. سن متوسط بیماران ۵۶/۶ سال (طیف سنی ۴۲-۷۹) بود. سرفه (۰/۷۴/۱) و درد سینه (۰/۳۳/۳) شایع ترین شکایات بیماران بود و در رده‌های بعدی هموپیتیزی، تنگی نفس و سکسکه قرار داشت. در یک بیمار توده ریوی بی علامت بود و اتفاقی کشف شده بود. پاتولوژی توده ریوی در ۴۴/۵٪ موارد کارسینوم سلول ستگفرشی و در ۳۳/۳٪ آدنوکارسینوما بود. مابقی موارد،

این مورد، جایگزین FS هم کرد. هر چند در مورد روش TI در مواردی نظیر کانسر پستان و بررسی غدد لنفاوی sentinel بررسی زیادی شده است و همگی بر کارایی آن تأکید دارند.<sup>۹-۱۱</sup> ولی در مورد نقش آن در تعیین درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه بررسی چندانی انجام نگرفته است. در بررسی Clarke و همکاران حساسیت، ویژگی و دقت روش TI، در این مورد، به ترتیب ۹۶/۶٪، ۱۰۰٪ و ۹۹/۲٪ گزارش شده است و عنوان شده متوسط زمان گزارش FS یازده دقیقه است در حالی که در مورد TI، فقط دو دقیقه می‌باشد لذا نتیجه‌گیری کرده‌اند که این روش قابل جایگزینی بجای FS در تشخیص حین عمل درگیری غدد لنفاوی مدیاستن می‌باشد.<sup>۱۲</sup> در بررسی Okubo و همکاران که در سال ۲۰۰۴ انجام گرفته است به ترتیب ۹۵/۷٪ و ۹۹/۴٪ حساسیت و دقت روش TI، در این مورد، به ترتیب ۹۵/۷٪ و ۹۸/۸٪ گزارش شده است.<sup>۱۳</sup> در جدیدترین بررسی که در سال ۲۰۰۶ توسط Orki و همکاران انجام گرفته است، حساسیت، ویژگی و دقت روش TI به ترتیب ۹۳/۱٪، ۹۹/۵٪ و ۹۸/۸٪ گزارش شده است و در مقایسه با آن را روشنی دقیق، قابل اعتماد، ساده و سریع برای ارزیابی غدد لنفاوی مدیاستن عنوان کرده‌اند.<sup>۱۴</sup> نتیجه این که از روش TI می‌توان با دقت مشابه با FS به بررسی حین عمل درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه پرداخت و براساس آن بر انجام یا عدم انجام توراکوتومی در همان جلسه بیهوشی تصمیم‌گیری کرد.

## بحث

کشف متاستاز غدد لنفاوی مدیاستن (N<sub>2</sub>) در کانسر ریه نوع non-small cell بسیار مهم است.<sup>۳,۹</sup> بیماران N<sub>2</sub> در stage IIIA با جراحی اولیه با یا بدون کمورادیوتراپی (adjuvant) پیش‌آگهی بدی دارند. اخیراً کمورادیوتراپی نواجوان در این گروه از بیماران نتایج تشویق‌کننده‌ای داشته است.<sup>۴-۶</sup> لذا لازم است قبل از توراکوتومی بود و نبود درگیری این غدد لنفاوی تعیین شود تا در صورت درگیری، قبل از عمل، بیمار جهت کمورادیوتراپی نواجوان ارجاع شود و در صورت عدم درگیری تحت توراکوتومی قرار گیرد. اگر تعیین این درگیری با روش‌های پاتولوژی هیجان عمل، دقت بالا داشته باشد می‌توان در همان جلسه نمونه برداری که با بیهوشی عمومی انجام می‌شود نسبت به ادامه یا خاتمه عمل تصمیم‌گیری کرد. از لحاظ تئوریک TI می‌تواند بر FS مزایایی داشته باشد نظیر انجام سریع‌تر، هزینه کمتر، حفظ کل بافت برای پاتولوژی نهایی و دسترسی سریع‌تر. در بررسی حاضر دقت تشخیصی هر دو روش در تعیین درگیری غدد لنفاوی مدیاستن در کانسر ریه بسیار بالا است. نتایج این دو روش از نظر درصد موارد مشکوک، حساسیت، ویژگی و دقت مشابه است (p>0.05) به این ترتیب اگر هزینه کمتر، سرعت بیشتر و دسترسی وسیع‌تر روش سیتولوژی را بر آن اضافه نماییم می‌توان عنوان کرد روش TI نه تنها روشی مفید است بلکه می‌توان آن را در

## References

1. Shields TW. General Thoracic Surgery. 6th ed. Philadelphia: JB Lippincott, Williams & Wilkins; 2005.
2. Mountain CF. Revisions in the International System for Staging Lung Cancer. *Chest* 1997; 111: 1710-7.
3. Mountain CF, Dresler CM. Regional lymph node classification for lung cancer staging. *Chest* 1997; 111: 1718-23.
4. Albain KS. Induction chemotherapy with/without radiation followed by surgery in stage III non-small-cell lung cancer. *Oncology (Williston Park)* 1997; 11: 51-7.
5. Choi NC, Carey RW, Daly W, Mathisen D, Wain J, Wright C, et al. Potential impact on survival of improved tumor downstaging and resection rate by preoperative twice-daily radiation and concurrent chemotherapy in stage IIIA non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 1997; 15: 712-22.
6. Mathisen DJ, Wain JC, Wright C, Choi N, Carey R, Hilgenberg A, et al. Assessment of preoperative accelerated radiotherapy and chemotherapy in stage IIIA (N2) non-small-cell lung cancer. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1996; 111: 123-31.
7. Graeter TP, Hellwig O, Hoffmann K, Ukena D, Kirsch CM, Schafer HJ. Mediastinal lymph node staging in suspected lung cancer: Comparison of positron emission tomography with FDG and mediastinoscopy. *Ann Thorac Surg* 2003; 75:231-6.
8. Gephhardt GN, Rice TW. Utility of frozen-section evaluation of lymph nodes in the staging of bronchogenic carcinoma at mediastinoscopy and thoracotomy. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1990; 100: 853-9.
9. Menes TS, Tartter PI, Mizrachi H, Smith SR, Estabrook A. Touch preparation or frozen section for intraoperative detection of sentinel lymph node metastases from breast cancer. *Ann Surg Oncol* 2003; 10: 1166-70.
10. Brogi E, Torres-Matundan E, Tan LK, Cody HS 3rd. The results of frozen section, touch preparation, and cytological smear are comparable for intraoperative examination of sentinel lymph nodes: a study in 133 breast cancer patients. *Ann Surg Oncol* 2005; 12: 173-80.
11. Aihara T, Munakata S, Morino H, Takatsuka Y. Comparison of frozen section and touch imprint cytology for evaluation of sentinel lymph node metastasis in breast cancer. *Ann Surg Oncol* 2004; 11: 747-50.
12. Clarke MR, Landreneau RJ, Borochovitz D. Intraoperative imprint cytology for evaluation of mediastinal lymphadenopathy. *Ann Thorac Surg* 1994; 57: 1206-10.
13. Okubo K, Kato T, Hara A, Yoshimi N, Takeda K, Iwao F. Imprint cytology for detecting metastasis of lung cancer in mediastinal lymph nodes. *Ann Thorac Surg* 2004; 78: 1190-3.
14. Örki A, Tezel C, Kosar A, Ersev AA, Dudu C, Arman B. Feasibility of imprint cytology for evaluation of mediastinal lymph nodes in lung cancer. *Jpn J Clin Oncol* 2006; 36: 76-9.

## Diagnostic accuracy of touch imprint and frozen section analysis in mediastinal lymph node involvement: lung cancer patients

### Abstract

Bannazadeh M.<sup>1</sup>  
Mohajeri G R.<sup>1\*</sup>  
Jamali M.<sup>2</sup>

1- Department of thoracic  
surgery

2- Department of pathology

Imam Khomeini hospital, Tehran  
University of Medical Sciences

**Background:** It is well known that, at the time of the initial presentation of patients with non-small cell lung cancer, N-status is very important in accurate staging and avoiding inappropriate surgical procedures. Also, if mediastinal lymph node metastasis (N2) of non-small cell lung cancer (stage IIIA) is present, neoadjuvant (preoperative) chemoradiotherapy is indicated; therefore a quick and accurate N-status determination is critical before thoracotomy. We compared the usefulness and accuracy of touch imprint and frozen section analysis for this purpose.

**Methods:** During 2006, fifty eight mediastinal lymph node specimens from 27 patients with lung cancer were excised. After touch imprint preparation, half of each lymph node was sent for frozen section and finally permanent histology.

**Results:** Frozen section and touch imprint had only one and two false negative results, respectively, but neither had false positive reports. The sensitivity, specificity and accuracy of the frozen section evaluation was 95.5%, 100% and 98.2%, respectively, and those of touch imprint were, 90.9%, 100% and 96.4%. The differences in the sensitivity, specificity and accuracy between the two methods were not significant ( $p>0.05$ ).

**Conclusion:** Frozen section and touch imprint have similarly high accuracies for detecting mediastinal lymph node metastasis in lung cancer. However, since the touch imprint method is more rapid and simple, it maybe method of choice.

**Keywords:** Touch imprint, frozen section, lung cancer, lymph node.

\* Corresponding author: Dept. of  
thoracic surgery, AL-Zahra Hospital,  
Soffe St., Isfahan  
Tel: +98-311-6255555  
email: gh\_Mohajeri@yahoo.com