

اختلال انعقادی بعد از گزش عنکبوت در یک کودک شش ساله (گزارش موردي)

چکیده

زمینه و هدف: گزش عنکبوت در بیشتر دنیا گزارش شده است. اما در بعضی نواحی بهخصوص در مناطقی که مار یا عقرب سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، عنکبوت نقش مهمی نداشته و کمتر بیماری در اثر گزش عنکبوت به بیمارستان مراجعه می‌کند. معرفی بیمار: در این مقاله کودک شش ساله‌ای معرفی می‌شود که دو هفته پس از گزش عنکبوت با خونریزی شدید از بینی و لثه و اکیموزهای فراوان در روی بدن بهخصوص اندام‌ها به بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر ارجاع داده شد. نکات جالب توجه در ارزیابی آزمایشگاهی مقادیر فیرینتوژن در حد صفر میلی‌گرم درصد می‌باشد، PT و PTT می‌باشد شدیداً افزایش یافته، پلاکت و سطح فاکتور VIII نرمال می‌باشد. برای بیمار درمان پلاسمای ۱۲ ساعت شروع شد. یک هفته پس از درمان بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد. یک ماه پس از تاریخیستهای انعقادی در مقادیر نرمال بود. نتیجه‌گیری: گزش عنکبوت می‌تواند با عوارض شدید مثل آنمی همولیتیک، نارسایی کلیه و اختلال انعقادی همراه شود و نیاز به بستری بیمار در ICU وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی: عنکبوت، گزش، کوآگولوپاتی، ضد سم

* شهر انصاری^۱
ثريا صالحی^۲

۱- گروه خون و سرطان کودکان
۲- گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

* نویسنده مسئول: تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر
بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) تلفن: ۰۲۲۲۶۱۲۷
email: shahladamavandi@yahoo.com

مقدمه

سردرد تهوع و استفراغ و بی‌حالی همراه می‌باشد. علائم عصبی کمتر دیده می‌شود. در بعضی مناطق جغرافیایی اسپاسم عضله گزارش شده ولی فاسیکولاسیون، اسپاسم موضعی عضله، ضعف و توقف تنفسی و تشنج بهندرت اتفاق می‌افتد.^{۱-۵} واکنش سیستمیک دیگر نسبت به این سم شامل هماچوری، رابیدومیولیزیس در نتیجه پاره شدن میوگلوبین، نارسایی کلیه و عوارض انعقادی مثل انعقاد داخل عروقی منتشر DIC می‌باشد.^{۳-۵} ضد سم عنکبوت در مناطقی مثل استرالیا، آمریکا و جنوب آفریقا با ایمونیزه کردن اسب به‌وسیله ترشحات غدد سمی تولید می‌شود که یا از نوع F(ab) و یا IgG ضد سم است.^۶ در این گزارش کودک شش ساله مبتلا به اختلال انعقادی ناشی از گزش عنکبوت که عارضه نادری است معرفی می‌گردد.^۱

معرفی بیمار

کودک شش ساله‌ای که با کبودی‌های متعدد در روی ساق پا و دستها همراه تورم گردن و خونریزی از لثه و لب‌ها از یکی از شهرهای جنوبی به بیمارستان حضرت علی اصغر آورده شد. حدود

فقط تعداد کمی از عنکبوت‌ها برای انسان خطرناک است. دو نوع عنکبوت در ایالات متحده وجود دارد که اهمیت زیادی دارد brown black widow spider و recluse spider که هر دو در آب و هوای گرم و تاریک و مکان خشک، جایی که حشرات فراوان هستند زندگی می‌کنند.^۱ فلیپ اندرسون پزشک امریکایی که بر روی گزش عنکبوت بهخصوص از نوع brown مطالعه می‌کند و تجربه بر روی ۱۰۰۰ مورد گزش در مدت ۳۰ سال گذشته دارد فقط ۱۲ مورد همولیز و کوآگولوپاتی در بیماران خود گزارش کرده است.^۲ اهمیت گزش عنکبوت را ضایعات پوستی ناشی از آن می‌داند. مطالعه وسیعی در استرالیا بر روی گزش عنکبوت شده که خطرناک‌ترین آنها را funnel web spider می‌داند. همچنین شش سندرم کلینیکی را همراه گزش عنکبوت گزارش کرده است و علائم کلینیکی ایجاد شده را مربوط به نوع آن می‌داند.^۱ مشخصات گزش عنکبوت شامل درد در محل که به اطراف بهخصوص اندام تحتانی، پشت و شکم و سینه انتشار می‌یابد و معمولاً با علائم غیر اختصاصی سیستمیک مثل

در ناحیه اوربیت ادم شدید، ادم لارنژ و تورم ناحیه گردن ایجاد می شود. در نواحی که بافت چربی وجود دارد مثل شکم، ران و ناحیه باسن احتمال نکروز بافتی وجود دارد.^۴ به علت ناکافی بودن منابع خونی عفونت موضعی زخم همیشه در اثر انتقال میکروب استرپتوکوک و استافیلوکوک توسط آن حشره ظاهر می شود.^۷ سه روز پس از گرشن علائم آنمی همولیتیک ظاهر می شود.^۸ مطالعات اپیدمیولوژی در شیلی و برباد میزان مرتالیته ۳/۷٪ /۱/۵٪ گزارش کرده اند.^۹ ارگان های دیگر از جمله دستگاه گوارش، سیستم عضلانی-اسکلتی در گیر می شوند ولی پانکراس، کلیه، ریه و سیستم کاردیو اسکولر کمتر صدمه می بینند. علائم معمولاً از چند ساعت تا ۱/۵ روز پس از آلوده شدن به سم به صورت دردهای شکمی، تهوع و گاهی استفراغ ظاهر شده، تب بیش از ۳۹ تا ۴۰°C می رسد. میالرژی و آرتراژی، سردرد و خستگی و ضعف وجود دارد که علائم بیماری ویروسی را تقلید می کند.^۹ عوارض کشنده در صورت پیشرفت بیماری ایکتر، هموگلوبینوری هموگلوبینی خونریزی وسیع و ندرتاً ادم ریه و افیوژن و نارسایی کنژستیو قلبی ظاهر می شود.^۹ مهمترین واکنش تهدید به مرگ، همولیز و کواگولوپاتی است. همولیز معمولاً در عرض چند ساعت از ۴۸ تا ۹۶ ساعت ظاهر می شود. همولیز پس از ظهور، ۴-۷ روز ادامه می یابد، همولیز داخل عروقی و یا خارج عروقی است.^۹ در نتیجه هیپوکسی، لتارژی، کوما، شوک تشنج و احتمالاً دیس آریتمی و توقف قلبی ظاهر می شود. هموگلوبینوری و نارسایی کلیوی و ندرتاً مرگ پیش می آید به همین علت بیمار بایستی در ICU نگهداری شود.^{۱۰} تست کومبیس و آزمایشات انعقادی لازم از جمله PT، PTT، INR، Ddimer، platelet، Hb از فاکتور اسفنگومیلیناز D است.^۹ علائم کلینیکی بسته به میزان سم وارد شده در محل گزش، سن بیمار و شرایط دفاعی شخص دارد. معمولاً محل گرشن یک نقطه است و باعث بروز تظاهرات پوستی و یا سیستمیک یا هر دو علائم ظاهر می شود. مهمترین واکنش سیستمیک ایجاد آنمی همولیتیک و ضایعات لوکال پوستی، اریتم و اندوراسیون می باشد. ضایعه پوستی چند ساعت پس از گزش با خارش و تورم و ادم ظاهر می شود. انفلاماسیون و ایسکمی به دنبال آن ایجاد شده، محل گزش در دندها و حساس شده و ممکن است سفید و یا اریتماتو و یا اکیموتیک شود. در چند روز اول اگر گردن باشد به خصوص در شیرخواران سبب فشار روی راههای هوایی می شود.

۲۰ روز پیش سابقه گزش عنکبوت (با مشخصاتی که والدین ذکر می کنند) را در دست چپ داشته است (عنکبوت از نوع brown recluse بوده که در جنوب ایران به کیشو معروف است) زخم دست با درمان های سریالی بهبود یافت. علی رغم درمان قبلی با فرآورده های خونی بیمار همچنان خونریزی و احساس ضعف و خستگی داشت. در معاینه لکه های کبودی در اندام فوقانی و تحتانی وجود داشت خونریزی فعل از محل خونگیری و لب و لشه وجود داشت. بیمار رنگ پریده بود ولی ایکتریک نبود. سمع قلب و ریه نرمال، ادم اطراف گردن مشاهده می شد. شکم نرم بدون ارگانومگالی و دفع ملنا داشته. محل اکیموز در دنکاک بوده و فلیبت در دست چپ ملاحظه شد. تعداد ضربان قلب بیمار ۶۴ در دقیقه، فشارخون mmHg ۱۰۰/۷۰ و تعداد تنفس وی ۲۰ بار در دقیقه بود. آزمایشات انجام شده در بدو ورود شامل: $\text{PTT} > 120 \text{ sec}$, $\text{Hb} = ۷/۷ \text{ g/dl}$, $\text{WBC} = ۱۰/۳۰۰ \text{/mm}^3$, $\text{Cr} = ۰/۴ \text{ mg/dl}$, $\text{BUN} = ۸ \text{ mg/dl}$, $\text{Platelet} = ۳۸۹۰۰ \text{/mm}^3$, $\text{U/A} = \text{normal}$, $\text{F VIII} = ۰/۶۵$, $\text{Bilirubin} = ۱/۵ \text{ mg/dl}$, $\text{direct} = ۰/۲$, $\text{SGOT} = ۱۸ \text{ U/L}$, $\text{SGPT} = ۱۴ \text{ U/L}$, $\text{fibrinogen} = ۰ \text{ mg/dl}$ بود. برای بیمار هر ۱۲ ساعت پلاسمای fibrinogen = ۰ mg/dl گذاشته شد یک هفته پس از درمان $\text{PT} = ۲۲$, $\text{PTT} = ۷۷$, $\text{INR} = ۳/۲$, $\text{fibrinogen} = ۱۳/۴$, $\text{PT} = ۱۳/۴$, $\text{PTT} = ۳۴$ و بالاخره دو هفته پس از ترخیص $\text{PT} = ۱۰/۵ \text{ mg/dl}$ بیمار در حال حاضر خوب است.

بحث

مهمنترین علامت سیستمیک سم عنکبوت (laxasceles) تخریب سلول های آندوتیال، لیز گلوبول های فرمز و غیر طبیعی شدن فاکتور انعقادی می باشد. مهمترین فاکتور سیتو توکسیک در سم عنکبوت اسفنگومیلیناز D است.^۹ علائم کلینیکی بسته به میزان سم وارد شده در محل گزش، سن بیمار و شرایط دفاعی شخص دارد. معمولاً محل گرشن یک نقطه است و باعث بروز تظاهرات پوستی و یا سیستمیک یا هر دو علائم ظاهر می شود. مهمترین واکنش سیستمیک ایجاد آنمی همولیتیک و ضایعات لوکال پوستی، اریتم و اندوراسیون می باشد. ضایعه پوستی چند ساعت پس از گزش با خارش و تورم و ادم ظاهر می شود. انفلاماسیون و ایسکمی به دنبال آن ایجاد شده، محل گزش در دندها و حساس شده و ممکن است سفید و یا اریتماتو و یا اکیموتیک شود. در چند روز اول اگر گردن باشد به خصوص در شیرخواران سبب فشار روی راههای هوایی می شود.

References

1. Isbister GK, White J, Currie BJ, Bush SP, Vetter RS, Warrell DA. Spider bites: addressing mythology and poor evidence. *Am J Trop Med Hyg* 2005; 72: 361-4.
2. Anderson PC. Missouri brown recluse spider: a review and update. *Mo Med* 1998; 95: 318-22.
3. Wright SW, Wrenn KD, Murray L, Seger D. Clinical presentation and outcome of brown recluse spider bite. *Ann Emerg Med* 1997; 30: 28-32.
4. Brent J, Wallace K, Burkhardt K. Critical Care Toxicology: Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient. 1st ed. Philadelphia: Mosby; 2005.
5. Frundle TC. Management of spider bites. *Air Med J* 2004; 23: 24-6.
6. Torda TA, Loong E, Greaves I. Severe lung oedema and fatal consumption coagulopathy after funnel-web bite. *Med J Aust* 1980; 2: 442-4.
7. Kularatne SA, Kumarasiri PV, Pushpakumara SK, Dissanayaka WP, Ariyasena H, Gawarammana IB, et al. Routine antibiotic therapy in the management of the local inflammatory swelling in venomous snakebites: results of a placebo-controlled study. *Ceylon Med J* 2005; 50: 151-5.
8. Hoffman R, Benz EJ, Shattil SJ, Nelson DA. Hematology: Basic principles and practice. 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2005.
9. Hoover NG, Fortenberry JD. Use of antivenin to treat priapism after a black widow spider bite. *Pediatrics* 2004; 114: 128-9.
10. Elbahlawan LM, Stidham GL, Bugnitz MC, Storgion SA, Quasney MW. Severe systemic reaction to *Loxosceles reclusa* spider bites in a pediatric population. *Pediatr Emerg Care* 2005; 21: 177-80.
11. Zambrano A, González J, Callejas G. Severe loxoscelism with lethal outcome. Report of one case. *Rev Med Chil* 2005; 133: 219-23.

Coagulopathy after spider bites in a six-year-old boy

Ansari SH.^{1*}
Salehi S.²

1- Department of Hematology
& Oncology
2- Department of Pediatrics

Ali Asghar Children's Hospital
Iran university

Abstract

Background: Spider bites are common in most parts of the world. In some areas, where snake or scorpion bites are common, spider bites may not be considered a significant problem by the general public and those who have been bitten by spiders may not go to a hospital. However, significant problems are observed in the victims of certain species of spiders including: widow spider (of the genus *Latrodectus*), including the black widow and brown spiders (of the genus *Loxosceles*), such as the brown recluse.

Case: We report a six-year-old boy, admitted to the hospital two weeks after suffering a spider bite. The patient presented with a severe nose bleed, ecchymosis and purpura, as well as anemia, indicating a clotting disorder. Laboratory results revealed abnormal values for prothrombin time (PT) >50 sec, partial thromboplastin time (PTT) >120 min and fibrinogen = 0 mg/dl, whereas factor VIII was normal according to a mixing study, with a normal platelet count of 350,000/ μ l. The patient was managed with fresh frozen plasma every 12 h, and was discharged one week after hospital admission. At present, the patient is well with more normal laboratory results one month after treatment: PT=13.4 sec, PTT= 34 sec, fibrinogen=105 mg/dl.

Conclusions: Although spider bites are uncommon in Iran, severe systemic reactions may occur in the pediatric population requiring admission to the pediatric intensive care unit. These systemic reactions may include hemolytic anemia coagulopathy and renal failure.

Keywords: Spider, bite, coagulopathy, antivenin

*Corresponding author: Ali Asghar
Children's Hospital
Shariati Ave., Zafar Ave., Iran.
Tel: +98-21-22226127
email:
shahladamavandi@yahoo.com