

خون

فصلنامه علمی پژوهشی
دوره ۳ شماره ۱ بهار ۸۵ (۶۳-۷۱)

ارزیابی بتا-۲ میکروگلوبولین ($\beta2\text{MG}$) در سرم بیماران مبتلا به منوکلونال و پلی کلونال گاماتی

محمد رضا دیهیم^۱، فروغ اعظم طرآبادی^۱، دکتر مژگان شایگان^۲، دکتر مهناز آفایی پور^۲، دکتر ساندرا رفوآ^۵

چکیده

سابقه و هدف

بتا-۲ میکروگلوبولین، پروتئینی است با وزن مولکولی ۱۱۸۰۰ دالتون که توسط سلول‌های هسته‌دار ساخته می‌شود. این پروتئین اولین بار در ادرار بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تخلیص شده است. افزایش سطح سرمی بتا-۲ میکروگلوبولین در رد پیوند، لوکمی لنفوسیتیک، بدخیمی‌های خونی و در بیماری مولتیپل میلوما (MM) گزارش شده است و به عنوان شاخص مهم در MM مطرح می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی سطح سرمی $\beta2\text{MG}$ و بعضی از فاکتورهای مرتبط در بیماران مبتلا به منوکلونال و پلیکلونال گاماتی پرداختیم.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه که از نوع توصیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادی بود، از بین مراجعه‌کنندگان، ۸ بیمار مبتلا به گاماتی در طول مدت ۳ ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه‌گیری میزان بتا-۲ میکروگلوبولین به روش الیزا، بررسی میزان CRP به روش لاتکس آگلوتیناسیون و اندازه‌گیری میزان کراتینین نیز به روش ژافه با استفاده از اتوآنالیزر انجام گرفت. جداسازی پروتئین‌های سرم به روش الکتروفورز سلولز استات و اندازه‌گیری ایمونوگلوبولین‌های سرم نیز با استفاده از روش رادیال ایمونودیفیوژن (RID) انجام شد. با استفاده از ضریب ارتباط اسپیرمن (Spearman Rho)، ارتباط بین پارامترها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

طی بررسی انجام شده، در ۸۷/۵ درصد از بیماران مبتلا به گاماتی منوکلونال، افزایش میزان بتا-۲ میکروگلوبولین مشاهده گردید. سطح سرمی CRP نیز در این بیماران افزایش یافته بود. طبق نتایج به دست آمده و محاسبات آماری، بین افزایش میزان غلظت سرمی بتا-۲ میکروگلوبولین و CRP همبستگی قوی وجود داشت که معنی دار بود ($p < 0.05$ ، $Rho = 0.693$) و فقط در ۴۰ درصد از بیماران، افزایش هم زمان $\beta2\text{MG}$ و کراتینین وجود داشت. در بیماری که مبتلا به گاماتی منوکلونال همراه با نارسایی کلیه بود، پیک بسیار بلندی در محدوده گاماتی مشاهده شد.

نتیجه‌گیری

از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که از مارکرهایی نظری $\beta2\text{MG}$ ، کراتینین و همچنین درصد باند پروتئین منوکلونال می‌توان به عنوان مارکرهای تشخیصی در وضعیت بیماری و طول عمر بیماران مبتلا به منوکلونال گاماتی استفاده کرد که بهتر است تمامی فاکتورهای ذکر شده در دوران عودورمیشن بیماری بررسی گردد و نقش اساسی آن‌ها در پیش‌آگهی و تشخیص بیماری مطرح شود که این خود احتیاج به مطالعات و تحقیقات بیشتری در این زمینه دارد.

کلمات کلیدی: منوکلونال گاماتی، بتا-۲ میکروگلوبولین، پروتئین-C، فاز حاد کراتینین، الکتروفورز پروتئین،

ایمونوگلوبولین

تاریخ دریافت: ۱۴/۲/۱۷

تاریخ پذیرش: ۱۴/۵/۳۰

۱- مؤلف مسؤول: کارشناس ارشاد بیوشیمی بالینی - مریم مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران - صندوق پستی ۱۱۵۷-۱۴۶۶۵

۲- کارشناس شیمی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۳- PhD ایمونولوژی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۴- متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۵- متخصص آسیب‌شناسی بالینی و تشریحی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

مقدمه

میکروگلوبولین، ارتباط مستقیمی با وضعیت بیماری و طول عمر بیمار دارد (۳). بر طبق استانداردهای بین‌المللی که برای وضعیت بیماری MM در نظر گرفته شده است؛ در وضعیت ۱ بیماری میزان $\beta2MG$ کمتر از $3/5$ میلی‌گرم در لیتر با میانگین طول عمر بیماری ۶۲ ماه، در وضعیت ۲ بیماری، میزان $\beta2MG$ بین $3/5$ تا $5/5$ میلی‌گرم در لیتر با میانگین طول عمر بیماری ۴۴ ماه و در وضعیت ۳ بیماری میزان $\beta2MG$ بیشتر از $5/5$ میلی‌گرم در لیتر با میانگین طول عمر بیماری ۲۹ ماه همراه می‌باشد (۷). یکی دیگر از عوامل پیش‌آگهی دهنده قوی در بیماران مبتلا به MM که با فاکتورهای دیگر نظیر $\beta2MG$ و پرولیفراسیون سلول‌های C-Reactive میلومانی غز استخوان در ارتباط می‌باشد، Protein (CRP) است (۸).

مواد و روش‌ها

مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود که در آن ۸ بیمار مبتلا به گاماتی در طول مدت ۳ ماه که جهت انجام آزمایش‌های ایمونولوژیک به آزمایشگاه مراجعه کرده بودند به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط همبستگی بین دو پارامتر $\beta2MG$ و CRP سرم با استفاده از ضریب اسپیرمن (Spearman) مورد تفسیر آماری قرار گرفت. بدین ترتیب، ۱۰ میلی‌لیتر خون در داخل لوله لخته از بیماران گرفته شد و سرم بیماران از خون کامل توسط سانتریفوژ جدا گردید که جهت انجام آزمایش‌های $\beta2MG$ ، CRP، کراتینین، اندازه‌گیری ایمونوگلوبولین‌ها و بررسی پروتئین‌های سرم به روش الکتروفورز مورد تجزیه قرار گرفت.

اندازه‌گیری میزان $\beta2MG$ به روش الیزا با استفاده از کیت دیاگنوستیکا، بررسی میزان CRP با استفاده از کیت انسان به روش آکگلوبتیناسیون لاتکس بر اساس واکنش آنتی‌بادی اختصاصی ضد CRP، میزان کراتینین سرم با استفاده از کیت شرکت دارواش بر اساس واکنش رنگ‌سنگی ژافه توسط اتو آنالایزر بیوشیمی و جداسازی پروتئین‌های سرم نیز به روش الکتروفورز سلولز استات در pH قلیایی ($pH=8/4$) در 180 ولت به مدت 15 دقیقه انجام گرفت. در این فرآیند (الکتروفورز سلولز استات) در

این تحقیق با هدف بررسی و اندازه‌گیری هم‌زمان $\beta2MG$ سرم به عنوان یکی از عوامل مهم پیش‌آگهی در مبتلایان به مولتیپل میلوما و اندازه‌گیری CRP، کراتینین، ایمونوگلوبولین‌ها و بررسی الکتروفورتیک پروتئین‌های سرم در این بیماران انجام گرفت و ارتباط بین این پارامترها با یکدیگر بررسی گردید. در مطالعات قبلی، کمتر به اندازه‌گیری و بررسی هم‌زمان این پارامترها در کار یکدیگر اشاره شده است و این فرصتی بود که بتوانیم نگاهی دقیق‌تر به این مسئله داشته باشیم.

گاماتی‌ها به اختلال در ساخت ایمونوگلوبولین‌ها اطلاق می‌شود، گاماتی‌های پلی کلونال با افزایش پروتئین خون که بیشتر در بیماری‌های کلائز، اختلالات کبدی و عفونت‌های مزمن دیده می‌شود همراه هستند در صورتی که گاماتی‌های منوکلونال با افزایش موضعی و یا عمومی در ایمونوگلوبولین‌ها همراه می‌باشند (۱).

۶۰ درصد پاراپروتئین‌ها به صورت مولتیپل میلوما هستند و این بیماری بر اثر پرولیفراسیون پلاسمای سل‌ها در غغاستخوان رخ می‌دهد، در نتیجه سلول‌های دیگر غغاستخوان کاهش یافته و با عوارضی نظیر ترومبوسیتوپنی، آنمی و لوکوپنی همراه می‌باشد. وجود باندهای غیرطبیعی بتا-۲ میکروگلوبولین در الکتروفورز پروتئین‌های سرم و ادرار، مثبت بودن پروتئین بنس جونس، آنمی و افزایش اوره و کراتینین سرم برخی از یافته‌های آزمایشگاهی این بیماری می‌باشد (۲). ۵۵ درصد این بیماران مبتلا به IgG میلوما، ۲۰ درصد IgA میلوما، ۲۰ درصد میلومای زنجیره سبک (لامدا و کاپا) و ندرتا IgE و IgM می‌باشند. بررسی الکتروفورتیک پروتئین‌ها و ایمونوگلوبولین‌های سرم و همچنین اندازه‌گیری میزان بتا-۲ میکروگلوبولین ($\beta2MG$) در این بیماران حایز اهمیت است (۳). بتا-۲ میکروگلوبولین، پروتئینی با وزن مولکولی 11800 دالتون بوده که اولین بار در ادرار بیماران کلیوی گزارش شده است (۴)، محدوده طبیعی غلظت سرمی آن کمتر از 3 میلی‌گرم در لیتر است و افزایش غلظت سرمی آن در رد پیوند غغاستخوان، لوکمی لنفوسيتیک و مولتیپل میلوما (MM) گزارش شده است (۵،۶). افزایش سطح سرمی بتا-۲

خون

فصلنامه علمی پژوهشی

دوره ۳، شماره ۱، بهار ۸۵

میکروگلوبولین سرم مشاهده گردید که سطح سرمی CRP نیز به ترتیب +، ۲+ و ۳+ افزایش داشت (نمودار ۱). طبق نتایج به دست آمده، غلظت سرمی $\beta2MG$ در بیماران به صورت معنی داری افزایش یافته و همبستگی قویی بین آنها وجود داشت ($Rho = 0.693$, $p < 0.05$) (جدول ۱). در ۴۰ درصد از بیماران، افزایش غلظت سرمی کراتینین و بتا-۲ میکروگلوبولین به صورت هم زمان مشاهده شد. در منحنی الکتروفورز پروتئین به روش سلولز استات، پیک بسیار بلندی در محدوده بتا-۲ گلوبولین در بیماری که مبتلا به منوکلونال گاماپاتی (بیمار شماره ۴ طبق تابلوی نتایج) و نارسایی کلیه بود ($Cr = 13.6 \text{ mg/dl}$) مشاهده گردید که این بستگی به ساخت غیرطبیعی ایمونوگلوبولین و یا نوع ساخت زنجیره سبک و یا زنجیره سنگین در ساختار ایمونوگلوبولین دارد (شکل ۱).

البته در این بیمار، افزایش میزان IgG تا حدود ۲ برابر حد طبیعی ($IgG = 26.7 \text{ mg/l}$) وجود داشت. میزان بتا-۲ میکروگلوبولین نیز در این بیمار با افزایش حدود ۲۵ برابر

pH قلیایی) که بر پایه شارژ الکتریکی پروتئین‌ها و قدرت یونی بافر می‌باشد، پروتئین‌ها از یکدیگر جدا می‌شوند. بدین ترتیب، اجزای مختلف که شامل آلبومین، آلفاگلوبولین، بتاگلوبولین و گاماگلوبولین می‌باشند، پس از جداسازی توسط الکتروفورز و انجام مراحل رنگ‌آمیزی و شفافسازی در طول موج ۵۲۵ نانومتر توسط دستگاه دانسیتومتر براساس غلظت باندهای به دست آمده، اسکن شده که بدین ترتیب ارزیابی تک‌تک پروتئین‌ها به صورت منحنی الکتروفورز صورت می‌گیرد. اندازه‌گیری ایمونوگلوبولین‌ها نیز با استفاده از روش رادیال ایمونودیفیوژن (RID) بر روی پلی‌اکار براساس اندازه قطر رسب کمپلکس آنتی ژن-آنتمپادی (precipitation zone of antibody-antigen complex) انجام گرفت.

یافته‌ها

در مطالعات انجام شده بر روی بیماران مبتلا به گاماپاتی منوکلونال، در ۸۷/۵ درصد از بیماران، افزایش میزان بتا-

جدول ۱: بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و ایمونولوژیک در مبتلایان به منوکلونال و پلی‌کلونال گاماپاتی

شماره بیمار	$\beta2MG$		کراتینین		IgG		IgM		IgA		پروتئین توتال		آلبومن g/dl	فراکشن بتا و گاما
	mg/l	CRP	mg/dl	g/l	g/l	g/l	g/dl	g/l	g/dl	g/l	g/dl	g/l		
۱	۷/۹	۲+	۱	۱۳/۵	۰/۴	۰/۹	۷/۶	۴/۱	Beta: N & Gamma; I					
۲	۸/۳	۱+	۱/۳	۱۲/۵	-	-	۷/۳	۳/۸	Beta: N & Gamma; I					
۳	۳/۹	۱+	۱/۲	۱۴/۱	-	-	۶/۶	۳/۳	Beta: N & Gamma; I					
۴	۷۵	۳+	۱۳/۶	۲۶/۷	۰/۳	۲	۷/۷	۱/۸	Beta: I & Gamma; N					
۵	۲/۳	۱+	۱	۱۶	۰/۶	۰/۷	۷	۴	Beta: N & Gamma; I					
۶	۸/۱	۳+	۱/۲	۱۰	۲/۱	۰/۴	۷/۳	۴/۱	Beta: I & Gamma; N					
۷	۱۰۹	۳+	۱/۶	۲۸/۶	۰/۷	۰/۹۵	۷/۷	۲/۴	Beta: N & Gamma; I					
۸	۴/۸	۲+	۰/۷	-	-	-	۶/۳	۴	Beta: I & Gamma; I					

منفی: (محدوده طبیعی برای) CRP

افزایش: I

طبیعی: N


$\beta2MG < 3 \text{ mg/l}$: (محدوده طبیعی برای)

$1/5 - 1/6 \text{ mg/l}$: (محدوده طبیعی برای) کراتینین


$6/5 - 16 \text{ g/l}$: (محدوده طبیعی برای) IgG

$4/3 - 4/5 \text{ g/l}$: (محدوده طبیعی برای) IgA

$3/3 - 3/4 \text{ g/l}$: (محدوده طبیعی برای) IgM


نمودار ۱: ارتباط بین سطح سرمی β 2MG و CRP سرم در مبتلایان به منوکلونال گاماباتی

الکتروفورز پروتئین



شکل ۱: منحنی الکتروفورز پروتئین به روش سلولز استات در بیمار مبتلا به منوکلونال گاماباتی و نارسایی کلیه . پیک بسیار بلندی در محدوده بتا-۲ میکرو گلوبولین مشاهده شد.

الکتروفورز پروتئین



FRACTION	%	NORMAL	RANGE	G/DL
ALBUMINE	31.3 L	53.0	—	3.2 – 5.0
ALPHA 1	1.8	1.5	—	0.1 – 0.4
ALPHA 2	4.4 L	6.0	—	0.6 – 1.0
EBTA	6.6 L	11.0	—	0.6 – 1.3
GAMMA	55.9 H	12.0	—	0.7 – 1.5
Ratio of Albumin/Globulines	0.45			

شکل ۲: منحنی الکتروفورز پروتئین به روش سلولز استات در بیمار مبتلا به منوکلونال گاماپاتی که افزایش باند گاماگلوبولین مشاهده می شود

گزارش گردید و این خود یک بار دیگر ارتباط بین این پارامترها را با یکدیگر نشان می دهد، در این بیمار، نسبت آلبومین به گلوبولین ($A/G = 0.45$) به دست آمد.

بحث

طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه و نتایج مشابه که از طرف محققان گزارش شده، بررسی ارتباط بین دو متغیر $\beta2MG$ و CRP در بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما از نظر آماری معنی داری بوده و همبستگی شدیدی بین این دو پارامتر وجود داشته است ($Rho = 0.693$, $p < 0.05$). این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی مطابقت دارد (۸). این واقعیت وجود دارد که سلول های میلومایی انسان و پلاسماسل های میلومایی، خود تولید کننده $\beta2MG$ هستند و افزایش میزان آن نه تنها در اندازه توده بلکه در برآورد میزان فعالیت سلول های میلومایی نیز به عنوان یک شاخص مطرح می باشد (۹).

همان طور که در گزارش های قبلی توسط برخی از

حد طبیعی ($\beta2MG = 75 \text{ mg/l}$) همراه بود. میزان CRP نیز افزایش یافته بود و ۳ مثبت به دست آمد ($CRP = 3+$). نسبت آلبومین به گلوبولین نیز کاهش یافته بود ($A/G = 0.32$) که این خود نشانگر ساخت بیش از حد گلوبولین نسبت به آلبومین می باشد. با توجه به یافته های فوق، استنباط می شود که بتا-۲ میکرو گلوبولین در این افراد از طریق سلول های میلومایی تولید می شود (۵). از طرفی پروتئین CRP نیز که جزو پروتئین های فاز حاد می باشد در این افراد افزایش می یابد و در نتیجه آن، درصد افزایش باند بتا-۲ گلوبولین در اسلايد الکتروفورز پروتئین های سرم مشاهده می گردد که این مطلب، همبستگی بین افزایش میزان بتا-۲ میکرو گلوبولین سرم و افزایش میزان CRP سرم در باند بتا-۲ گلوبولین نشان می دهد. در بیمار شماره ۷ نیز (مورد دیگر منوکلونال گاماپاتی) افزایش CRP نیز ($\beta2MG = 109 \text{ mg/l}$), افزایش کراتینین سرم (116 mg/dl), افزایش IgG (28 g/l) و افزایش باند گاما گلوبولین مشاهده می شود (شکل ۲). میزان CRP نیز به صورت ۳ مثبت

۷۰ درصد بیماران مبتلا به MM گزارش نمودند (۱۸). در نتایج به دست آمده، افزایش میزان پروتئین CRP نیز به عنوان یکی از پروتئین‌های فاز حاد به همراه افزایش میزان $\beta2MG$ که هر دو در منطقه بتا و گاما‌گلوبولین قرار دارند مشاهده می‌شود که بدین ترتیب در منحنی‌های الکتروفورز پروتئین‌های سرم افزایش باند بتا و گاما‌گلوبولین کاملاً واضح است و یکبار دیگر همبستگی این پارامترها را با یکدیگر نشان می‌دهد. بدین ترتیب می‌توان با بررسی میزان $\beta2MG$ در کنار پارامترهای دیگر، روش درمان را نیز در این بیماران برنامه‌ریزی کرد (۸). در این بیماران قبل از درمان می‌بایست به عوامل دیگری نظیر بررسی وضعیت کلیه‌ها با اندازه گیری میزان اوره و کراتینین سرم و همچنین بررسی میزان کلسیم، اسیداوریک، هموگلوبین و اندکس‌های سلول‌های میلومایی مغراستخوان توجه داشت.

افزایش هم‌زمان $\beta2MG$ و کراتینین سرم در یک بیمار مبتلا به منوکلونال گاماپاتی با نارسایی کلیه مشاهده گردید (بیمار شماره ۴) که با نتیجه گزارش‌های باتایل و همکاران مطابقت دارد (۱۱). یکی دیگر از فاکتورهایی که می‌تواند در کنار $\beta2MG$ در طبقه‌بندی وضعیت بیماری مطرح باشد، میزان آلبومین سرم است (۷). طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، میزان آلبومین در بیماران شماره ۴ و ۷ به طور واضحی کاهش داشته که این خود از وضعیت بسیار بد و شدید بیماری در این بیماران بحث می‌کند (جدول ۱).

در این طرح در مقطع محدودی از زمان تعداد محدودی بیمار مبتلا به گاماپاتی مورد بررسی قرار گرفتند و در طرح های بعدی می‌توان در مقطع زمانی وسیع‌تر تعداد بیشتری بیمار مبتلا به گاماپاتی منوکلونال را در دوران عود و رمیشن بیماری بررسی کرد و پارامترهایی که می‌توانند در رابطه با وضعیت و طول عمر بیماری مطرح باشند مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

نتیجه گیری

بنا-۲- میکرو‌گلوبولین، معرف بسیار مفیدی در بررسی وضعیت تغییرات توده تومور و فعالیت پرولیفراتیو می‌باشد

محققان ارایه شده، $\beta2MG$ می‌تواند به عنوان یک مارکر جهت بررسی وضعیت بیماری و پیگیری آن در بیماران مبتلا به MM مطرح باشد و می‌بایست خاطر نشان‌ساخت که افزایش $\beta2MG$ در این بیماران با طول عمر مبتلایان به MM نیز ارتباط دارد (۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷). به طور مثال، بیمارانی که در آن‌ها سطح سرمی $\beta2MG$ بالاتر باشد، دارای طول عمر کمتری خواهند بود (۱۱). میزان $\beta2MG$ در بیمارانی با توده وسیع سلول‌های میلومایی (stageIII)، نسبت به مرحله ۲ و ۱ با توده کمتر بسیار بالاتر بوده است (۱۳). همچنین طبق نتایج به دست آمده از مطالعه کراج و همکاران، میانگین طول عمر بیمارانی که میزان $\beta2MG$ آن‌ها کمتر از ۵ میلی‌گرم در لیتر بوده، ۵۲ ماه می‌باشد و این در حالی است که در بیمارانی که میزان $\beta2MG$ آن‌ها بیشتر از ۸ میلی‌گرم در لیتر بوده، طول عمر بیماری حدود ۲۴ ماه بوده است (۱۴).

افزایش هم‌زمان $\beta2MG$ و CRP در بیماران مبتلا به مولتیپل میلومایی فعال در عود بیماری، به مراتب خیلی بیشتر از مقدار آن در مولتیپل میلومایی غیرفعال در رمیشن بیماری است. در نهایت $\beta2MG$ و CRP هم‌زمان می‌توانند به عنوان مارکرهای پیش‌آگهی دهنده قوی جهت تعیین وضعیت و طول عمر بیمار مطرح باشند (۸، ۱۵). از طرف دیگر ارتباط بین $\beta2MG$ و CRP در مبتلایان به MM که بیشترین علت مرگ و میر آن‌ها در اثر نارسایی کلیه و عفونت‌ها می‌باشد، روزبه روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود به خصوص که اندازه گیری این دو عامل مهم پیش‌آگهی دهنده در MM، سریع، قابل اطمینان و ارزان می‌باشد (۷، ۸، ۱۶، ۱۷-۲۰). نکته جالب توجه دیگری که در مطالعه فوق متوجه آن شدیم، همبستگی بین $\beta2MG$ و پروتئین منوکلونال بود که از طرف سلول‌های میلومایی تولید می‌شود و در الکتروفورز پروتئین‌های سرم به صورت پیک بلند در منطقه بتا و گاما‌گلوبولین مشاهده می‌گردد و مقدار آن به میزان توده سلول‌های میلومایی بستگی دارد. نکته فوق می‌تواند یکبار دیگر این واقعیت را ثابت کند که خود سلول‌های میلومایی تولیدکننده $\beta2MG$ می‌باشد (۹). این نتیجه با مطالعه سینکلیر و همکارانش مطابقت دارد، آن‌ها نیز همبستگی قوی بین پاراپروتئین سرم و میزان

و بر طبق آن، میزان $\beta2MG$ در بیمارانی که در وضعیت پرولیفراسیون فعال می باشند به مراتب بالاتر از بیمارانی که در مرحله پرولیفراتیو ثابت و یا در حالت رمیشن بیماری هستند می باشد(۱۴).

اندازه گیری میزان $\beta2MG$ بر اساس استاندارد بین المللی جهت تعیین وضعیت بیماران مبتلا به MM به عنوان معرف معین معرفی شده است. $\beta2MG$ همچنین به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای نشان دهنده طول عمر و سیر بیماری در این بیماران مطرح می باشد. میزان CRP و آلبومین سرم نیز می توانند به عنوان فاکتورهای نشان دهنده طول عمر و سیر بیماری مطرح باشند(۱۷).

از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که از مارکرهای نظیر اندازه گیری $\beta2MG$, CRP، کراتینین و همچنین درصد باند پروتئین منوکلونال که در اسلاید پروتئین الکتروفورز مشاهده می شود، می توان به عنوان مارکرهای تشخیصی در تعیین وضعیت و طول عمر بیماران مبتلا به منوکلونال گاماتی استفاده کرد که بهتر است تمام فاکتورهای ذکر شده در دوران عود و رمیشن بیماری بررسی گردد و نقش اساسی آنها در پیش آگهی و تشخیص بیماری مطرح شود و این خود احتیاج به تحقیق و مطالعه بیشتری در این

زمینه دارد.

از دیگر پارامترهایی که در ابتلای این بیماران به سمت نارسایی کلیه، به عنوان یکی از عوامل مرگ و میر در این گروه، مطرح می باشد، اندازه گیری هم زمان $\beta2MG$ و کراتینین سرم و ارتباط بین این دو پارامتر است که می توان با مطالعه بر روی تعداد بیشتری بیمار مبتلا به منوکلونال گاماتی، ارتباط بین این دو پارامتر را مورد بررسی قرار داد. همچنین می توان با اندازه گیری کلیه پارامترهایی که در این مطالعه آمده است (اندازه گیری $\beta2MG$ - سرم، کراتینین، اندازه گیری آیمونو گلوبولین ها و بررسی الکتروفورتیک پروتئین و آلبومین سرم) در دوران عود و رمیشن بیماری در تعداد بیشتری بیمار نقش آنها را در پیش آگهی و تشخیص بیماری بررسی کرد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاران محترم آزمایشگاه های آیمونولوژی و بیوشیمی سازمان انتقال خون ایران که ما را در این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

References:

- 1- Burits CA, Ashwood ER. Tietz textbook of clinical chemistry, 2 nd ed. 1994: 683-684.
- 2- Nimart B, Russell H. Laboratory evaluation of immunoglobulin function and humoral immunity. Clin diagnosis and management by lab methods. 19 th ed. 1996: 923-924.
- 3- Davey FR, Henry JB. Hematology, coagulation and transfusion medicine, multiple myeloma. Clin diagnosis and management by lab methods. 19 the ed. 1996: 693-694.
- 4- Berggard I, Bearn AG. Isolation and properties of a low molecular weight beta-2 globulin occurring in human biological fluids. J Biol Chem 1968; 243:4095- 420.
- 5- Evrin PE, Wibell L. Serum beta-2 microglobulin in various disorders. Clin Chem Acta 1973; 43:183.
- 6- Shuster J, Gold P, Poulik MD. β2MG levels in cancerous and other disease state. Clin chim Acta 1976; 67- 307.
- 7- Greipp PR, San Miguel J, Duire BG, Crowley JJ, Barlogie B, Blade J, et al. International staging system for multiple myeloma. J Clin Oncol 2005; 20, 23 (15): 3412-3.
- 8- Bataille R, Boccadoro M, Klein BC. Reactive protein and Beta-2 microglobulin produce a simple and powerful myeloma staging system. Blood 1992; 80(3): 733-737.
- 9- Bataille R, Magub M, Grenier J, Donnadio D, Sany J.
- 10- Serum Beta-2 microglobulin in multiple myeloma: Relation to presenting features and clinical status. Eu J Cancer Clin Oncol 1982; 15:59.
- 11- Min R, Epstein J, Barlogic B. Beta-2 microglobulin as a negative growth regulator of myeloma cells. Br J Hematol 2002; 118 (2): 495-505.
- 12- Sinclair D, Cranfiled T, Gancza Kowski M: Paraprotein and beta-2 microglobulin analysis in multiple myeloma. Clin Lab 2003; 49 (3-4): 129-34.
- 13- Bataille R, Durie BG, Grenier G. Serum beta-2 microglobulin and survival duration in multiple myeloma: A simple reliable marker for staging, British journal of hematology 1983; 55: 439-447.
- 14- Bataille R, Grenier J, Sany J. Beta-2 microglobulin in Myeloma: Optional use for staging, prognosis and treatment-a prospective study of 160 patients. Blood 1984; 63(2): 468-476.
- 15- Kraj M, Maj S, Poglod R, Rost K. Clinical usefulness of serum beta-2 microglobulin determination in patients with multiple myeloma. Acta Haematol Pol 1989; 20(2): 140-5.
- 16- Patriarca F, Fanin R, Silvestri F. Clinical features and outcome of multiple myeloma arising from the transformation of a monoclonal gammopathy of undetermined significance, level lymphoma. 1999; 34 (5-6): 591-6.
- 17- Vincent C, Bozett N, Revilland JP. Plasma Beta-2 microglobulin turnover in renal insufficiency. Acta Clinica Belgica 1980; 135: 2-13.
- 18- Bettini R, Redaelli S, Maino C, Bertuoli S, Costantini C, Lazzarini A, et al. Prognostic value of serum β2MG in multiple myeloma. Recent Prog Med 2005; 96 (2): 81-6.
- 19- Alexanian R, Barlagie B, Fritzsche H. Beta-2 microglobulin in multiple myeloma. Am J Hematol 1985; 20: 345-51.
- 20- Litom P, Swan F, Cabarillas F, Tucker SL, McLaughlin P, Hagemeister FB, et al. Prognostic value of serum Beta-2 microglobulin in low grade lymphoma. Annals of Int Med 1991; 114: 885-860.

Evaluation of serumic beta-2 microglobulin (β 2MG) in patients with monoclonal and polyclonal Gammapathy

Deyhim M.R.¹(MS), Tarabadi F.¹(BS), Shaiegan M.¹(PhD), Aghaeipour M¹. (MD), Refua S.¹(MD)

¹Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center

Abstract

Background and Objectives

Beta-2 microglobulin (β 2MG) is a low weight molecular protein (mol wt: 11800) synthesized by all nucleated cells and originally isolated from human urine in patients with renal failure. Increased β 2MG levels have been reported in rejection of transplantation, in patients with lymphocytic leukemia, hematological malignant disease and especially in patients with multiple myeloma. The aim of this study is to evaluate serum β 2MG and some related factors in patients with monoclonal and polyclonal gammopathy.

Materials and Methods

This study is a cross - sectional study and we select patients by non - random method. We studied 8 patients with gammopathy for 3 months. They were 10-26 years old. Serum β 2MG concentration was measured by ELISA method and serum CRP was done by qualitative latex method. Serum creatinine level was measured according to colotimetric Jaffe reaction. The separation of serum globulins was conducted by cellulose acetate protein electrophoresis. Immunoglobulin levels were measured by Radial Immunodiffusion (RID) method. We use SPSS statistic program and spearmen's index (Rho) to estimate correlation between parameters in this study.

Results

Serum β 2MG levels increased in 87.5% of patients with monoclonal gammopathy. Serum CRP levels also increased in patients with monoclonal gammopathy. According to statistical results, there was a high correlation between increased CRP and β 2MG levels in patients (Rho=0.693, $p<0.05$). However, serum β 2MG and creatinine levels both had been increased only in 40% of patients. In evaluation of serum protein electrophoresis, in one patient with renal failure, there was a sharp peak in gamma globulin region.

Conclusions

This study indicated that quantitative measurement of serum creatinine, serum β 2MG, serum CRP and evaluation of monoclonal band in serum protein electrophoresis can be strong factors for staging the disease and predicting the survival and prognosis in patients with monoclonal gammopathy. So evaluation of these factors is recommended for follow up of patients in relapse and remission stages. It is better to further evaluate and study the main role of these factors in predicting and diagnosing multiple myeloma as well.

Key words: Monoclonal gammopathy, Beta2 microglobulin, C-Reactive Protein (CRP), Creatinine, Electrophoresis, Immunoglobulin

SJIBTO 2006; 3(1): 63-71

Received: 7 May 2005

Accepted: 21 Aug 2005

Correspondence: Deyhim M.R., MS of Clinical Biochemistry, IBTO-Research Center
P.O.Box: 14665-1157,Tehran, Iran.Tel: (+9821) 88601501; Fax: (+9821) 88601555
E-mail: mrdeyhim@yahoo.com