



پیدا استراتیگرافی سازند کژدمی در گوه نقش (ستم)

مهناز پروانه‌زیاد شیرازی^۱، شاهین قهرمانی^۲ و علی خردمند^۳

(۱) گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

(۲) گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

*عهده‌دار مکاتبات mahnazshirazi49@gmail.com

چکیده

سازند کژدمی یکی از سازندهای گروه بنگستان است که با سن آلبین - سنتومانین زیرین در زون ساختمانی زاگرس چین‌خورده در جنوب غرب ایران قرار دارد. در این مطالعه سازند کژدمی به ضخامت ۲۲۲ متر در شمال شیراز، از نظر میکروبیوستراتیگرافی مورد بررسی قرار گرفت. مرز سازند کژدمی با سازند داریان به صورت ناپیوستگی فرسایشی است. وجود افق شاخص از جنس اکسید آهن و نیز مارن شدیداً گلوكونیتی در حد بین سازندهای فوق نشانگر یک نبود رسوب‌گذاری (دیاستم) است که بر اساس شواهد فسیلی نیز اثبات می‌گردد و نتیجه‌ی پیامد فاز کوهزایی استرین و تأکید بر خشکی‌زایی در حد بین سازندهای فوق الذکر است.

مرز بالایی این سازند با آهک‌های مارنی سازند سروک به صورت هم‌شیب و تدریجی می‌باشد، از نظر فسیل‌شناسی حضور فرامینیفرهای *Nezzazatinella* sp., *Scandonia* sp., *Daxia* sp., *Choffatella* sp., *Pseudolituonella reicheli* همراه با جلبک آهکی *Lithocodium aggregatum* نشانگر آغاز سازند سروک به سن سنتومانین زیرین است. فرامینیفرهای موجود در سازند کژدمی شامل:

Ammobaculites goodlandensis, *Marsonella trochus*, *Hemicyclammina sigali*, *Praechrysalidina infracretacea*, *Orbitolina concava*, *Orbitolina (Conicorbitolina) conica*, *Orbitolina (Orbitolina) subconcava*, *Neomeris cretacea*, *Salpingoporella (Orbitolina) sp.*

Trinocladus tripolitanus, *Permocalculus irenae*, *Dissocladiella deserta*.

بر اساس تجمع و همراهی فرامینیفرها و جلبک‌های آهکی شش زون تجمعی شناسایی شدند که عبارتند از:

Dictyoconus arabicus ass. zone;

Salpingoporella annulata concurrent zone;

Hemicyclammina sigali ass. zone;

Orbitolina (orbitolina) subconcava ass. zone;

Nezzazatinella picardi ass. zone;

Lithocodium aggregatum ass. Zone.

واژه‌های کلیدی: آلبین - سنتومانین، پالتواکولوژی، جلبک‌های آهکی، شمال شیراز.

Biostratigraphy of Kazhdumi Formation in Naghsh-e- Rostam Mountain

M.Parvaneh Nejad Shirazi¹, Sh. Ghahramani² & A. Kheradmand²

1) Department of Geology, Payam-e- Noor University, Shiraz, I. R. Iran

2) Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Bahonar Kerman, Kerman, I. R. Iran

*Correspondence Author

Abstract

The Kazhdumi Formation (Albian - Cenomanian) is one of the rock units of Bangestan group that is located in the Zagros Folded Zone. In this study the Kazhdumi Formation has a thickness of 222 m. The boundary between Kazhdumi and Dariyan formations is disconfirm, which is characterized by Iron oxide and glauconite layers which shows epirogeny that is confirmed by paleontological evidences. The presence of some foraminifera such as *Nezzazatinella*

picardi, *Scandonea* sp., *Daxia cenomania*, *Choffatella* sp., *Pseudolituonella reicheli* together with calcareous algae, such as *Lithocodium aggregatum* in the Sarvak Formation, represent an early Cenomanian age.

The microfossils in Kazhdumi Formation are: *Ammobaculites goodlandensis*, *Marsonella trochus*, *Hemicyclammina sigali*, *Praechrysalidina infracretacea*, *Orbitolina (Orbitolina) concava*, *Orbitolina (Conicorbitolina) conica*, *Orbitolina (Orbitolina) subconcava*, together with calcareous algae such as: *Neomeris cretacea*, *Salpingoporella* sp., *Trinocladus tripolitanus*, *Permocalculus irenae*, *Dissocladdella deserta*.

Based on assemblage zone of foraminifera and calcareous algae, 6 different biozones were recognized, which are:
Dictyoconus arabicus ass. zone;
Salpingoporella annulata concurrent zone;
Hemicyclammina sigali ass. zone;
Orbitolina (Orbitolina) subconcava ass. zone;
Nezzazatinella picardi ass. zone;
Lithocodium aggregatum ass. zone.

Key words: Albian-Cenomanian, calcareous algae, north of Shiraz, paleoecology.

(James & Wynd 1965) رخسارهای کم ژرفای آهکی تشکیل شده است

۱- مقدمه

پیش روی دریای کژدمی در ناحیه فارس با تشکیل یک واحد آواری مشخص می شود. این واحد نشانه وجود یک ناپوستگی در مرز سازند های داریان و کژدمی در آن ناحیه است. این واحد در ناحیه فروافتاده دزفول که در وسط سازند کژدمی جای دارد به خوبی با واحد هم ارز آن در ناحیه فارس (قاعده سازند کژدمی) مطابقت دارد. این واحد در چاههای عراق و کویت رشد بیشتری داشته، به طوری که تمامی سازند کژدمی با رخساره شیل به ماسه سنگ و سیلتستون های سازند های نهر عمر و بورگان در عراق و کویت تبدیل می شوند (Ziegler 2001). سازند کژدمی به طرف جبهه کوهستانی زاگرس به سنگ آهک تغییر رخساره می دهد. امتداد و راستای حوضه رسوی این سازند در جهت شمال غرب-جنوب شرق بوده است (قلاوند ۱۳۷۵).

در این مطالعه ۶ بیوزون بر اساس فرامینیفرها و جلبک های آهکی در سازند کژدمی در شمال شیراز معرفی و مورد بررسی قرار گرفتند.

۲- (وشن مطالعه)

تعداد ۱۵۰ مقطع نازک به طور سیستماتیک از ۱۴۲ نمونه، در جهت عمود بر امتداد لایه بندی تهیه شد و در آزمایشگاه توسعه میکروسکوپ بینوکولار مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به وجود فرامینیفرها و جلبک های آهکی، شش زون تعیین گردید. فرامینیفرها بر اساس مطالعات لوبلیش و تپان (Loeblich & Tappan 1987) و جلبک های آهکی سبز با توجه به مطالعات دلوفر (Deloffre 1988) (شناسایی شدند. از نرم افزارهای ویژه ای مانند Garmin Map source 2008

اولین بار نام آهک بنگستان را برای آهک های کرتاسه ای میانی یا آهک های رو دیست دار، آهک های هیپوریت دار و بالاخره آهک لشتگان به کار بر دند. جیمز و وايد (James & Wynd 1965) این نام را به گروه بنگستان ارتقاء دادند که شامل سازند های کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام است.

برش نمونه سازند کژدمی در تنگ گرگدا یا گرگدان واقع در یال جنوب غربی کوه میش در ۷ کیلومتری شمال شرقی دوگنبدان قرار دارد. نام سازند از قلعه هی کژدمی در ناحیه فروافتادگی دزفول انتخاب شده است. قبل این سازند قسمتی از شیل های آمونیت دار محسوب می شد و گاهی آن را سازند عباد نیز اطلاق می کردند (مطیعی ۱۳۸۲). ضخامت این سازند در برش نمونه ۲۱۰ متر تخمین زده شده است ولی مطالعات جدید نشان دادند که حدود ۱۲۰ - ۱۵۰ متر بالای این سازند توسعه واریزه پوشیده شده است. لیتولوژی سازند کژدمی، شیل های خاکستری و سیاه رنگ بیتومین دار می باشد. حد پایینی سازند کژدمی با سازند داریان با وجود زون های قرمز رنگ حاوی اکسید آهن مشخص می شود. این افق نشانگر خروج از آب سازند داریان در زمان آپین-آلین است. حد بالایی سازند کژدمی با سازند سروک به صورت هم شیب و تدریجی است. گاهی سازند سروک بر روی تناوبی از شیل-آهک سازند کژدمی قرار دارد (مطیعی ۱۳۸۲).

رسوب گذاری کرتاسه ای میانی در فارس و فروافتادگی دزفول با یک پیش روی جدید آغاز می شود که حاصل آن رسوبات شیلی و آهکی (سازند کژدمی) در اشکوب آلین است. کم عمق شدن دریا در اوخر آلین تا سومنین باعث رسوب مقادیر زیادی از آهک های کم عمق سازند سروک در پهنه وسیعی از حوضه زاگرس شده است (مطیعی ۱۳۸۲). سازند کژدمی در منطقه فارس به طور عمده از

۵- بیو زوئن اسپیون

در این مطالعه بر اساس فرامینیفرهای شاخص همراه با جلبک‌های مرز سازند کردمی با سازند داریان به صورت ناپیوستگی فرسایشی (Disconformity) است. وجود افق شاخص از جنس اکسید آهن و نیز مارن شدیداً گلوکوئیتی در حد بین سازندهای فوق نشانگر یک نبود رسوب‌گذاری (دیاستم) می‌باشد که بر اساس شواهد فسیلی نیز اثبات می‌گردد و تأکید بر خشکی زایی (Epirogeny) در حد بین سازندهای فوق الذکر است (تصویر ۳).

مرز بالایی این سازند با آهک‌های مارنی سازند سروک به صورت هم‌شیب و تدریجی می‌باشد، از نظر فسیل‌شناسی حضور فرامینیفرهای *Scandonia* sp., *Daxia cenomania*, *Choffatella* sp., همراه با جلبک‌های آهکی *Pseudolituonella reicheli* نشانگر آغاز سازند سروک به سن سنتومانین زیرین است.

آهکی تعداد ۶ زون معرفی و شناسایی شد (تصویر ۴).

۱-۵ (زن تهمعنی *Dictyoconus arabicus*)


این زون با ظهور و انقراض *Dictyoconus arabicus* مشخص می‌گردد. فرامینیفرهای همراه در این زون شامل: *Orbitolina* sp., *Orbitolina (Mesorbitolina) texana*, *Haplophragmoides* sp., *Everticyclamina hedbergi* و *Dictyoconus arabicus*

این زون که در آهک‌های خاکستری متوسط لایه بخش فوقانی سازند داریان به ضخامت ۳۳ متر گسترش دارد، معادل زون ۱۶ وایند (Wynd 1965) است، سن این زون با توجه به مجموعه فسیلی آپسین در نظر گرفته شده است.

۲-۵ (زن بروفوردی *Salpingoporella annulata*)

این زون که یک زون بینابینی می‌باشد با انقراض *Dictyoconus* و *Marsonella borennimanni* و پیدایش *Valserina borennimanni* و *Globigerinelloides* sp. و *trochus* (Pl. 1, fig. 14) شروع می‌شود.

با پیدایش فرامینیفرهای پلاژیک *Favusella washitensis* (Pl. 1, fig. 13) و *Hedbergella trochoidea* (Pl. 1, fig. 9) فرامینیفر بتیک *Salpingoporella annulata* و *Salpingoporella annulata* آهکی (Pl. 1, fig. 1) *muehlbergii* (Pl. 1, fig. 1) پایان می‌یابد. این زون به ضخامت ۱۹



تصویر ۱- نقشه‌ی راههای دسترسی به مقطع مورد مطالعه
(اقباس از Garmin 2008)

Rock Works 1998, Excel, Adobe Photoshop CS Works 2008 جهت این مطالعه استفاده گردید.

۱۱- موقعیت مغایری

منطقه‌ی مورد مطالعه در موقعیت جغرافیایی $48^{\circ} 40'$ E و $30^{\circ} 96'$ N در ارتفاع ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ متری کوه نقش رستم واقع در ۱۰ کیلومتری شمال شرق شیراز و ۱۰ کیلومتری غرب آثار باستانی نقش رستم قرار دارد (تصویر ۱).

۱۲- توصیف میدنه‌شناسی

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که منطقه‌ی مورد مطالعه از نظر چینه‌شناسی در منطقه‌ی فارس داخلی قرار می‌گیرد. از دیدگاه چینه‌شناسی، واحدهای سنگ‌چینه‌ای موجود در منطقه از قدیم به جدید شامل سازندهای داریان، کردمی و سروک می‌باشد (تصویر ۲). در این ناحیه سازند کردمی که هدف اصلی این مطالعه می‌باشد، از تناوب سنگ آهک و آهک‌های مارنی خاکستری رنگ تشکیل شده است.



تصویر ۲- ترتیب قرارگیری واحدهای سنگچینهای در کوه نقش رستم

subconcava



تصویر ۳- مرز سازند داریان و کژدمی در منطقه مورد مطالعه

مترازکهای نازک لایه‌ی سازند داریان گسترش دارد و سن آن بر اساس فسیل‌های موجود آپسین - آلین پایینی می‌باشد.

(*Orbitolina*) *subconcava* مشخص می‌شود. همچنین زون جلبکی (*Dissocladella deserta* (Pl. 1, fig. 3)) در این زون وجود دارد.

در این زون فرامینیفرهای

Trocholina Favusella washitensis Marsonella trochus, sp., *Praechrysalidina infracretacea*, (Pl. 1, figs. 10, 11), *Cuneolina pavonia*, *Orbitolina (Orbitolina) concave*, (Pl. 1), *Orbitolina (Conicorbitolina) conica*, (Pl. 1, fig. 7), *Ammobaculites Pseudocyclammina* sp., *Coskinolina* sp., *Coskinolina* sp., *Dictyoconus* sp. sp., و جلبک‌های

Salpingoporella sp., (Pl. 1, fig. 1), *Salpingoporella dinarica*, *Trinocladus* 4, 5, 2), *Neomeris* sp., (Pl. 1, figs. 1, 2), *Permocalculus* sp., *Permocalculus irenae tripolitanus*, *Clypeina* sp. (Pl. 1, fig. 6) و


را می‌توان نام برد. این زون با ضخامت ۱۶۰ متر معادل زون شماره‌ی ۱۸ وايند (Wynd 1965) می‌باشد و در آهک‌های متوسط لایه‌ی سازند کژدمی شناسایی شد.

متر در آهک‌های نازک لایه‌ی سازند داریان گسترش دارد و سن آن بر اساس فسیل‌های موجود آپسین - آلین پایینی می‌باشد.

۴-۴-۵- زون همکاران (*Hemicyclammina sigali*)
زون (*Hemicyclammina sigali* (Pl. 1, fig. 9)) با حضور *Marsonella*, *Haplophragmoides* sp., *Orbitolina* sp. و فرامینیفر پلاژیک *Favusella washitensis trochus* مشخص می‌شود.

از جلبک‌های آهکی می‌توان از *Salpingoporella dinarica* و *Salpingoporella* sp. (Pl. 1, fig. 2) *Salpingoporella* sp. نام برد که در آهک‌های مارنی و آهک‌های متوسط لایه‌ی سازند کژدمی به سن آلین زیرین تا میانی و با ضخامت ۱۵ متر گسترش دارند. این زون معادل با زون شماره‌ی ۱۷ وايند (Wynd 1965) می‌باشد.

۴-۴-۵- تاکسون (نجه) (*Orbitolina* (*Orbitolina*))
این زون با پیدایش و انقراض (*Orbitolina* (Pl. 1, fig. 8))



تصویر ۴- ستون چینه‌شناسی و بیوزوناسیون سازند کژدمی در کوه نقش رستم

۶ زون تجمعی شناسایی شد که میان سن آلبین - سنومانین زیرین برای این سازند می‌باشد.

بر اساس تجمع و همراهی فرامینیفرها و جلبک‌های آهکی ۶ زون تجمعی شناسایی شدند که عبارتند از:

Dictyoconus arabicus ass. zone;
Salpingoporella annulata concurrent zone;
Hemicyclammina sigali ass. zone;
Orbitolina (orbitolina) *subconcava* ass. zone;
Nezzazatinella picardi ass. zone;
Lithocodium aggregatum ass. zone.

مراجع

فلاوند، د.، ۱۳۷۵، "لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیوگرافی سازندهای داریان و کردمی در جنوب غرب ایران (نواحی فارس و فروفتادگی دزفول)"، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی علوم زمین، ۲۹۰ ص.

مطیعی، د.، ۱۳۸۲، "زمین‌شناسی ایران (چینه‌شناسی زاگرس)"، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ۵۳۶ ص.

Deloffre, R., 1988, "Nouvelle taxonomie des algues dasycladales (New taxonomy of dasycladale algae)", *Centres Rech. Explor Prod. Elf-Aquitaine*, Vol. 12 (1): 165-217.

Garmin map source, 2008, "Garmin Corporation", WWW.garmin.com

James, G. A. & Wynd, J. G., 1965, "Stratigraphic nomenclature of the Iranian oil consortium agreement area", *Bull. AAPG*, Vol. 49(12): 2182-2245.

Loeblich, A. R. & Tappan, H., 1987, "Foraminifera genera and their classification", *Van Nostrand Reinhold Co., New York*, 976p.

Owen, R. M. S. & Nasr, S. N., 1958, "Stratigraphy of the Kuwait-Basra area", In: *Habitat of oil, AAPG Memoir 1*: 1252-1278.

Smout, A. H., 1956, "Three new Cretaceous genera of foraminifera related to the Ceratobuliminidae", *Micropaleontology*, Vol. 2 (4): 335-345.

Wynd, J. G., 1965, "Biofacies of the Iranian oil consortium agreement area", *Unpublished Rep., Rep. No. 1082*: 66p.

Ziegler, M. A., 2001, "Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences", *Geo Arabia*, Vol. 6 (3): 445-504.

۵-۵- زون تجمعی *Nezzazatinella picardi*

این زون با پیدایش و انتراض *Predorothia Quadrulina* sp. و ظهور *Biloculina* sp. و *Nezzazatinella picardi* sp. مشخص می‌شود.

از فرامینیفرهای همراه این زون می‌توان به فرامینیفر پلاژیک *Favusella washitensis* و فرامینیفرهای بتیک از *Orbitolina (Orbitolina) Pseudocyclammina* sp., *Orbitolina (Conicorbitolina) conica*, *conca*, *Orbitolina* *(Orbitolina) concave*, *Pseudocyclammina* sp., *Trinocladus* (Pl. 1, figs. 4, 5) جلبک‌های آهکی نظیر یافت. می‌شوند. ضخامت این زون ۷۱ متر می‌باشد و سن آن بر اساس مجموعه‌ی فسیلی، آلبین تا سنومانین و معادل زون شماره‌ی ۱۹ وايند (Wynd 1965) در نظر گرفته شد.

۴-۵- زون تجمعی *Lithocodium aggregatum*

این زون با ظهور و انتراض *Pseudolituonella reicheli* و جلبک *Lithocodium aggregatum* پایان می‌یابد. همچنین در این زون فرامینیفرهای نظیر:

(Pl. 1, *Choffatella* sp., *Daxia cenomania* *Biloculina* sp., fig. 8), *Orbitolina (Orbitolina) concave*, *Orbitolina (Conicorbitolina) conica* (Pl. 1, fig. 7), *Dictyoconus* sp., *Ammobaculites* sp., *Coskinolina* sp., *Nezzazata conica*, *Pseudocyclammina* sp., *Cuneolina pavonia* (Pl. 1, fig. 10, 11), *Praechrysalidina infracretacea*

و جنس و گونه‌های پلاژیک *Favusella washitensis* (Pl. 1, fig. 13) و جلبک *Marsonella trochus* (Pl. 1, *Neomeris* sp.) و *Trinocladus tripolitanus*, *Trinocladus* sp. figs. 4, 5), *Lithocodium* و *Permocalculus irenae* (Pl. 1, fig. 6), *aggregatum* وجود دارد.

این زون با ضخامت ۶۲ متر با سن سنومانین با زون ۲۱ وايند (Wynd 1965) معادل می‌باشد که در کویت و حجاز با نام سازند مددود (Owen & Nasr 1958) گزارش شده است. اسموت (Smout 1956) نیز همین پیشنهاد را داده است ولی این احتمال که قسمت پایینی زون، سن آلبین داشته باشد را مردود ندانسته است. سازند خطیبه بر روی سازند مددود به صورت قابل انطباق قرار می‌گیرد.

۴- نتیجه‌گیری

بر مبنای انتشار چینه‌شناسی، ظهور و از بین رفتن گونه‌های شاخص روزن‌داران و جلبک‌های آهکی در سازند کردمی در برش مورد مطالعه

Plate I




Plate 1

- 1- *Salpingoporella muehlbergii* (Lorenz 1902), Pia 1918, oblique section, thin section D4.
- 2- *Salpingoporella* sp., Pia 1918, transverse section, thin section D5.
- 3- *Dissocladella deserta* Elliott 1960, transverse section, thin section K44.
- 4, 5- *Trinocladus triopolitanus* Raineri 1922, oblique section, thin section K43, K44.
- 6- *Perioculculus irenae* Elliott 1958, transverse section, thin section K38.
- 7- *Orbitolina (Conicorbitolina) conica* d' Archaic 1837, longitudinal section, thin section K26.
- 8- *Orbitolina (Orbitolina) concava* Parker & Jones 1860, longitudinal section, thin section K38.
- 9- *Hemicyclammina sigali* Maync 1953, transverse section, thin section K7.
- 10, 11- *Cuneolina pavonia* d'Orbigny 1839, longitudinal section, thin section K13 and transverse section, thin section K23.
- 12- *Ammobaculites goodlandensis* Gushman & Alexander 1930, longitudinal section, thin section K60.
- 13- *Favusella washitensis* (Carsey 1926), transverse section, thin section K10.
- 14- *Marsonella trochus*, longitudinal section, thin section K6.