

بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای محیطی در میزان توده اسفنج‌های سازه‌های مصنوعی

(رأس بحرکان) واقع در شمال غربی خلیج فارس

چکیده

این بررسی در منطقه استقرار سازه‌های مصنوعی واقع در سواحل بحرکان استان خوزستان در طی چهار فصل از بهار ۱۳۸۸ تا آخر زمستان ۱۳۸۸ انجام پذیرفت. در مجموع ۴ ایستگاه برای نمونه‌برداری در نظر گرفته شد. یک ایستگاه در محل سازه‌های قدیمی (D) و سه ایستگاه در محل سازه‌های جدیدتر (A, B, C) انتخاب گردید. نمونه‌برداری با کمک غواص در عمق ۱۲ متری و به صورت تصادفی با انداختن کوادرات 0.25×0.25 متر مربع انجام شد. نمونه‌های جمع آوری شده شناسایی و میزان توده زنده آن‌ها در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان تخمین زده شد. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما (درجه سانتی‌گراد)، شوری (قسمت در هزار)، اکسیژن (میلی گرم در لیتر)، pH و کدورت (واحد کدورت نفولومتری یا NTU) در کلیه فصول در هر ایستگاه توسط دستگاه پرتابل اندازه‌گیری و ارتباط آن‌ها با میزان توده زنده در ۱۰ گونه اسفنج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان دهنده سازش این گروه از جانداران نسبت به تغییرات دما و شوری موجود در منطقه می‌باشد، به گونه‌ای که با افزایش شوری در فصول سرد سال میزان توده زنده در اسفنج‌ها افزایش و با کاهش میزان شوری در فصول گرم سال از میزان توده زنده در اسفنج‌ها کاسته شده است.

واژگان کلیدی: اسفنج، سازه‌های مصنوعی، بحرکان، فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب،

خلیج فارس.

نگین درخشش^{۱*}

احمد سواری^۲

بابک دوست شناس^۳

سیمین دهقان مدیسه^۴

عبدالمجید دورقی^۵

۱. دانشگاه علوم و فنون دریایی، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، خرمشهر، ایران

۲. دانشگاه علوم و فنون دریایی، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، استاد گروه بیولوژی دریا، خرمشهر، ایران

۳. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، استادیار گروه بیولوژی دریا، خرمشهر، ایران

۴. مرکز تحقیقات آبی پروری جنوب کشور، استادیار بخش هیدرولوژی، اهواز، ایران

*مسئول مکاتبات:

negin.biology@gmail.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۷/۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۲/۲۱

مقدمه

اسفنج‌ها یکی از مهم‌ترین جانداران بنتیک معلق‌خوار محسوب می‌شوند. اعضای این شاخه در بیشتر عرض‌های جغرافیایی و مناطق (معتدله، گرمسیری و قطبی) یافت می‌شوند (Bell, 2007; Diaz *et al.*, 1990; Dayton *et al.*, 1974; Lilly *et al.*, 2004; Bell and Smith, 2004; Bell and Barnes, 2000).

لاروهای این شاخه جانوری نیازمند مکانی سخت و پایدار هستند که بدین طریق به آن چسبیده و شروع به رشد می‌نمایند. زیستگاه‌های سخت با دارا بودن سطوح مستحکم و پایدار مکان مساعدی برای رشد لارو موجوداتی نظیر کلونی‌های اسفنج محسوب می‌شوند. با توجه به این که غالب سواحل استان خوزستان از نوع گلی می‌باشد، شیلات استان خوزستان به‌منظور افزایش تنوع زیستی جانداران آبی و در نهایت افزایش میزان

صید ماهیان موجود در منطقه طی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ منطقه‌ای تحت عنوان زیستگاه‌های مصنوعی در سواحل بحرکان ایجاد نمود.

عوامل محیطی مختلفی در پراکنش گونه‌های مختلف اسفنج نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. برخی از این عوامل شامل میزان رسوب‌گذاری (Konnecker, 1973)، سطوحی که اسفنج‌ها بر روی آن‌ها می‌چسبند (Konnecker, 1973; Barthel and Tendal, 1993)، میزان نور در دسترس (Sara *et al.*, 1979; Cheshire and Wilkinson, 1991)، جریان آب (Barnes, 1999)، میزان مواد غذایی موجود در ستون آب و دما (Storr, 1976)، میزان پراکنش لارو گونه‌های مختلف (Bergquist *et al.*, 1970)، عمق (Witman and Sebens, 1990)، رقابت (Russ, 1982) و ... می‌باشد که در

بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای محیطی در میزان توده زنده اسفنج های سازه های مصنوعی ...

نمودن شرایط مطلوب محیطی در زمینه کشت بهتر گونه‌ها در محیط‌های آزمایشگاهی است.


مواد و روش‌ها

مطالعه حاضر در منطقه استقرار سازه‌های مصنوعی در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شد. استقرار سازه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در منطقه رأس بحرکان در سواحل شمال غربی خلیج فارس واقع در استان خوزستان بر روی بستری از جنس گلی-شنی صورت گرفت. جنس سازه‌ها از بتون و به ابعاد ۱ متر مکعب در نظر گرفته شد. در ساخت سازه‌ها از دو نوع سازه هرمی شکل (Fish haven) و گنبدی شکل (Reef Ball) استفاده شده بود. به طور کلی ۴ ایستگاه جهت مطالعه در نظر گرفته شد. ۳ ایستگاه واقع در سازه‌های احداث شده در سال ۱۳۸۳ (سازه‌های جدیدتر) که شامل ایستگاه های A، B و C و یک ایستگاه در سازه‌های احداث شده در سال ۱۳۸۲ (سازه‌های قدیمی‌تر) که ایستگاه D می‌باشد، انتخاب شد. موقعیت ایستگاه‌ها و انواع سازه‌ها در منطقه مورد مطالعه در شکل و جدول ۱ نشان داده شده است.

این میان، دمای آب یکی از مهم‌ترین پارامترهای محیطی است که نقش به‌سزایی را در تنظیم دوره‌های تولیدمثلی در گونه‌های مختلف اسفنج در فصول مختلف سال دارد (Simpson, 1974; Wells et al., 1964; Storr, 1964).

با مطالعه تغییرات توده زنده اسفنج‌ها در محیط‌های طبیعی می‌توان به نتایج سودمندی در زمینه رشد گونه‌های اسفنج در فصول مختلف سال دست یافت. چندین تحقیق در زمینه ارتباط بین تغییرات دمای آب و میزان رشد در گونه‌های مختلف اسفنج‌ها (Barthel, 1986; Garrabou and Zabala, 2001; Page et al., 2005; De Caralt et al., 2007) و تغییرات دمای آب و تاثیر آن‌ها بر رشد گونه‌های اسفنج گزارش شده (Duckworth and Pomponi, 2005)، اما تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه در سواحل خلیج فارس گزارش نشده است. با توجه به عدم اطلاعات کافی در زمینه شرایط مطلوب محیطی در پراکنش این گونه‌های با ارزش که بخش عظیمی از میزان توده زنده اکوسیستم‌های آبی را به خود اختصاص داده‌اند، به‌خصوص در سواحل شمالی خلیج فارس که مربوط به کشور ایران است، لزوم تحقیق در این زمینه آشکار می‌گردد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی فاکتورهای محیطی در افزایش میزان توده زنده گونه‌های اسفنج در منطقه به منظور فراهم



شکل ۱: موقعیت ایستگاه‌ها در زیستگاه‌های مصنوعی ایجاد شده در سواحل رأس بحرکان

جدول ۱: ویژگی انواع سازه های موجود در ایستگاه های مورد مطالعه

ایستگاه	نوع سازه
A	هرمی شکل
B	گنبدی شکل
C	هرمی شکل و گنبدی شکل
قدیم	مواد از رده خارج + RB and FH

مجله علمی - پژوهشی زیست شناسی دریا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سال چهارم، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۹۱

به همین دلیل برای محاسبه دقیق میزان فراوانی با توجه به فاصله بین بیشترین میزان و کمترین میزان توده زنده دسته‌های متفاوتی از گونه‌ها به فواصل وزنی معین تعیین گردید.

برای محاسبه وزن تر، گونه‌ها به مدت ۵ دقیقه در کاغذ خشک کن قرار داده شده تا آب اضافی از آن‌ها خارج شده، پس از آن برای تعیین وزن خشک از آن در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت استفاده گردید. برای تعیین وزن عاری از خاکستر، نمونه‌ها در دمای ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴ ساعت قرار گرفتند. پس از قرار دادن نمونه‌ها در دیسیکاتور، با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۱ گرم توزین شدند (Melao and Rocha, 1999).

از آنالیز واریانس یک‌طرفه، برای بررسی اختلاف میانگین متغیرها در بین ایستگاه‌ها و فصول استفاده شد. برای انجام آنالیز آنوا (ANOVA) ابتدا داده‌ها از نظر توزیع نرمال و همگنی واریانس‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. نرمال بودن داده‌ها توسط تست کولموگوروف-اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) و همگنی واریانس‌ها توسط تست لون (Leven) بررسی شد. کلیه آزمون‌های مذکور با استفاده از برنامه نرم‌افزاری SPSS.ver11.5 و نمودارها در برنامه اکسل رسم گردید. علاوه بر این، در این مطالعه به منظور نشان دادن میزان جورشدگی و سازگاری گونه‌ها نسبت به فاکتورهای محیطی از آنالیز MDS (Multy Dimentional Scale) (جدول ۲) و برای انجام این آنالیز از نرم‌افزار PRIMER.ver5 استفاده گردید.

نمونه‌برداری به صورت فصلی در آخرین ماه هر فصل (خرداد، شهریور، آذر، اسفند) از بهار ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۳۸۸ و با ۳ بار تکرار از هر ایستگاه به کمک غواص از سطوح شمالی، شرقی و غربی سازه‌ها در هر ایستگاه انجام شد.

نمونه‌ها به صورت تصادفی با انداختن کوادرات ۰/۲۵×۰/۲۵ متر مربع و خراشیدن سطوح توسط چکش و کاردک از بستر جداسازی، سپس در بسته‌های نایلونی برچسب زده شده حاوی الکل اتیلیک ۹۰ درصد قرار داده شدند. در هر ایستگاه به کمک دستگاه‌های شوری‌سنج، دستگاه pH متر و پرتابل (WTW) فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل شوری، دما، pH و اکسیژن محلول اندازه‌گیری و در نهایت توسط دستگاه سشی‌دیسک میزان کدورت اندازه‌گیری و ثبت گردید.

پس از انتقال نمونه‌های تثبیت شده در الکل اتانول ۹۰ درصد به آزمایشگاه، از تمامی آن‌ها عکس‌برداری شد (-Sony Dsc W230). برای شناسایی گونه‌های اسفنج و مشاهده ساختار اسکلتی (اسپیکول) از هر نمونه برش نازکی تهیه، آن را درون پتری‌دیش قرار داده و چند قطره اسید نیتریک به آن اضافه گردید. این مرحله تا زمان هضم کامل مواد آلی ادامه داشت (Chanas and Pawlik, 1995).

برای تعیین میزان تراکم در گونه‌های مختلف اسفنج، از روش امتیازدهی وزن تر استفاده شد (PERSGA/GEF, 2004; Perkol-Finkel and Benayahu, 2007).

نمونه‌های اسفنج به صورت کلونی بوده و با انداختن کوادرات و جدا کردن نمونه‌ها به وسیله کاردک از سطوح، امکان چند تکه شدن کلونی اسفنج در حین خراشیده شدن وجود داشت. به علت جمعیت انبوه مرجان‌ها، امکان مشاهده دقیق نمونه‌ها در تصاویر گرفته شده در حین نمونه‌برداری امکان پذیر نبود.

جدول ۲: سازگاری گونه‌ها بر اساس میزان تنش

میزان جورشدگی	تنش
ضعیف	>۰/۲
متوسط	۰/۱
خوب	۰/۰۵
خیلی خوب	۰/۰۲۵
عالی	۰

نتایج

فصل زمستان از بیشترین میزان توده زنده برخوردار بودند. با توجه به این که نمونه های جمع آوری شده از سه وجه مختلف سازه ها اختلاف معنی داری را نشان ندادند، از میانگین داده ها استفاده گردید.

به طور کلی، ۱۰ گونه اسفنج در منطقه شناسایی شد. در جدول ۳ نتایج حاصل از حضور و عدم حضور گونه ها در ایستگاه های مختلف نشان داده شده است. همان گونه که در جدول ۳ مشاهده می شود، بیشترین تمایل سکونت لارو گونه های اسفنج در غالب گونه ها در ایستگاه های B و D مشاهده می شود. غالب گونه ها در

جدول ۳: حضور (*) و عدم حضور گونه های شناسایی شده اسفنج در ایستگاه های مختلف (سال ۱۳۸۸)

گونه	فصل				بهار				تابستان				پاییز				زمستان			
	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A
<i>Dysidea fragilis</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Haliclona simulans</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Haliclona oculata</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Ircinia sp.</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Halichonria panacea</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Clathria mima</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Clathria sp.</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Spongia officinalis</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Chondrilla nucula</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<i>Aatos sp.</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

فصول مختلف سال نشان داد. این اختلاف در سایر پارامترها مشاهده نگردید. سنجش شوری آب منطقه نشان دهنده کمترین میزان شوری در فصل بهار با میانگین ۳۷/۸ قسمت در هزار و بیشترین میزان شوری در فصل پاییز با میانگین ۴۵/۷۹ قسمت در هزار بود. نتایج حاصل از تغییرات pH و اکسیژن محلول روند تقریباً یکسانی را در منطقه نشان داد. همچنین بیشترین میزان ثبت شده از این دو پارامتر در فصل پاییز به دست آمد.


نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب (دما و شوری) در فصول مختلف نمونه برداری در جدول ۴ نشان داده شده است. بررسی تغییرات دمای آب نشان داد که تفاوت دمایی نسبتاً قابل توجهی بین سردترین فصل سال (پاییز ۱۳۸۸) با میانگین دمای ۱۷/۰۷ درجه سانتی گراد و گرمترین فصل سال (تابستان ۱۳۸۸) با میانگین دمای ۳۱/۴۷ درجه سانتی گراد وجود دارد. نتایج حاصل از آنالیز آماری اختلاف معنی داری را در بین

جدول ۴: نتایج حاصل از تغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در فصول مختلف (سال ۱۳۸۸)

فصول	پارامتر	اکسیژن محلول (میلی گرم در لیتر)	pH	شوری (قسمت در هزار)	دما (درجه سانتی گراد)
بهار	۷/۲۲±۰/۰۲	۸/۰۸±۰/۰۳	۳۷/۸۰±۰/۰۰۵	۳۰/۵۱±۰/۰۴۵	
تابستان	۷/۰۱±۰/۰۳	۷/۶۱±۰/۰۱۳	۴۰/۴۳±۰/۰۰۱	۳۱/۴۷±۰/۰۴۹	
پاییز	۸/۱۱±۰/۰۲	۹/۰۳±۰/۰۰۱	۴۵/۷۹±۰/۰۰۵	۱۷/۰۷±۰/۰۱۳	
زمستان	۸/۰۵±۰/۰۰۱	۸/۳۲±۰/۰۰۸	۴۲/۹۳±۰/۰۰۵	۱۸/۳۷±۰/۰۱۱	

شوری دارای رابطه معنی داری می باشد ($P < 0.05$)، در حالی که میزان توده زنده اسفنجها با تغییرات دما رابطه معنی داری را نشان نداد (شکل ۲).


ارتباط بین پارامترهای محیطی با میزان تغییرات توده زنده (وزن تر) اسفنجها با آزمون همبستگی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که میزان توده زنده در اسفنجها با تغییرات



شکل ۲: مقایسه میزان توده زنده اسفنجها با دما (الف) و شوری (ب) در فصول مختلف (سال ۱۳۸۸)

بدست آمد. ضریب تعیین (R^2) این رابطه برابر با ۰/۸۸۲۷ محاسبه گردید (شکل ۳).

معادله رگرسیون میان میزان توده زنده در اسفنجها با میزان شوری موجود در منطقه به صورت $y = 23/053x + 675/81$




شکل ۳: همبستگی میزان توده زنده اسفنجها با شوری در فصول مختلف (سال ۱۳۸۸)

مختلف در شکل ۴ ترسیم شده است. با افزایش میزان کدورت در فصل بهار میزان توده زنده کاهش و با کاهش میزان کدورت در فصل پاییز میزان توده زنده در اسفنجها افزایش یافته است.

برای نشان دادن وضوح میزان اختلاف کدورت در فصول مختلف سال از سه فصل معتدل (بهار)، گرم (تابستان) و سرد سال (پاییز) استفاده گردید. میزان ارتباط بین توده زنده (گرم در متر مربع) در اسفنجها با میزان کدورت (واحد کدورت نفلومتری) در فصول

بررسی تغییرات فصلی فاکتورهای محیطی در میزان توده زنده اسفنج های سازه های مصنوعی ...




شکل ۴: مقایسه میزان توده زنده اسفنج ها با تغییرات کدورت آب در سه فصل معتدل، گرم و سرد (سال ۱۳۸۸)

نتایج آنالیز MDS بین پارامترهای محیطی با میزان توده زنده اسفنج ها در فصول مختلف نمونه برداری میزان کم استرس (۰/۰۱ = تنش) را در منطقه نشان داد (شکل ۵). کمترین میزان سازگاری نسبت به پارامترهای محیطی در گونه *Ircinia sp.* مشاهده شد.

نتایج آنالیز MDS بین پارامترهای محیطی با میزان توده زنده اسفنج ها در فصول مختلف نمونه برداری میزان کم استرس

۰/۰۱ = تنش



شکل ۵: نتایج آنالیز MDS بین پارامترهای محیطی با میزان توده زنده اسفنج ها (سال ۱۳۸۸)

سکونت لارو غالب گونه های اسفنج فراهم نموده است. طبق گزارشات Perkol-Finkel و همکاران (۲۰۰۶)، از جمله عوامل موثر بر سازمان دهی ترکیب گونه ها در سازه های مصنوعی، طراحی ساختمان (شکل هندسی سازه ها)، فاصله سازه ها از یکدیگر و در نهایت عمق و سن سازه ها می باشد. عمر سازه ها تأثیر فراوانی بر روی ساختار جمعیتی موجودات دارد، به گونه ای که با اقامت گزیدن گروه های اولیه پیچیدگی سطح افزایش یافته و سازه ها آماده سکونت و جذب گروه های بعدی جانوری می شوند.

بحث و نتیجه گیری

در مطالعه حاضر از اشکال مختلف سازه شامل سازه هرمی شکل و سازه گنبدی شکل استفاده و مشاهده شد که برخی از گونه ها تمایل بیشتری برای سکونت در نوع خاصی از سازه را دارا می باشند. برخی از گونه ها مانند *H. oculata* و *Ircinia sp.* و *H. panacea* در تمام فصول نمونه برداری فقط بر روی نوع خاصی از سازه (گنبدی شکل) مشاهده شدند. بر طبق نتایج بدست آمده چنین به نظر می رسد که سازه نوع گنبدی شکل در ایستگاه B با توجه به شیب کم تر سازه محیط مناسبتری را برای

تحقیقات انجام گرفته توسط Barthel و همکاران (۱۹۹۱) و Riesgo و همکاران (۲۰۰۷)، آزاد سازی لارو اسفنج‌ها در زمان تولیدمثل وابسته به زیستگاه و دمای آب منطقه است. طبق گزارشات انجام گرفته توسط آن‌ها، دما عامل اصلی کاهش میزان توده زنده و اندازه اسفنج‌های بالغ در زمان تولیدمثل گزارش شده است. بنابراین تغییر فصول به خصوص تغییر در درجه حرارت آب می‌تواند اثرات زیادی بر جوامع اسفنج‌ها داشته باشد (Levin *et al.*, 2000). در مطالعه حاضر دمای آب از تابستان تا پاییز روند نزولی و از زمستان تا بهار روند صعودی را نشان می‌دهد. Simpson (۱۹۸۰) بیان داشت تغییرات فصلی و شرایط محیطی بر تعداد و پراکنش گونه‌های زیستی و اجتماعات فولینگ روی سازه‌ها اثر می‌گذارد (Baily-Brack, 1989).

تغییر فصول با جریان‌های جزر و مدی و مقادیر ورودی آب شیرین می‌تواند سبب بروز نوسانات شوری در یک منطقه شود (Kanaya and Kikuchi, 2008). تغییرات شوری در آب‌های ساحلی دارای دامنه وسیعی است و مقادیر آن به محل، عمق، فصل و جریان‌ات جزر و مدی بستگی دارد (Vizakat *et al.*, 1991). در آب‌های مناطق گرمسیری شوری تاثیر مثبتی در تولید جوامع کفزی دارد. دامنه تغییرات شوری در مطالعه کنونی ۳۷/۸-۴۵/۷۹ گرم در کیلوگرم بوده است. از آن جایی که تفاوت در میزان شوری به تغییرات دمای سالانه و سرعت تبخیر بستگی دارد، به نظر می‌رسد تغییر در مقادیر شوری متاثر از شرایط جوی منطقه باشد. با توجه به نتایج حاصل به نظر می‌رسد در فصول سرد سال بیش‌ترین میزان تبخیر در منطقه رخ می‌دهد.

طبق گزارشات دهقان مدیسه و همکاران (۱۳۸۴) در این منطقه، بیش‌ترین میزان سختی آب مربوط به فصول سرد سال (پاییز و زمستان) و به دنبال آن بیش‌ترین مقادیر شوری نیز در همین فصول گزارش شده است. از آن جا که عمده املاح سازنده شوری در آب دریا، یون‌های کلرید و املاح کلسیم، منیزیم و سدیم بوده و با توجه به این که در آب‌های سخت میزان املاح کلسیم و منیزیم بالا است، لذا آب دریا همان‌طور که دارای شوری بالاست، دارای سختی بالا نیز می‌باشد.

اکسیژن محلول یکی از مهم‌ترین پارامترها در حیات جانداران آبی به‌خصوص در موجودات فیلتر کننده نظیر کلنی‌های اسفنج

به‌طور کلی شکل سازه‌های مصنوعی، نقش مهم‌تری را نسبت به سایر عوامل در ساختار اجتماعات کفزی برعهده دارد، زیرا پیچیدگی ساختاری بیش‌تر، منجر به فراهم شدن زیستگاه‌های بیشتر برای سایر جانداران و در نهایت منجر به افزایش تنوع زیستی در اکوسیستم‌های آبی می‌شود (Duedall and Champ, 1991; Svane and Peterson, 2001).

میزان بقاء و پایداری غالب گونه‌های اسفنج در سازه‌های مورد مطالعه در فصل پاییز بیش‌تر از سایر فصول بوده است. به طور کلی آب‌های سرد به چند طریق منجر به افزایش میزان بقاء و پایداری گونه‌های اسفنج شده‌اند. به نظر می‌رسد کاهش تنفس در این گونه از آب‌ها منجر به کاهش استرس در اسفنج‌ها می‌گردد (Burlando *et al.*, 1992; Cheshire *et al.*, 1995). همچنین پیناکودرم در این آب‌ها سریع‌تر رشد کرده (Duckworth *et al.*, 1997) و رشد میکروبی در ساختار بافتی اسفنج‌ها کمتر رخ می‌دهد (Vacelet *et al.*, 1994; Hummel *et al.*, 1988). در نتیجه عفونت و بیماری کاهش و در نهایت میزان بقاء و پایداری توده زنده در گونه‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل غالباً مطالعات کشت و پرورش اسفنج‌ها نیز در فصول سرد سال (زمستان) و در آب‌های مناطق سردسیر انجام می‌گیرد (Duckworth and Battershill, 2003).

بخش مهمی از توده زنده و تولید در اکوسیستم‌های دریایی ساحلی متعلق به پالیده خوارهای کفزی می‌باشد. نرم‌تنان و اسفنج‌ها در میان تمام گروه‌های جانوری تمایل بیش‌تری برای زندگی در اجتماعات بسترهای سخت موجود در مناطق ساحلی نواحی گرمسیری، دریای معتدل، بسترهای کِلپ و آب‌های قطبی دارند. میزان رشد (توده زنده) و تکثیر پالیده خوارهای کفزی در دریا‌های گرمسیری، معتدل و قطبی به میزان زیادی تابع نوسانات فصلی است (Ribes *et al.*, 1998).

نتایج حاصل از آزمون همبستگی، بیان‌گر تغییرات دما با میزان توده زنده می‌باشد. به گونه‌ای که، با کاهش دما در فصول سرد سال میزان توده زنده در غالب گونه‌های اسفنج افزایش چشمگیری داشته است. تغییرات دمایی، از عوامل مهم در تولیدمثل موفق موجودات کفزی به شمار می‌رود. تغییرات محدود در دمای آب می‌تواند در بقاء و پایداری اسفنج‌ها تأثیر گذار باشد (Battershill and Page, 1996). طبق

در کل با توجه به نتایج حاصل از آزمون MDS (شکل ۵) و وجود بستری سخت برای سکونت لارو گونه های اسفنج به نظر می رسد، جانداران این منطقه با میزان کدورت و شوری موجود در منطقه سازگار شده اند و میزان کدورت موجود در سواحل بحرکان باعث ایجاد استرس و مانع رشد جانداران فیلتر کننده ای نظیر گونه های مختلف اسفنج نشده است.

با توجه به عدم اطلاعات موجود در زمینه میزان توده زنده (گرم در متر مربع) در گونه های مختلف اسفنج، امکان مقایسه داده ها با سایر گزارشات فراهم نبود. تنها مطالعه موجود در جزیره هنگام واقع در سواحل جنوبی خلیج فارس مربوط به گزارش صادقی (۱۳۸۵) می باشد که در مطالعه خود بیان نمود غالب توده های اسفنج شناسایی شده در فصول سرد سال از بیشترین میزان توده زنده برخوردار بوده که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد.

منابع

دهقان مدیسه، س.، خلیفه نیل ساز، م.، مرزعاوی، م.، اسماعیلی، ف. و سبز علیزاده، س.، ۱۳۸۴. بررسی هیدرولوژیک و هیدروبیولوژیک خلیج فارس در آب های استان خوزستان. مرکز تحقیقات آبی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران، ۱۲۸ ص.

میرجلیلی، و.، ۱۳۷۳. ارتباط کلروفیل a و نوترینت ها با تراکم پلانکتون در بهره گیری از منابع آبی در آب های استان هرمزگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ۱۸۳ ص.

صادقی، پ.، ۱۳۸۵. شناسایی و بررسی ساختار اجتماعات اسفنج های جزیره هنگام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ۱۰۳ ص.

Al-Yamani, F. Y., Bishop, J., Ramadhan, E., Al-Husaini, M. and Al-ghadban, A. N., 2004. Oceanographic Atlas of Kuwaits Waters. Environmental Public Authority, 203p.

Bailey-Brack, J. H., 1989. Fouling community development on an artificial reef in Hawaii waters. Bull, Mar. Sci, 44: 580-597.

Barnes, D. K. A., 1999. High diversity of tropical intertidal zone sponges in temperature, salinity and current extremes. African J, Ecol, 37: 424-434.

Barthel, D., 1986. On the ecophysiology of the sponge *Halichondria panicea* in Kiel Bight. I. Substrate specificity, growth and reproduction, Mar. Ecol, Prog, 32: 291-298.

به شمار می رود که علاوه بر آن که در تنفس موجودات آبی نقش بسزایی را ایفا می کند، بر وضعیت اکسیداسیون احیای بسیاری از مواد شیمیایی دیگر نیز تاثیرگذار است. همچنین، مقدار کم اکسیژن در محیط های آبی برخلاف جو، شدیداً متغیر و کم است و توسط عوامل متعددی نظیر حرارت، شوری، تنفس و فتوسنتز تحت تأثیر قرار می گیرد. میانگین غلظت اکسیژن محلول در آب دریا ۵ میلی گرم در لیتر می باشد و مقادیر کمتر از ۵ میلی گرم در لیتر ممکن است سبب تغییر رفتار، کاهش رشد و تولیدمثل و مرگ و میر در گونه های حساس و تازه بالغین گردد (Al-Yamani et al., 2004). مقادیر اکسیژن در فصول پاییز و زمستان که درجه حرارت آب دارای کمترین مقدار می باشد، تقریباً بیشتر از سایر ماه ها گزارش شد. در این مطالعه دامنه تغییرات اکسیژن محلول نوسانات بسیار کمی را در طی فصول مختلف از خود نشان داد و ۷/۰۱ تا ۸/۶۶ میلی گرم در لیتر محاسبه شد.

pH یکی دیگر از مهم ترین پارامترهای شیمیایی زیستگاه های مختلف محسوب می شود که نه تنها به طور مستقیم بر تنوع و پراکندگی موجودات زنده تاثیر گذار است، بلکه طبیعت بسیاری از واکنش های شیمیایی در محیط های آبی را نیز فراهم می سازد. با توجه به این که آب دریا دارای خصلت بافری است، دامنه تغییرات pH در آن چندان زیاد نبوده و بین ۷ تا ۸/۵ متغیر می باشد (میرجلیلی، ۱۳۷۳). به نظر می رسد تغییرات میزان pH و اکسیژن محلول در فصول مختلف سال اثر کمتری نسبت به سایر پارامترهای محیطی در پویایی و تغییرات میزان توده زنده در گونه های مختلف اسفنج ها داشته است.

کدورت به عنوان عامل مهم در تعیین پراکنش و فون جانداران در یک ناحیه آبی محسوب می شود. هنگامی که میزان مواد معلق موجود در ستون آب بالا است، موجودات صافی خوار شانس کمتری برای تغذیه و بقاء دارند، زیرا گل و لای موجود در آب مانع تغذیه آن ها به صورت فیلتری می شود. در مطالعه حاضر با کاهش میزان کدورت آب، توده زنده در اسفنج ها افزایش یافته است. روند تغییرات معکوس در میزان توده زنده اسفنج ها با میزان کدورت، تایید کننده مطالب بالا است. به نظر می رسد کدورت آب موجود در منطقه عملکرد موجودات شکارچی را نیز محدود کرده است.

- a Mediterranean sponge species: *Corticium candelabrum* (Demospongiae: Homosclerophorida). *Mar, Ecol, Prog, Ser* (in press).
- Diaz, M. C., Alvarez, B. and Laughlin, R. A., 1990.** The sponge fauna on a fringing coral reef in Venezuela. In: Rützler, K. (Ed), *New Perspectives in Sponge Biology*. Smithsonian Institute Press, London, PP. 367-375.
- Duckworth, A. R., Battershill, C. N. and Bergquist, P. R., 1997.** Influence of explants procedures and environmental factors on culture success of three sponges. *Aquaculture*, 165: 251-267.
- Duckworth, A. R. and Battershill, C. N., 2003.** Developing farming structures for Production of biologically active sponge metabolites. *Aquaculture*, 217: 139-156.
- Duckworth, A. R. and Pomponi, S. A., 2005.** Relative importance of bacteria, microalga and yeast for growth of the demospongiae *Halichondria melandocia*. *Mar, Biol, Ecol*, 323: 151-159.
- Duedall, I. W. and Champ, M. A., 1991.** Artificial reefs: emerging science and technology. *Oceans*, 34: 94-101.
- Garrabou, J. and Zabala, M., 2001.** Growth dynamics in four Mediterranean demospongiae. *Estuarine Coastal Shelf Sci*, 52: 293-303.
- Hummel, H., Sepers, A. B. J., Wolf, L. D. and Melissen, F. W., 1988.** Bacterial growth on the marine sponge *Halichondria panicea* induced by reduced waterflow rate. *Mar, Ecol, Prog*, 42: 195-198.
- Kanaya, G. and Kikuchi, E., 2008.** Spatial change in macrozoobenthic community along environmental gradients in a shallow brackish lagoon facing Sendai Bay, Japan. *Estuarine, coastal and Shelf Science*, 78: 674-684.
- Konnecker, G., 1973.** Littoral and benthic investigations on the West Coast of Ireland. (Section A: Faunistic and ecological studies). The sponge fauna of Kilkieran Bay and adjacent areas. *Proceedings of the Royal Irish Academy*, 73: 450-472.
- Levin, L. A., Gage, J. D., Martin, C. and Lamont, P., 2000.** Macrobenthic community structure associated with the oxygen minimum zone, NW Arabian Sea: Pattern and Cause. *Deep-Sea Research*, 74: 189-226.
- Lilly, S. J., Wilson, K., Holeton, C., Reiswig, H. M., Austin, W. C. and Tunnicliffe, V., 2004.** **Barthel, D., Gutt, J. and Tendal, O. S., 1991.** New information on the biology of Antarctic deep-water sponges derived from underwater photography. *Marine Ecology Progress Series*, 69: 303-307.
- Barthel, D. and Tendal, O. S., 1993.** The sponge association of the abyssal Norwegian Greenland Sea: species composition, substrate relationships and distribution. *Sarsia*, 78: 83-96.
- Battershill, C. N. and Page, M. J., 1996.** Sponge aquaculture for drug production. *Aquatic update*, PP. 5-6.
- Bell, J. J. and Barnes, D. K. A., 2000.** A sponge diversity center within a marine island. *Hydrobiology*, 440: 55-64.
- Bell, J. J. and Smith, D., 2004.** Ecology of sponges in the Wakatobi region, south-eastern Sulawesi, Indonesia: richness and abundance. *J. Mar, Biol, Assoc*, 84: 581-591.
- Bell, J. J., 2007.** Contrasting patterns of species and functional composition for coral reef sponge assemblages. *Mar, Ecol, Prog*, 339: 73-81.
- Bergquist, P. R., Sinclair, M. E. and Hogg, J. J., 1970.** Adaptation to intertidal existence: reproductive cycle and larval behavior in demospongiae. *Symposium of the Zoological Society of London*, 25: 247-271.
- Burlando, B., Bavestrello, G. and Arillo, A., 1992.** Seasonal changes in the metabolism of the calcareous sponge *Clathria clathrus* (Schmidt). *Comparative Biochemistry and Physiology*, 101: 341-344.
- Chanas, B. and Pawlik, J. R., 1995.** Defenses of Caribbean sponges against predatory reef fish, Spicules, tissue toughness and nutritional quality. *Mar, Ecol, Prog*, 127:195-211.
- Cheshire, A. C., Butler, A. J., Westphalen, G., Rowland, B., Steveson, J. and Wilkinson, C. R., 1995.** Preliminary study of the distribution and photophysiology of the temperate phototrophic sponge *Cymbastela* sp. From South Australia. *Mar. Fresh, Res*, 46: 1211-1216.
- Cheshire, A. C. and Wilkinson, C. R., 1991.** Modeling the photosynthetic by sponges on Davies Reef Great Barrier Reef. *Mar, Biol*, 109: 13-18.
- Dayton, P. K., Robilliard, G. A., Paine, R. T. and Dayton, L. B., 1974.** Biological accommodation in the benthic community at McMurdo Sound, Antarctica. *Ecol, Mongr*, 44: 105-128.
- De Caralt, S., Uriz, M. J. and Wijffels, R. H., 2007.** Grazing differential size-class and survival of

- Simpson, T. L., 1980.** Reproductive processes in sponges: A critical evaluation of current data and views. *Invertebrate Reproduction Development*, 2: 251-269.
- Storr, J. F., 1964.** Ecology of the Gulf of Mexico commercial sponges and its relation to the fishery. *U. S. Fish Wildlife Seru, Spec, Sci, Rep*, 466: 1-73.
- Storr, J. F., 1976.** Ecological factors controlling sponge distributions in the Gulf of Mexico and the resulting zonation. *Aspects of Sponge Biology* (ed. By F. W. Harrison and R. R. Cowden), Academic Press, New York, PP. 261-276.
- Svane, I. B. and Peterson, J. K., 2001.** On the problems of epibiosis, fouling and artificial reefs, a review. *Publicazioni della Stazione Zoologica di Napli, Marine Ecology*, 33:169-188.
- Vacelet, J., Gaino, E. and Gallissian, M. F., 1994.** Bacterial attach of sponging skeleton during the 1986-1990 Mediterranean sponge disease In: R. W. M. Van Soest, T. M., vanKempen, G. and J. C. Breakman, Editors, *Sponges in Time and Space*, Balkema Publishing, Rotterdam, PP. 355-362.
- Vizakat, L., Hakantra, S. N. and Parulekar, A. H., 1991.** Population ecology and community structure of sub tidal soft sediment dwelling macro invertebrates of Konkan, West coast of India. *Indian J, Mar, Sci*, 20:40-42.
- Wells, H. W., Eells, M. J. and Gray, I. E., 1964.** Ecology of sponges in Hatteras Harbor, North Carolina. *Ecology*, 45: 752-767.
- Witman, J. D. and Sebens, K. P., 1990.** Distributions and ecology of sponges at a subtidal rock ledge in the Central Gulf of Maine. *New Perspectives in Sponge Biology* (ed. By K. Rutzler), Smithsonian Institute Press, London, PP. 391-96.
- Patterns of glass sponge (Porifera, Hexactinellida) distribution in coastal waters of British Columbia. *Mar, Ecol, Prog*, 283: 133-149.
- Melao, M. G. G. and Rocha, O., 1999.** Biomass and productivity of the freshwater sponge *Metania spinata* (Carter, 1881) (Demospongiae: Metaniidae) in a Brazilian reservoir. *Hydrobiology*, 390:1-10.
- Page, M. J., Northcote, P. T., Webb, V. L., Mackey, S. and Handley, S. J., 2005.** Aquaculture trials for the production of biologically active metabolites in the New Zealand sponge *Mycale hentscheli?* (Demospongiae: Poecilosclerida). *Aquaculture*, 250: 256-269.
- Perkol-Finkel, S., Benayahu, Y. and Shashar, N., 2006.** Can artificial reefs mimic natural reef communities? The roles of structural features and age. *Marine Environmental Research*, 61:121-13.
- Perkol-Finkel, S. and Benayahu, Y., 2007.** Differential recruitment of benthic communities on neighboring artificial and natural reefs. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 340: 25-39.
- PERSGA/GEF., 2004.** Standard Survey Methods for Key Habitats and Key Species in the Red Sea and Gulf of Aden. *PERSGA Technical Series*, No.10. PERSGA, Jeddah.
- Ribes, M., Coma, R. and Gili, J. M., 1998.** Seasonal variation of in situ feeding rates by the temperate ascidian *Halocynthia papillosa*. *Mar. Ecol, Prog*, 175: 201-213.
- Riesgo, A., Maldonado, M. and Durfort, M., 2007.** Dynamics of gametogenean, embryogenesis, and larval release in a Mediterranean homsclerophorid demosponge. *Mar, Freshw, Res*, 58: 398-417.
- Russ, G. R., 1982.** Overgrowth in a marine epifaunal community: competitive hierarchies and competitive networks. *Oecologia*, 53: 12-19.
- Sara, M., Pansini, M. and Pronzato, R., 1979.** Zonation of photophilous sponge related to water movement in reef biotopes of Obhur Creek (Red Sea). *Biologie Des Spongiaires* (ed. By C. Levi and N. Boury-Essnault), CRNS291, CNRS, Paris, PP. 283-288.
- Simpson, T. L., 1974.** The biology of the marine sponge *Microciona prolifera* (Ellis and Solander) II. Temperature-related, annual change in functional and reproductive elements with a description of larval metamorphosis. *Mar, Bio, Ecol*, 2: 252-277.