

بررسی رشد و عملکرد خیار (*Cucumis sativus L.*) و بامیه (*Abelmoschus esculentus L.*)

روح‌الله نادری^۱، عبدالکریم کاشی^۲ و مرتضی سام دلیری^۳

چکیده

به منظور بررسی اثر متقابل کشت مخلوط خیار و بامیه، آزمایشی به مدت یکسال زراعی(۱۳۸۷) در شهرستان نوشهر، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای الگوی کشت در چهار سطح: کشت خالص خیار یا بامیه، کشت با میه داخل ردیف خیار، کشت بامیه بین ردیف‌های خیار و الگوی کشت بامیه بین و داخل ردیف‌های خیار و تیمارهای تراکم در سه سطح (فاصله کشت بین بوته ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتی‌متر) بودند. صفات رویشی و عملکرد، غلظت عناصر پتاسیم، فسفر، کلسیم و نیتروژن در تیمارهای آزمایشی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که در بوته‌های خیار، کشت مخلوط باعث افزایش غلظت عناصر کلسیم (۱۹٪)، پتاسیم (۱۲٪)، عملکرد (۱۲٪) و کاهش غلظت نیتروژن (۱۲٪)، تعداد شاخه فرعی (۲۳٪) و سطح برگ (۱۵٪) شد. برای بامیه، کشت مخلوط باعث افزایش غلظت عناصر فسفر (۳٪)، نیتروژن (۱۶٪)، سطح برگ بوته (۴۱٪)، وزن تر بوته (۲۶٪) و کاهش غلظت کلسیم (۸٪) نسبت به کشت خالص شد. اثر متقابل الگوی کشت و تراکم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد خیار معنی‌دار بود، ولی تنها بر روی اجزای عملکرد بامیه اثر معنی‌داری داشت. نسبت برابری زمین در همه تیمارهای کشت مخلوط، بزرگ‌تر از یک بوده و بالاترین نسبت برابری زمین (۲/۱۵) در تیمار کشت مخلوط بامیه بین بوته و ردیف‌های خیار، با تراکم متوسط به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین دو گیاه خیار و بامیه نوعی سازگاری و هماهنگی وجود دارد که می‌تواند حاصل ویژگی‌های فیزیولوژیکی و گیاه‌شناسی و عوامل مساعد اکولوژیکی باشد که باعث افزایش عملکرد در دو گیاه شده است.

واژه‌های کلیدی: بامیه، خیار، کشت مخلوط، غلظت عناصر، نسبت برابری زمین.

تاریخ دریافت مقاله: ۸۸/۵/۲۰ تاریخ پذیرش: ۸۹/۲/۱۳

۱. عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

۲. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

۳. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

نادری، ر. بررسی رشد و عملکرد خیار (*Cucumis sativus L.*) و بامیه...

قبری و طاهری (Ghanbari and taheri, 2003) گزارش دادند که آرایش کاشت تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه در لوبیا قرمز داشته است و کاهش فاصله ردیف ها و افزایش فاصله بورتها روی ردیف باعث افزایش عملکرد دانه شده است. کاشی (Kashi, 1993) گزارش داد که بهترین الگوی کشت مخلوط خیار با بادمجان الگوی کشت بادمجان بین ردیف های خیار با نسبت برابری زمین ۱/۷۸ و بهترین الگوی کشت برای کشت مخلوط خیار با فلفل دلمه ای کشت مخلوط فلفل دلمه ای بین بوته و ردیف های خیار با نسبت برابری زمین ۱/۶۱ می باشد. موئیک و اسیگبو (Muoneke and Asiegbu, 1997) بالاترین نسبت برابری زمین (۱/۳۵) را در الگوی کشت بامیه بین ردیف های ذرت با تراکم ۲۸۰۰ بوته بامیه در هکتار به دست آوردند. افسو و لیمانی (Ofuso-Anim and Limbani, 2007) گزارش دادند که کشت مخلوط بامیه با خیار باعث افزایش ارتفاع و عملکرد بامیه، افزایش تعداد میوه و عملکرد خیار شده است. آنها بهترین الگوی کشت مخلوط بامیه با خیار را الگوی کشت یک ردیف بامیه با یک ردیف خیار با نسبت برابری زمین ۴/۲ و الگوی کشت دو ردیف بامیه با یک ردیف خیار با نسبت برابری زمین ۲/۲ عنوان نمودند. موئیک و امبا (Muoneke and Mbah, 2007) گزارش دادند که، افزایش تراکم بامیه در کشت مخلوط باعث افزایش رقابت درون گونه ای و برون گونه ای برای کسب فضا و نور شده که در نتیجه باعث افزایش ارتفاع بامیه و کاهش عملکرد در بامیه می شود. خیار و بامیه از جمله سبزی های میوه ای مهم در کشور می باشند. از این رو این تحقیق در راستای دست یابی به شناخت بهتر اثر متقابل کشت مخلوط این دو گیاه حائز انجام گردید.

مواد و روش ها

این آزمایش در سال ۱۳۸۷ به منظور بررسی اثر متقابل کشت مخلوط خیار و بامیه، در مزرعه ای واقع در شهرستان نوشهر انجام گرفت. این شهرستان با طول جغرافیایی ۵۱°۳۲' و عرض جغرافیایی ۳۶°۳۹' درجه شمالی و ارتفاع حدود ۲۰/۹ متر از سطح دریا در استان مازندران واقع شده است. بافت خاک محل آزمایش رسی لومنی و pH آن تا عمق گسترش ریشه ۷/۷ بوده است. آزمایش، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار انجام گرفت. فاکتور الگوی کشت در چهار سطح (کشت

مقدمه و بورسی منابع

کشت مخلوط یعنی، کاشت و برداشت همزمان یا با فاصله، بیش از یک کیا در یک قطعه زمین و در یک دوره کاشت. کشت مخلوط، یکی از روش های الهام گرفته از طبیعت است که علاوه بر حفظ تعادل اکولوژیک و ثبات آن، فواید زیادی از جمله افزایش جذب عناصر غذایی خاک، کاهش رشد علف های هرز و افزایش عملکرد محصول را شامل می شود (Mazaheri, 1994). به طور کلی موفقیت در کشت های مخلوط، بستگی زیادی به انتخاب گیاهان اصلی و همراه و همچنین روش های کشت آنها به صورت مخلوط دارد در این رابطه باید صفات مرغولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان اصلی و همراه مورد توجه قرار گیرد (Kashi, 1992). تراکم کاشت از جمله عواملی است که به طور مستقیم عملکرد و اجزای مطلوب، تراکمی است که در نتیجه آن کلیه عوامل محیطی به طور کامل مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال رقابت درون بوته ای و برون بوته ای در حداقل باشد، تا حداقل عملکرد با کیفیت مطلوب به دست آید (Khajehpour, 1997).

موئیک و اندوکو (Muoneke and Ndukwe, 2008) گزارش نمودند که کشت مخلوط بامیه با تراکم بالای آمارانتوس باعث کاهش رشد و عملکرد هر دو گیاه در مقایسه با کشت خالص می شود. اودلی و همکاران (Odeleye et al., 2005) گزارش دادند که افزایش تراکم بوته بامیه از ۴۱۶۶ بوته در هکتار به ۱۲۵۰۰ بوته در هکتار باعث کاهش تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ در هر بوته و سطح برگ بامیه شده است. میری (Miri, 2006) گزارش داد که افزایش تراکم بامیه باعث افزایش ارتفاع بامیه می شود ایشان بهترین فاصله بین بوته های بامیه را فاصله ۳۰ سانتی متر بیان نمود.

همچنین آرایش بوته ها در داخل یک تراکم معین نیز حائز اهمیت می باشد، به طوری که استقرار تراکم مطلوبی از بوته های سالم در مناسب ترین الگوی آرایش بوته ای، اساس یک سیستم موفق تولید زراعی است. آرایش بوته هایا یا وضعیت هنرنسی بوته ها را می توان با تغییر عرض ردیف و فاصله بین بوته های روی ردیف تغییر داد. از لحاظ نظری، انتخاب ردیف های باریک و افزایش فاصله بوته ها روی ردیف سبب استفاده مؤثر تر از منابع و تأخیر در زمان آغاز رقابت درون گونه ای خواهد شد یزدی صمدی و پوستینی (Yazdi-Samadi and Postini, 1993).

برتری کشت مخلوط، بیشتر از یک و در حالت برتری کشت خالص کمتر از یک خواهد بود و اگر مساوی با یک باشد محصول زراعت تک کشتی و مخلوط یکسان است. معادل عملکرد کل از مجموع عملکرد دو گیاه در کشت مخلوط به دست می آید (Mazaheri, 1994).

$$LER = \sum_{n=1}^m \frac{y_i}{y_{ii}}$$

نتایج و بحث

تأثیر کشت مخلوط بر صفات رویشی خیار

بر اساس نتایج به دست آمده هیچ یک از صفات رویشی تحت تأثیر اثر متقابل الگوی کشت \times تراکم کاشت قرار نگرفتند (جدول ۱). الگوی کشت در سطح احتمال ۵ و ۱٪، به ترتیب تعداد شاخه فرعی و وزن تر بوته‌های خیار را تحت تأثیر قرار داد. همچنین تراکم در سطح احتمال ۱٪ بر روی تعداد شاخه فرعی و وزن تر بوته خیار اثر معنی دار داشته است. براساس نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی در جدول (۲) الگوی کشت خالص خیار با ۴/۴۹ عدد شاخه فرعی و ۲۶۱/۵ گرم وزن تر بوته بیشترین تعداد شاخه فرعی و وزن تر بوته را داشته و کمترین تعداد شاخه فرعی در الگوی کشت مخلوط به دست آمده و کمترین وزن تر بوته در الگوی کشت بامیه داخل ردیف (Darabi, 1996) در ۲۰۶/۸ گرم) به دست آمده است. دارابی (Darabi, 1996) در کشت مخلوط خیار با گوجه‌فرنگی بیشترین وزن تر بوته در هر دو گیاه را در کمترین تراکم به دست آورد. از نظر فاکتور تراکم وزن تر بوته (۲۶۰/۷ گرم) در تراکم کم و کمترین تعداد شاخه فرعی (۲/۸۵ عدد) و وزن تر بوته (۲۰۰/۶ گرم) در تراکم زیاد به دست آمده است. این نتایج مطابق با یافته های عبدالحکیم (Abdolhakim, 1995) در بررسی اثر تراکم بر رشد و عملکرد خیار می‌باشد. الگوی کشت و همچنین تراکم در سطح احتمال ۵٪ بر روی میزان سطح برگ خیار تأثیر معنی دار داشته است (جدول ۱). بیشترین میزان سطح برگ در بوته‌های خیار از نظر فاکتور الگوی کشت در الگوی کشت بامیه بین ردیف‌های خیار با ۳۰۳۷ سانتی متر مربع و کمترین میزان سطح برگ در الگوی کشت بامیه داخل ردیف خیار با ۲۵۸۰ سانتی متر مربع به دست آمده است. از نظر فاکتور تراکم،

خالص خیار یا بامیه)، کشت بامیه بین بوته‌های خیار (داخل ردیف‌های خیار)، کشت بامیه بین ردیف‌های خیار و کشت بامیه بین بوته و ردیف‌های خیار و تراکم در سه سطح فاصله کشت بین بوته (۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتی متر) مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱). پس از آماده کردن زمین و قبل از کاشت بذر، کود پایه به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر (سوپر فسفات تریبل)، ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار پتاسیم (سولفات پتاسیم) و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن (اوره) استفاده شد که ۱/۳ از کل نیتروژن قبل از کاشت بذر و بقیه نیتروژن در دو نوبت در طول دوره رویش به زمین داده شد. طول و عرض کرت‌های آزمایشی ۴/۵ متر و هر واحد آزمایشی دارای سه ردیف کاشت بوده که، ردیف وسط به عنوان خط اصلی آزمایش جهت یادداشت برداری منظور شد. بذر خیار رقم سوپر دامینوس در تاریخ ۸۷/۱/۳۱ و بذر بامیه رقم کلمسون اسپینلس ۳۰۲ در تاریخ ۸۷/۳/۱۹ در مزرعه کشت شد. یادداشت برداری از صفاتی نظیر سطح برگ، وزن تر بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، درصد ماده خشک برگ، تعداد و وزن میوه در هر بوته، عملکرد و غلظت عناصر پتاسیم، فسفر، کلسیم و نیتروژن در میوه به عمل آمد. اندازه گیری پتاسیم، از طریق هضم به روش سوزاندن خشک و ترکیب با اسید پرکلرید و اندازه گیری با فلم فتومنتر، میزان فسفر کل موجود در میوه، با استفاده از معرف بارتون و با روش مولیدات - و ارادات از طریق هضم نمونه‌ها در اسید پرکلرید و به وسیله دستگاه اسپکتر و فتومنتر اندازه گیری شد. نیتروژن نیتراتی میوه نیز با روش شیمیایی سولفو سالیسیلیک اسید بوسیله دستگاه اسپکترو فتومنتر با طول موج ۴۱۰ نانومتر اندازه گیری شد (Ghazanshahi, 1997).

اندازه گیری سطح برگ بامیه با استفاده از دستگاه سنجش سطح برگ دیجیتالی مدل ADC ساخت شرکت (Biosientic-Ltd) صورت گرفت. تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار Mstate، مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن و ارزیابی کشت مخلوط با روش نسبت برابری (LER) زمین^۱ صورت گرفت. نسبت برابری زمین براساس فرمول زیر به دست آمد. که Y_i مقدار محصول یک گونه در کشت مخلوط (در واحد سطح) و Y_{ii} حداکثر محصول همان گونه در کشت خالص می‌باشد. نسبت برابری زمین در صورت

جدول ۱- تجزیه واریانس غلظت عناصر و صفات رویش خوار در کشت مخلوط

Table 1. Analysis of variance for elemental concentration and vegetative characteristics of cucumber at intercropping system

متغیر تجزیه S.O.V	درجه آزادی df	تعداد شاخه فرمی No. branches plant ⁻¹	مسطح برگ Leaf area (cm ²)	وزن قریبی fresh weight of plant	درصد ماده خشک برگ Percent dry matter of leaves (gr)	غلظت concentration (ml/100gr)			(ml/100gr)
						ارتفاع بوته Plant height (cm)	نترژن Nitrogen	فسفور Phosphor	
نکار	2	0.79	0.426	1379.68	0.406	758.9	0.002	0.43	0.005
Replication (A) کشت	3	2.603*	2.76*	5424.79**	0.594ns	264.83ns	0.014**	2.75**	0.146**
Plant pattern (B) کشت	2	6.104**	8.15*	10032.56**	1.88ns	299.27ns	0.023**	8.14**	0.029**
Planting density	6	0.68ns	5.85ns	1719.79ns	1.39 ns	97.15ns	0.008**	5.85**	0.108**
A*B خطا	21	0.78	1.055	975.38	0.611	542.88	0.001	1.05	0.001
Error ضریب تغییرات	—	% 23.97	% 3.43	% 13.51	% 8.14	% 9.79	% 0.28	% 3.43	% 0.32
C.V									% 2.82

* , ** and n.s: Significant at the 1% and 5% levels of probability and nonsignificant, respectively.
و n.s: معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و غیر معنی دار.

صفات رویشی بامیه

اثر متقابل الگوی کاشت \times تراکم کاشت تنها بر وزن تر بوته‌های بامیه در سطح احتمال ۱ درصد اثر معنی دار داشته و بر روی سایر صفات اثر معنی داری نداشت (جدول ۵). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که به موازات افزایش تراکم و کاهش فضای در اختیار گیاه، وزن تر بوته نیز کاهش پیدا کرده (جدول ۴)، به طوری که بیشترین وزن تر بوته (۲۳۸۳ گرم) در الگوی کشت بامیه بین ردیف‌های خیار با تراکم کم و کمترین وزن تر بوته (۹۷۴ گرم) در کشت خالص بامیه با تراکم متوسط به دست آمد. ارتفاع بوته بامیه تحت تأثیر الگوی کشت در سطح احتمال ۵٪ و تراکم در سطح احتمال ۱٪ قرار گرفت (جدول ۵). بر اساس الگوی کشت، بیشترین ارتفاع بوته (۱۶۴/۷ سانتی‌متر) در الگوی کشت خالص و کمترین ارتفاع بوته (۹۱/۶ سانتی‌متر) در الگوی کشت بامیه داخل ردیف‌های خیار به دست آمد. از نظر فاکتور تراکم، بیشترین ارتفاع (۱۶۷/۷۴ سانتی‌متر) در تراکم زیاد و کمترین ارتفاع (۱۰۲/۱۵ سانتی‌متر) در تراکم کم حاصل شد (جدول ۶). تعداد شاخه فرعی در هر بوته در سطح احتمال ۱ درصد تحت تأثیر تراکم قرار گرفت (جدول ۵)، به‌نحوی که با افزایش تراکم، ارتفاع بوته افزایش یافته و از تعداد شاخه فرعی در هر بوته کاسته شد. بیشترین تعداد شاخه فرعی (۹۹/۳٪) در تراکم کم و کمترین تعداد شاخه فرعی (۸۵/۱ عدد) در تراکم زیاد حاصل شد (جدول ۶). اولی و همکاران (Odeleye *et al.*, 2005) گزارش دادند که افزایش تراکم بوته باعث افزایش ارتفاع بوته، کاهش تعداد شاخه فرعی و سطح برگ بامیه شده است.

الگوی کشت در سطح احتمال ۵٪ سطح برگ و درصد ماده خشک برگ و تراکم در سطح احتمال ۱ درصد سطح برگ بامیه را تحت تأثیر قرار داد (جدول ۵). بیشترین درصد ماده خشک برگ بامیه (۰۲/۱۹ گرم) در الگوی کشت خالص بامیه و کمترین درصد ماده خشک برگ (۸/۱۸ گرم) در الگوی کشت بامیه بین و داخل ردیف‌های خیار به دست آمد. از نظر فاکتور الگوی کشت، بیشترین سطح برگ (۶۰/۲۳ سانتی‌متر مربع) در الگوی کشت بامیه بین ردیف‌های خیار و از نظر فاکتور تراکم نیز بیشترین میزان سطح برگ (۰/۵۶ ۰۲ سانتی‌متر مربع) در تراکم کم حاصل شد.

بیشترین سطح برگ (۱۳۳/۳۲ سانتی‌متر مربع) در تراکم کم و کمترین سطح برگ (۰/۴۰ سانتی‌متر مربع) در تراکم زیاد حاصل شد (جدول ۶).

عملکرد و اجزای عملکرد خیار

تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر الگوی کشت و تراکم و اثر متقابل الگوی کشت \times تراکم بر روی تعداد میوه در هر بوته خیار در سطح احتمال ۱٪ معنی دار بوده است (جدول ۲). میانگین تعداد میوه در هر بوته خیار در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص به‌طور متوسط ۶/۱ درصد افزایش یافته است همچنین میانگین وزن میوه در هر بوته در کشت مخلوط به‌طور متوسط ۱۳/۳ درصد بیشتر از کشت خالص خیار بوده است. نتایج مقایسه میانگین‌های جدول ۴ نشان می‌دهد که با کاهش تراکم، تعداد و وزن میوه در هر بوته به‌طور معنی داری افزایش پیدا کرده است. حداکثر تعداد و وزن میوه در هر بوته در تراکم کم و در الگوی کشت بامیه داخل ردیف‌های خیار به دست آمده است. افسو و لیمبانی (Ofosu-Anim and Limbani, 2007) در کشت مخلوط بامیه و خیار بیشترین تعداد میوه در هر بوته خیار را در الگوی کشت یک ردیف بامیه با یک ردیف خیار با تراکم کم به دست آوردند. الگوی کشت و تراکم و اثر متقابل الگوی کشت \times تراکم بر روی عملکرد خیار در سطح احتمال ۱٪ معنی دار بود. مقدار عملکرد در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص ۱۲ درصد افزایش داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد (جدول ۴) که عملکرد خیار در همه الگوهای کشت مخلوط نسبت به کشت خالص افزایش یافته است. بیشترین میزان عملکرد در خیار برابر با ۳۶/۱۵ تن در هکتار مربوط به الگوی کشت بامیه بین ردیف‌های خیار با فاصله بین بوته ۰/۲۰ سانتی‌متر بود و کمترین عملکرد (۴۳/۱۱ تن در هکتار) نیز در الگوی کشت خالص خیار با فاصله بین بوته ۰/۴۰ سانتی‌متر به دست آمد. افسو و لیمبانی (Ofosu-Anim and Limbani, 2007) بیشترین عملکرد خیار، را در الگوی کشت مخلوط یک ردیف بامیه با یک ردیف خیار به دست آوردند. کاشی (Kashi, 1991) بیشترین عملکرد خیار در کشت مخلوط با بادمجان را در الگوی کشت بادمجان بین ردیف‌های خیار به دست آورد. در تیمار کشت بامیه بین ردیف‌های خیار با تراکم زیاد به دلیل اثر بادشکنی بامیه (Kashi, 1991) و تراکم بالا و همچنین کاهش رقبت برون گونه‌ای، عملکرد محصول نسبت به بقیه تیمارها افزایش معنی داری داشته است.

جدول ۲- مقایسه میانگین اثرات اصلی روی برخی صفات مورد ارزیابی خیار و بامیه در کشت مختلط

Table 2. Means comparison of main effects for some characteristics of cucumber and okra in intercropping system.

Trait	صفات	میدانی Leaf area (cm ²)	میداد شاخه فرعی No. baranches plant ⁻¹	وزن نر بوده Fresh weight of plant (gr)	عسلکرد Fresh fruit yield (t ha ⁻¹)	درصد ماده خشک برگ Percent dry matter of leaves (gr)	فسفور باشه Phosphor of okra (ml/100gr fruits)
Treatment	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	بامیه Okra	بامیه Okra
الگویی کشت							
کشت خالص	14130 ^b	2848 ^b	3.08 ^a	4.49 ^a	261.5 ^a	3.15 ^{ab}	19.02 ^a
Monoculture	18040 ^{ab}	2580 ^d	2.68 ^a	3.36 ^b	206.8 ^b	2.85 ^{ab}	18.95 ^a
داخلی ردیف خیار	23460 ^a	3037 ^a	3.47 ^a	3.36 ^b	240.6 ^{ab}	2.55 ^b	18.59 ^{ab}
بین ردیف خیار	18530 ^{ab}	2749 ^c	2.64 ^a	3.56 ^b	215.7 ^b	3.83 ^a	18.18 ^b
Between cucumber rows							
بین دو داخلی ردیف خیار							
Cucumber rows between and within							
ترکیم کاشت							
Planting density							
(۲۰ cm)	13450 ^b	2400 ^c	1.85 ^c	2.85 ^b	200.6 ^c	3.30 ^a	18.77 ^a
(۲۵ cm)	16560 ^b	2780 ^b	3.09 ^b	4.08 ^a	232.1 ^b	2.94 ^a	18.71 ^a
(۳۰ cm)	25600 ^a	3231 ^a	3.99 ^a	4.15 ^a	260.7 ^a	3.05 ^a	18.64 ^a

در هر ردیف، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح اختلاف ۵٪ اختلاف معنی‌دار ندارند.

Means followed by the same letter in each row are not significantly different at %5 probability level (Duncan's new multiple range test).

جدول ۳- تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد خیار در کشت مخلوط

Table 3. Analysis of variance for yield and yield components of cucumber at intercropping system.

متغیر S.O.V	درجه آزادی df	تعداد میوه در هر بوته No. fruits plant ⁻¹	وزن میوه در هر بوته Fesh fruit weight (g) plant ⁻¹	وزن متوسط هر میوه Average fresh fruit weight (gr)	درصد ماده خشک میوه Percent dry matter of fruit (gr)	میانگین مریعات	
						عملکرد Fresh fruit yield (t ha ⁻¹)	
تکرار Replication	3	0.074	1746.83	24.87	0.048	0.303	
الگوی کشت (A)	3	3.37**	11791.57**	9.07 ns	0.103 ns	7.119**	
Planting pattern							
تراکم کشت (B)	2	126.27**	440699.48**	47.65*	0.34 ns	8.190**	
Planting density							
A*B	6	2.98**	16321.97**	28.43*	0.18 ns	6.102**	
خطا	32	0.418	1003.15	11.51	0.26	0.577	
ضریب تغییرات C.V	--	% 7.09	% 5.41	% 5.26	% 12.65	% 5.77	

*، ** و ns به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵ درصد، ۱ درصد و غیر معنی دار.

*, ** and ns: Significant at the 1% and 5% levels of probability and nonsignificant, respectively.

بامیه مربوط به الگوی کشت بامیه داخل و بین ردیفهای خیار با میانگین عملکرد ۳/۸۳ تن در هکتار و کمترین میزان عملکرد نیز مربوط به الگوی کشت بامیه بین ردیفهای خیار با میانگین عملکرد ۲/۵۵ تن در هکتار بود (جدول ۲). افسو و لیمانی محصول در بامیه را در الگوی کشت دو ردیف بامیه با یک ردیف خیار با تراکم زیاد به دست آورند و افزایش عملکرد در این تیمار را به خاطر افزایش تراکم بوته در واحد سطح دانستند.

غلظت عناصر در میوه خیار و بامیه

تجزیه واریانس دادهای نشان داد که الگوی کشت و تراکم و اثر متقابل الگوی کشت × تراکم در سطح احتمال ۱٪ بر غلظت عناصر پتاسیم، فسفر، کلسیم و نیتروژن در میوه خیار و غلظت نیتروژن و کلسیم میوه بامیه اثر معنی دار داشته است (جدول ۱ و ۵). نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد (جدول ۴) که بیشترین غلظت فسفر در خیار (۳۱/۷۱ ml/100gr) در تیمار کشت خالص خیار با تراکم متوسط و کمترین غلظت فسفر در تیمار کشت بامیه بین بوته و ردیفهای خیار با تراکم زیاد به دست آمده است. در بامیه غلظت فسفر تنها تحت تأثیر الگوی کشت و تراکم (سطح احتمال ۱٪) قرار گرفت (جدول ۵) بر اساس مقایسه میانگین ها از لحاظ فاکتور

اolasantan (2001) در کشت مخلوط بامیه با کاساوا در تراکم بالای بامیه با افزایش ارتفاع، کاهش تعداد شاخه فرعی و سطح برگ بامیه مواجه شد.

عملکرد و اجزای عملکرد بامیه

نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس دادهای (جدول ۷) نشان داد که تأثیر الگوی کشت و تراکم و اثر متقابل الگوی کشت × تراکم کشت ببروی وزن و تعداد میوه در هر بوته در سطح احتمال ۱٪ معنی دار بوده است. مقایسه میانگین ها در (جدول ۴) نشان می دهد که با افزایش تراکم بر تعداد میوه در هر بوته کاسته شده است. بیشترین تعداد میوه در هر بوته (۳۳/۴۴ عدد) و وزن میوه در هر بوته (۱۹۱/۴ گرم) در الگوی کشت بامیه با تراکم کم و کمترین تعداد میوه در هر بوته (۱۰/۰۴ عدد) و وزن میوه در هر بوته (۵۷/۴ گرم) در الگوی کشت خالص بامیه با تراکم زیاد حاصل شد. کاهش تعداد و وزن میوه در هر بوته در تراکم زیاد می تواند به خاطر افزایش رقابت درون و بروون گونه ای برای کسب منابع مورد نیاز برای رشد و نمو باشد که در تراکم های کم این رقابت کمتر شده است (Oforso-Anim and Limbani, 2007)، (Olasantan and Bello, 2007) و (Muoneke and Mbah, 2007) 2004). براساس نتایج مقایسه میانگین ها، بیشترین عملکرد

جدول ۴- مقایسه میانگین اثر اصلی برخی صفات مورد ارزیابی در خیار و بامیه در کشت مخلوط

Table 4. Means comparison of interaction effects for some characteristics of cucumber and okra in intercropping system

صفات Character	وزن نر Fresh weight of plant(gr)	وزن بمه Fresh fruit weight (gr plant ⁻¹)	تعداد بمه در هر بوته No. fruits plant ⁻¹	عسلکرد				نیتروژن Nitrogen	فسفر Phosphor	کلسیم Calcium	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber			
				بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber						بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	بامیه Okra	خیار Cucumber	
Cu20	---	400.8 ^f	---	6.13 ^f	---	13.06 ^{cde}	---	0.317 ⁱ	---	29.19 ^{ab}	0.784 ⁱ	---	1.14 ^c												
Cu30	---	532.7 ^e	---	8.07 ^e	---	11.82 ^{ef}	---	0.464 ^a	---	3171 ^a	0.913 ^j	---	1.01 ^d												
Cu40	---	686 ^{cd}	---	10.7 ^{cd}	---	11.34 ^f	---	0.369 ^c	---	29.78 ^{ab}	0.768 ^g	---	1.04 ^d												
Ok20	1117 ^{cd}	---	57.40 ^e	---	10.04 ^d	---	---	0.297 ^e	---	---	0.659 ^k	---													
Ok30	974 ^d	---	67.04 ^e	---	0.24 ^{cd}	---	---	0.319 ^e	---	---	1.45 ^b	---													
Ok40	1699 ^{bc}	---	79.01 ^c	---	14.6 ^d	---	---	0.264 ^f	---	---	1.24 ^d	---													
Cu+O20 m1	1624 ^{bcd}	417.4 ^f	78.20 ^c	6.28 ^f	12.81 ^d	13.89 ^{abc}	1.75	0.353 ^e	0.315 ^e	30.05 ^{ab}	1.18 ^b	1.42 ^c	1.28 ^b												
Cu+O30 m1	1661 ^{bc}	522.6 ^e	126.4 ^b	8.31 ^e	23.13 ^b	11.68 ^{ef}	1.63	0.322 ^h	0.361 ^c	30.85 ^{ab}	0.854 ^h	0.677 ^j	1.28 ^b												
Cu+O40 m1	1502 ^{bcd}	859.1 ^a	191.4 ^a	13.55 ^a	33.44 ^a	14.34 ^{abc}	1.94	0.297 ^k	0.334 ^d	28.44 ^b	1.12 ^a	1.54 ^a	1.30 ^b												
Cu+O20 m2	1394 ^{bcd}	453.2 ^f	86.40 ^c	6.63 ^f	14.65 ^d	15.36 ^a	1.93	0.227 ^l	0.312 ^e	30.42 ^{ab}	0.753 ^k	1.05 ^e	1.17 ^c												
Cu+O30 m2	1817 ^b	663 ^{cd}	87.31 ^{bc}	9.86 ^d	15.44 ^d	14.74 ^{ab}	1.64	0.340 ^f	0.301 ^e	29.91 ^{ab}	1.16 ^c	0.907 ^g	1.17 ^c												
Cu+O40 m2	2383 ^a	744.7 ^b	171.5 ^a	12.51 ^b	30.04 ^a	12.40 ^{def}	1.7	0.330 ^g	0.409 ^a	31.42 ^a	0.635 ^l	0.899 ^g	1.05 ^d												
Cu+O20 m3	1121 ^{cd}	396.8 ^f	58.61 ^c	6.47 ^f	10.48 ^d	13.38 ^{bcd}	2.06	0.359 ^d	b	26.69 ^c	1.14 ^d	0.818 ⁱ	1.28 ^b												
Cu+O30 m3	1319 ^{bcd}	642.7 ^d	90.92 ^{bc}	9.81 ^d	14.88 ^d	14.23 ^{abc}	2.15	0.453 ^b	0.305 ^e	30.53 ^{ab}	1.01 ^e	0.859 ^h	1.6 ^d												
Cu+O40 m3	1589 ^{bcd}	706.9 ^c	106.5 ^{bc}	11.22 ^c	19.05 ^c	11.86 ^{ef}	1.84	0.307 ^j	0.333 ^d	30.58 ^{ab}	0.952 ^f	0.995 ^f	1.43 ^a												

Means followed by the same letter do not differ significantly at %5 probability level (Duncan's new multiple range test).

میانگین‌های دارای حداقل یک گروه مشترک در میان ۱۵٪ اختلاف معنی دارند.

Cu,Ok,M1,M2,M3 : Sole cucumber, Sole okra, within cucumber rows, between and within cucumber rows, respectively.

پرورش بکثت خالص خیار، بکثت بامیه بین دویل خیار، بکثت بامیه بین دویل دویل خیار

جدول ۵- تجزیه واریانس غلظت عناصر و صفات روبیش در بامه در کشت مخلوط

Table 5. Analysis of variance for elemental concentration and vegetative characteristics of okra at intercropping system.

	MS	میانگین مردمات	غلظت					
			درصد ماده	خنسک برگ	ارتفاع	نیتروژن	فسفور	کلسیم
مطالعه نمایر	درجه حریقی	مسطح برگ	وزن گزینه	ارتفاع (cm)	Nitrogen	Phosphor	Calcium	Potassium
S.O.V	No. branches plant ¹	Leaf area (cm ²)	Fresh weight of plant (gr)	Percent dry matter of leaves (gr)				
کوار	2	0.408	568313.6	161709.16	0.009	270.61	0.002	0.096
Replication	2	1.3 n.s	126389423.5*	617178.24**	1.33*	416.7*	0.003**	4.78**
(A) planting pattern	3	1.3 n.s	126389423.5*	617178.24**	1.33*	416.7*	0.003**	4.78**
(B) کشت ترتیب	2	12.44**	402727191.7**	620015.16**	0.08 n.s	1374.1**	0.001**	1.63**
planting density	2	0.9 n.s	61673203.9 n.s	208078.89*	0.547 n.s	369.9 n.s	0.006**	0.50 n.s
A*B	6	1.386	63004601.7	78546.35	0.314	168.13	0.001	0.277
Error	21	--	% 39.61	% 42.82	% 18.48	% 3.00	% 8.29	% 0.25
C.V	--	--	--	--	--	% 2.01	% 1.43	% 8.27

*,** and n.s: Significant at the 1% and 5% level of probability and nonsignificant, respectively.
** ns و ترتیب معنی دار سطح احتمال ۵ درصد و غیر معنی دار.

جدول ۶- تاثیر کشت مخلوط خیار و بامیه بر روی ارتفاع بوته بامیه طی ۱۲ هفته بعد از کاشت.

Table 6. The effect of intercropping cucumber and okra on the height (cm) of okra, until 12 weeks after planting.

Treatment	آگوی کشت	هفته											
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
تیمار	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12		
Planting pattern													
کشت خالص	6.9 ^a	11.28 ^a	15.61 ^b	20.87 ^b	30.38 ^a	58.26 ^a	72.89 ^a	94.64 ^a	110.52 ^a	135.72 ^a	164.7 ^a		
Monoculture													
داخل ریسف خیار	7.8 ^a	12.67 ^a	17.57 ^{ab}	22.83 ^{ab}	33.32 ^a	54.4 ^a	72.39 ^a	86.65 ^a	99.97 ^a	122.38 ^a	146.91 ^b		
Within cucumber rows													
بین ریسف خیار	7.9 ^a	12.31 ^a	19.04 ^a	24.79 ^a	37.94 ^a	59.01 ^a	75.2 ^a	90.19 ^a	105.94 ^a	125.03 ^a	155.45 ^{ab}		
Between cucumber rows													
بین و داخل ریسف خیار	8.14 ^a	12.11 ^a	16.89 ^{ab}	23.12 ^a	35.36 ^a	59.22 ^a	77.32 ^a	93.40 ^a	109.37 ^a	130.42 ^a	158.02 ^a		
Between and within cucumber rows													
زایم کاشت													
Planting density													
(۲۰ cm) ^۱	7.5 ^a	12.30 ^a	17.91 ^a	23.10 ^a	38.15 ^a	62.18 ^a	78.34 ^a	98.85 ^a	113.94 ^a	134.18 ^a	166.74 ^a		
(۳۰ cm) ^۲	7.7 ^a	11.87 ^a	16.97 ^a	32.25 ^a	34.62 ^b	55.5 ^b	72.34 ^a	87.26 ^b	102.38	125.49 ^a	151.27 ^b		
(۴۰ cm) ^۳	8.1 ^a	12.12 ^a	16.94 ^a	23.36 ^a	33.72 ^b	55.49 ^b	72.68 ^a	87.55 ^b	103.03 ^b	134.18 ^a	151.02 ^b		

در هر سهون میانگین‌های دارای صرف مشترک اختلاف معنی داری در مسطح احتمال ۵٪ ندازند.

Means followed by the same letter do not differ significantly at %5 probability level (Duncan's new multiple range test).

جدول ۷- تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد بامیه در کشت مخلوط

Table 7. Analysis of variance for yield and yield components of okra at intercropping system.

متابع تغییر S.O.V	درجه آزادی df	تعداد میوه در هر بوته No.fruits plant ⁻¹	وزن میوه در هر بوته Fresh fruit weight (gr plant ⁻¹)	وزن متوسط هر میوه Average fresh fruit weight (gr)	درصد ماده خشک میوه Percent dry matter of fruit (gr)	عملکرد Fresh fruit yield (t ha ⁻¹)
تکرار Replication	3	2.031	168.52	395276.55	1.46	0.32
الگوی کشت (A) planting pattern	3	269.87**	9334.45**	387892.66 n.s	0.23 n.s	3.51**
تراکم کشت (B) planting density	2	620.92**	18495.79**	389059.96 n.s	0.537 n.s	0.440 n.s
A*B	6	66.27**	2256.10**	392947.02 n.s	0.530 n.s	0.898 n.s
Error	32	13.93	430.98	408053.66	0.66	0.58
ضریب تغییرات C.V	---	% 21.24	% 20.75	% 661.57	% 6.55	% 24.64

n.s. به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۰.۵٪ و غیر معنی دار.

*,** and n.s.: Significant at the 1% and 5% level of probability and nonsignificant, respectively.

نشان داد که تیمار کشت بامیه داخل ردیف‌های خیار با تراکم کم، بیشترین غلظت کلسیم ($ml/100gr$ ۱/۵۴) را داشت و تیمار کشت خالص بامیه با تراکم زیاد کمترین غلظت کلسیم ($ml/100gr$ ۰/۶۵۹) را نشان داد. بیشترین غلظت نیتروژن در بامیه تراکم کم و کمترین غلظت نیتروژن در کشت خالص بامیه با تراکم کم به دست آمد. اینال و همکاران (Inal *et al.*, 2008) در کشت مخلوط بادام زمینی با ذرت علت افزایش غلظت پتاسیم در دو گیاه و کاهش غلظت کلسیم را اثرات آنتاگونیسمی بین پتاسیم و کلسیم عنوان نمودند.

ارزیابی کشت مخلوط

بر اساس محاسبه نسبت برابری زمین (جدول ۴)، مشخص شد که در همه تیمارهای کشت مخلوط، استفاده بهتری از متابع خاک و آب به عمل آمده و زمین مورد کشت در این تیمارها بازده عملکرد بیشتری داشته است. بر این اساس تیمار کشت بامیه داخل و بین ردیف‌های خیار با تراکم متوسط با نسبت برابری زمین ۲/۱۵ و سودمندی ۱۱۵ درصد به عنوان مطلوب‌ترین تراکم و الگوی کشت مخلوط برای این دو گیاه معرفی می‌شود. جان و مینی (John and Mini, 2005) در

الگوی کشت (جدول ۲)، بیشترین غلظت فسفر در بامیه ($ml/100gr$ ۲۶/۹۸) مربوط به الگوی کشت بامیه داخل و بین ردیف‌های خیار و کمترین غلظت فسفر ($ml/100gr$ ۲۵/۵۴) مربوط به الگوی کشت بامیه بین ردیف و از نظر فاکتور تراکم بیشترین غلظت فسفر ($ml/100gr$ ۲۶/۶۱) مربوط به فاصله بین بوته ۳۰ سانتی‌متر و کمترین غلظت ($ml/100gr$ ۲۶/۱۵) مربوط به فاصله بین بوته ۴۰ سانتی‌متر بود. اینال و همکاران (Inal *et al.*, 2007) دلایل افزایش غلظت فسفر در شاخه‌های ذرت و جو را کاهش PH ریزوفسفر گیاه و افزایش فعالیت آنزیم فسفاتاز در خاک و ریشه این دو گیاه در کشت مخلوط بیان نمودند. الگوی کشت خالص خیار با تراکم متوسط که بیشترین غلظت نیتروژن میوه خیار ($ml/100gr$ ۰/۴۶۴) را دارد از لحاظ غلظت پتاسیم، کمترین غلظت ($ml/100gr$ ۱/۱۰۱) را داشته است (جدول ۴). تیمار کشت بامیه داخل و بین ردیف‌های خیار با تراکم کم نیز که بیشترین غلظت پتاسیم در میوه خیار ($ml/100gr$ ۱/۴۳) را دارد، غلظت نیتروژن کمی را داشت. همچنانی تیمار کشت بامیه داخل ردیف با تراکم کم که بیشترین غلظت کلسیم در خیار ($ml/100gr$ ۱/۱۲) را دارد، دارای غلظت پتاسیم کمی بود. در بامیه نتایج مقایسه میانگین‌ها (جدول ۴)

سبب می شود تا گیاهان مواد مورد نیاز خود را در زمان های متفاوتی تأمین کنند. در این آزمایش نیز خیار و بامیه هم از نظر مرغولوژیکی تفاوت دارند و هم اختلاف دوره رویش آنها نیز قابل ملاحظه می باشد. همچنان به نظر می رسد عواملی مانند اثرات بادشکنی بامیه بر عملکرد خیار (Kashi, 1991)، کترول رشد علف های هرز و حفظ رطوبت و تعديل دمای خاک در افزایش عملکرد در کشت مخلوط بامیه و خیار موثر بوده است.

کشت مخلوط بامیه با خیار و بامیه با لوپیتا چشم بلبلی با به دست آوردن LER به ترتیب ۲/۶۹ و ۲/۲۴ و ۲/۲۴، سودمندی کشت مخلوط این دو گیاه را ثابت کردند. به عقیده مظاہری (Mazaheri, 1994) افزایش محصول در کشت مخلوط زمانی به دست می آید که یا گیاهان از نظر مرغولوژیک با هم تفاوت داشته که در نتیجه آن، فضاهای هوایی و زمینی متفاوتی را اشغال و نیازهای خود را از مکان های متفاوتی تأمین می کنند، یا گیاهان از نظر مدت زمان رویش با یکدیگر اختلاف داشته که

منابع

- Abdelhakim EA (1995) Response of cucumber to plant density. Journal of King Saud University. Agricultural Science 7(2): 199-208.
- Darabi A (1996) Tthe study of intercropping cucumber and tomato. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. [In Persian with English Abstract].
- Ghanbari A, Taheri M (2003) Effects of planting arrangement and weed control on yied and yield components of red bean (*Phaseolus vulgaris L.*) cv. Akhtar. Seed and Plant Journal 19:1. [In Persian with English Abstract].
- Ghazanshahi J (1997) Soil and plant analysis. Motarjem Publications.
- Inal A, Gunes A, Zhang F, Cakmak I (2007) Peanut/maize intercropping induced changes in rhizosphere and nutrient concentrations in shoots. Journal of Plant Physiology and Biology 45: 350-356.
- Inal A, Gunes A (2008) Interspecific root interaction and rhizosphere effects on salt ions and nutrient uptake between mixed grown peanut/maize and peanut/barley in original salin-sodic-boron toxic soil. Journal of Plant Physiology 165: 490-503
- John SA, Mini C (2005) Biological efficiency of intercropping in okra (*Ablemoschus esculentus* (L.) Monech). Journal of Tropical Agriculture 43: 33-36.
- Kashi A (1991) The study of intercropping cucumber, tomat and pepper. Iranian Journal of Agricultural Science 23: 23-34. [In Persian with English Abstract].
- Khajehpour M (1997) Principles and fundamentals of crop production. Isfahan University Publications. [In Persian with English Abstract].
- Mazaheri D (1994) Intercropping. Tehran University Publication. [In Persian with English Abstract].
- Miri Kh (2006) Effects of sowing date and density on yield and components of okra, *Abelmoschus esculentus*. Moench in Iranshar. Seed and Plant Journal 22 (3): 36-45.
- Muoneke CO, Mbah EU (2007) Productivity of cassava with okra intercropping systems as influenced by okra planting density. African Journal of Agricultural Research 2(5): 223-231.
- Muoneke CO, Asiegbu JE (1997) Effect of okra planting density and arrangement in intercrop with maize on the growth and yield of the component species. Journal of Agronomy and Crop Science 179: 201-207.
- Muoneke CO, Ndukw O (2008) Effects of plant population and spatial arrangement on the productivity of okra/Amaranthus intercropping system. Agronomy Science 7 (1): 54-66.
- Odeleye FO, Odeleye OMO, Dada OA, Olaleye AO (2005) The response of okra to varying levels of poultry manure and plant population density under sole cropping. Journal of Food, Agriculture and Environment 3(3&4): 68-74.
- Ofosu-Anim J, Limbani NV (2007) Effect of intercropping on the growth and yield of cucumber (*Cucumis sativus L.*) and Okra (*Abelmoschus esculentus* L.). International Journal of Agriculture and Biology 8: 594-597.
- Olasantan FO (2001) Optimum plant population for okra in a mixture with cassava and its relevance to rainy season-based cropping system in southwestern Nigeria. Journal of Agricultureal Science 136: 207-214.
- Olasantan FO, Bello NJ (2004) Optimum sowing dates for okra in monoculture and mixture with cassava during the rainy season in the southwest of Nigeria . The Journal of Agricultural Science 142: 42-58.
- Yazdi-Samadi B, postini K (1993) Principles of arable crop production. Tehran University Publications. [In Persian with English Abstract].