

اثر منابع نیتروژن بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمغذی دانه ارقام پرمحصول  
*(Brassica napus L.)* کلزا

**Effect of Nitrogen Sources on Seed Yield, Fatty Acids Composition and Micro Nutrients Content in High Yielding Rapeseed (*Brassica napus L.*) Varieties**

معرفت مصطفوی راد<sup>۱</sup>، زین العابدین طهماسبی سروستانی<sup>۲</sup>،  
سید علی محمد مدرس ثانوی<sup>۳</sup> و امیر قلاوند<sup>۴</sup>

۱- دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و  
منابع طبیعی مرکزی، اراک.

۲ و ۳ و ۴- عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۹/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۹/۱۸

### چکیده

مصطفوی راد، م.، طهماسبی سروستانی، ز.، مدرس ثانوی، س. ع. م.، و قلاوند، ا. نیتروژن بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمغذی دانه ارقام پرمحصول کلزا (*Brassica napus L.*). مجله بهزیارتی نهال و بذر ۱۳۸۹-۱۳۸۷-۲۶-۲ (۴): ۴۰۱-۳۸۷.

به منظور ارزیابی عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات مرفولوژیک در ارقام زمستانه کلزا ای سازگار با مناطق سرد و خشک ایران و تعیین ارقام پرمحصول، آزمایش مزرعه‌ای در سال‌های زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک واقع در عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۴۲ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۷۷۵ متر از سطح دریا اجرا شد. در این آزمایش ۱۵ رقم زمستانه کلزا در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارقام لیکورود ۲۸۹۵ کیلوگرم در هکتار، مودنا ۲۸۶۰ کیلوگرم در هکتار و اوکاپی (۲۱۳۹) کیلوگرم در هکتار به ترتیب در مقایسه با سایر ارقام عملکرد دانه در هکتار بالاتری را داشتند. به منظور بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمغذی دانه ارقام پرمحصول کلزا در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۸ در همان منطقه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل ارقام کلزا دارای سه سطح V1 (اوکاپی)، V2 (مودنا) و V3 (لیکورود) و منابع نیتروژن (بر مبنای ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) در سه سطح N1 (آزو-کمپوست)، N2 (۵۰٪ آزو-کمپوست + ۵۰٪ اوره) و N3 (اوره) بودند. در این آزمایش، لیکورود بیشترین عملکرد دانه ۳۴۷۹۱ کیلوگرم در هکتار، گلوکوزینولات (۶/۶ میکروگرم بر کیلوگرم)، اسیدهای چرب استناریک (۲/۲٪) و لینولنیک (۱۷/۲٪)، میزان عناصر ریزمغذی آهن (۳۶۵/۶٪) قسمت در میلیون، روی، مس (۵/۹٪) قسمت در میلیون) و منگنز (۱۸۲/۵٪) فسمت در میلیون) را داشت. تقدیمه تلفیقی از نظر عملکرد دانه ۳۵۱۱/۵ کیلوگرم در هکتار، محتوی عناصر ریزمغذی نظیر مس (۵/۹٪) قسمت در میلیون) و منگنز دانه ۱۷۹/۲ (۱۷/۹٪) قسمت در میلیون) بر تیمارهای دیگر برتری نشان داد. نتایج نشان داد که با افزایش عملکرد دانه، کیفیت روغن کلزا کاهش یافت. در این تحقیق تیمار آزو-کمپوست کیفیت روغن را افزایش داد ولی تغذیه تلفیقی و رقم لیکورود از نظر عملکرد دانه نسبت به دیگر تیمارها برتری داشت.

واژه‌های کلیدی: کلزا، منابع نیتروژن، اسیدهای چرب، عناصر ریزمغذی و گلوکوزینولات.

عناصر غذایی به خاک حیات میبخشند و سال‌ها به تغذیه گیاهان بعدی نیز کمک می‌کنند (Ali Khan and Hussain Khan, 2006).  
کیفیت روغن کلنزا با ترکیب اسیدهای چرب نظیر اسید لینولئیک، اسید لینولنیک، اسید اولئیک، اسید استاریک و اسید پالمتیک تعیین می‌شود (Hu *et al.*, 1999). میزان این اسیدهای چرب در ارقام اصلاح شده به ترتیب ۲۰-۳۰، ۱۰-۲۰، ۵۰-۷۰، ۲-۳۰ و ۴-۱۰ درصد می‌باشد (Mattson and Grundy, 1985).  
گلوکوزینولات و پروتئین مسیر یوسنتزی مشترکی دارند و گلوکوزینولات‌ها از اسیدهای اینه مشتق می‌شوند (Blokhina *et al.*, 2003).  
کودهای نیتروژن‌دار ممکن است سرعت هیدرولیز ترکیب اسیدهای چرب و یا انتقال آنها از پروپلاستیدها به اجزاء سیتوسول را تحت تاثیر قرار دهند (Steer and Seiler, 2005). اغلب خاک‌های زراعی ایران به دلایل متعددی از قبیل قلیایی بودن، کمبود مواد آلی و حلالیت کم عناصر ریزمغذی، دچار کمبود آهن، روی و منگنز می‌باشند. از طرفی دانه‌های روغنی نیاز بالایی به عناصر ریزمغذی به ویژه آهن، منگنز، عنصر بور و روی دارند (Malakouti and Tehrani, 2001). نیاز کلنزا به عنصر روی دو برابر گندم گزارش شده است (Nuttall *et al.*, 1993). بدین ترتیب کاربرد آزوکمپوست می‌تواند در تامین عناصر ریزمغذی مورد نیاز کلنزا نقش بارزی ایفا نماید.  
اگر چه کلنزا برای تولید روغن و پروتئین کنجاله

#### مقدمه

کلنزا سومین گیاه روغنی مهم دنیاست که سطح کشت آن در مناطق معتدل دنیا به سرعت در حال افزایش است (Basalma, 2008). مهم‌ترین هدف تولید کنندگان و بهنژادگران کلنزا، افزایش عملکرد دانه و کمیت و کیفیت روغن می‌باشد که به شدت تحت تأثیر شرایط محیطی و اثر متقابل محیط × رقم قرار می‌گیرد. از طرفی در آینده افزایش سطح زیر کشت به سختی میسر خواهد بود و لازم است به زراعت‌های فشرده و ارقام پرمحصول توجه بیشتری شود (Marjanovic Jeromela *et al.*, 2008). یکی از راهکارهای موثر در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفیت، یافتن تیپ‌های ایده‌آل و پرمحصول، مناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه است. بنابراین مقایسه عملکرد ارقام و ژنوتیپ‌های رایج جهت شناسایی ارقام پرمحصول منطقه ضروری است.

علاوه بر این کمبود نیتروژن قابل دسترس از عوامل مهم محدود کننده عملکرد کلنزا زمستانه در بسیاری از مناطق تحت کشت کلنزا بشمار می‌رود (Rathke *et al.*, 2006). استفاده بهینه از منابع نیتروژن برای بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی امری ضروری است (Mason and Brennan, 1998). کودهای آلی نظیر آزوکمپوست (کمپوست فرآوری شده از سرخس آزولا) به عنوان منبع نیتروژن و دیگر

اثر منابع نیتروژن بر ...

شمالی و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۴۲ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۷۷۵ متر از سطح دریا در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند.

آزمایش دوم: در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ در همان منطقه جهت بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمندی در دانه سه رقم پرمحصول کلزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. قبل از اجرای آزمایش از عمق ۳۰ سانتی‌متری خاک نمونه برداری و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک تعیین شد (جدول ۱). تیمارها شامل ارقام کلزا دارای سه سطح V1 (اوکاپی)، V2 (مودنا) و V3 (لیکورد) و منابع نیتروژن (بر مبنای ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) دارای سه سطح N1 (آزوکمپوست)، N2 (۵۰ درصد آزوکمپوست + ۵۰ درصد اوره) و N3 (اوره بودند. هر کرت شامل ۲ پشته ۶۰ سانتی‌متری و ۶ خط کشت به فاصله ۱۵ سانتی‌متر و به طول ۶ متر بود و مقدار ۷۵ کیلوگرم فسفر خالص در هکتار از منبع سوپر فسفات تریپل نیز استفاده شد. کلیه عملیات زراعی کلزا بر اساس روش‌های متداول انجام شد. پس از رسیدگی محصول با حذف حاشیه، محصول کلزا با دست برداشت و میزان عملکرد دانه در هکتار بر مبنای رطوبت ۱۲ درصد و درصد روغن دانه به روش (Nuclear Magnetic Resonance) NMR

استفاده می‌شود، وجود سطح قابل توجهی از عناصر ریزمندی در کلزا سبب شده است برای تعیین و شناخت جنبه‌های مختلف تغذیه‌ای از بافت‌های رویشی کلزا به عنوان سبزی خوردن محور بسیاری از تحقیقات قرار گیرد. چون کلزا می‌تواند مقادیر قابل توجهی از عناصر پرصرف و کم مصرف مورد نیاز در رژیم غذایی را تامین نماید (Miller *et al.*, 2009). بنابراین با توجه به نیاز بالای گیاهان به کودهای نیتروژن‌دار و نقش این عنصر در رشد و نمو گیاهان و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از کاربرد بی‌رویه آن، استفاده از جایگزین‌های مناسب نظری آزوکمپوست ضروری به نظر می‌رسد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، ترکیب اسیدهای چرب و میزان عناصر ریزمندی در دانه سه رقم کلزا پرمحصول زمستانه در شرایط اقلیمی سرد و خشک اراک بود.

## مواد و روش‌ها

آزمایش اول: به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات مرفوولژیک ارقام زمستانه کلزا سازگار با مناطق سرد و خشک ایران و تعیین ارقام پرمحصول کلزا، در طی سال‌های زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ و ۱۳۸۷-۱۳۸۶ تعداد ۱۵ رقم کلزا دو صفر تیپ زمستانه در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک واقع در عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۵ دقیقه

### جدول ۱- خصوصیات فیزیکو-شیمیایی خاک محل آزمایش

Table 1. Physico-chemical properties of soil at the experimental site

سال زراعی	عمق نمونه (سانتیمتر)	هدایت الکتریکی	اسیدیته خاک	کربن آلی (%)	نیتروژن کل (%)	فسفر قابل جذب (میلی گرم بر کیلو گرم)	پتاسیم قابل جذب (میلی گرم بر کیلو گرم)	شن (%)	سیلت (%)	رس (%)
Growing season	depth (cm)	EC ds/m	PH	Organic carbon (%)	Total nitrogen (%)	Available phosphorus (mg/kg)	Available phosphorus (mg/kg)	Sand (%)	Silt (%)	Clay (%)
2006-2007	0-30	1.1	7.84	0.48	0.42	9.3	200	45	17	38
2007-2008	0-30	0.9	7.96	0.52	0.43	13	240	46	19	35
2008-2009	0-30	0.93	7.84	0.56	0.42	8.6	370	44	17	39

(Taylor and Smith, 1992) مطابقت داشت. در این تحقیق رقم آناتول و لیکورد از نظر تعداد خورجین در بوته تفاوت معنی دار نداشتند. ولی با توجه به وجود سازو کار جبرانی بین اجزاء عملکرد دانه در کلزا (Jensen *et al.*, 1996)، رقم لیکورد تعداد دانه بیشتری در هر خورجین داشت. از طرفی طول دوره رشد لیکورد بیشتر از آناتول بود و بدین ترتیب عملکرد دانه بیشتری نسبت به آناتول تولید کرد. نتایج نشان داد که تولید تعداد مناسبی از خورجین‌ها که بتواند چرخه رشد خود را به طور طبیعی کامل کنند، می‌تواند نقش بارزی در افزایش عملکرد دانه ایفا کنند و تنها بالا بودن تعداد خورجین در بوته نمی‌تواند دستیابی به عملکرد بالا در محصول کلزا را تضمین کند.

در آزمایش دوم تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که ارقام کلزا برای کلیه صفات اندازه‌گیری شده به استثناء اسید چرب لینولئیک تفاوت بسیار معنی دار داشتند (جدول ۴). اثر منبع نیتروژن و برهمکنش رقم × منابع نیتروژن بر تمامی صفات مورد مطالعه بسیار معنی دار بود (Nasri *et al.*, 2008). نصری و همکاران (2008) نشان دادند که ارقام کلزا از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه متفاوت بودند ولی از نظر محتوی روی دانه تفاوت معنی داری نداشتند. ترکیب اسیدهای چرب در ارقام مختلف سویا نیز بسته به نوع شرایط محیطی، متفاوت گزارش شده است (Voldeng *et al.*, 1997). در حالیکه میلر و همکاران (Miller *et al.*, 2009)

پروتئین دانه به روش اینفرماتیک (Inframatic 8620) و اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High Performance Liquid Chromatography) عناصر ریزمغذی به روش جذب اتمی (Atomic Absorption) اندازه‌گیری شدند. تجزیه واریانس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS و مقایسه میانگین‌ها به روش LSD انجام شد.

## نتایج و بحث

تجزیه واریانس مرکب داده‌های آزمایش اول نشان داد که ارقام مختلف کلزا از نظر ارتفاع بوته، طول دوره رشد، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن تفاوت معنی داری ( $P \leq 0.01$ ) داشتند (جدول ۲). نصری و همکاران (Nasri *et al.*, 2008) نیز نشان دادند که ارقام کلزا از نظر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه تفاوت‌های معنی دار داشتند. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که ارقام لیکورد، مودنا و اوکاپی به ترتیب در مقایسه با دیگر ارقام عملکرد دانه بالاتری دارا بودند (جدول ۳). در این تحقیق، رقم لیکورد از نظر تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن به ترتیب بر ارقام مودنا و اوکاپی برتری داشت (جدول ۳). تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه از اجزای مهم عملکرد دانه بودند که با نتایج تحقیقات تیلور و اسmit

## جدول ۲- خلاصه تجزیه واریانس مرکب برای خصوصیات مختلف در ارقام کلزا

Table 2. Summary of combined analysis of variance for different characteristics in rapeseed varieties

S.O.V.	منبع تغیرات	درجه آزادی	میانگین مربعات MS								
			df.	ارتفاع بوته	شاخه های فرعی	دوره رویش	تعداد خورجین در گیاه	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه	عملکرد دانه	عملکرد روغن
				Plant height	Secondary branches	Growth duration	Siliques per plant	Seed per siliques	1000 seed weight	Seed yield	Oil yield
Year (y)	سال	1	663.14**	1.003**	422.50**	5555.45**	39.309**	0.112**	37781.51**	306583.76**	
R(Y)	تکرار در سال	4	0.26	0.32	0.033	0.397	0.019	0.0058	220.04	9728.068	
Variety (V)	رقم	14	748.69**	7.875 <sup>ns</sup>	71.424**	7546.73**	88.587**	0.490**	891129.09**	494248.238**	
Y × V	سال × رقم	14	239.82**	0.279 <sup>ns</sup>	20.0238**	480.02**	7.267**	0.0332**	184221.42**	88373.557**	
Error	خطا	56	0.157	0.2008	0.214	0.462	0.0147	0.0053	351.41	18087.723	
C.V.%	ضریب تغیرات (%)		0.35	2.97	0.056	0.58	0.44	1.96	0.62	5.69	

\* and \*\*: Significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

ns: Non-significant.

\* و \*\*: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال ۵٪ و ۱٪.

ns: غیر معنی دار

### جدول ۳- مقایسه میانگین خصوصیات مختلف در ارقام مختلف کلزا

Table 3. Mean comparison for different characteristics in different rapeseed varieties

	ارتفاع بوته (سانتی متر)	شاخه های فرعی	دوره رویش	تعداد خورجین در بوته	تعداد دانه در خورجین	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار)	عملکرد روغن (کیلو گرم در هکتار)
	Plant hieght (cm)	Secondary branches	Growth period	Siliques per plant	Seeds per silique	1000 seed weight (g)	Seed Yield (kg/ha)	Oil yield (kg/ha)
<b>Growing season سال زراعی</b>								
2005-2006	116.93a	4.658b	264.27a	108.84b	28.08a	3.674b	3014.49b	2304.56b
2006-2007	111.5b	4.869a	259.93b	124.55a	26.76b	3.745a	3055.47a	2421.29a
<b>Variety رقم</b>								
Anatol	91.37l	6.40b	251.500j	199.75a	21.83k	3.538f	2256.83m	1809.50h
Billy	110.38h	5.05de	263.00e	112.22c	29.25b	3.658de	2596.50l	2034.45g
Talayeh	120.97d	5.00e	260.500i	84.63k	38.167a	3.523f	2906.17h	2222.13ef
GK Helena	134.08a	3.866i	265.500a	112.23c	21.67l	3.830c	3007.50f	2300.47ef
Gkh 1103	117.27e	2.733k	264.17d	99.017h	28.73d	3.651de	3180.50e	2493.06bc
GKH 305	115.98f	5.233c	265.00b	91.083i	26.00i	3.623e	3176.67e	2509.06bc
Licord	132.23b	6.600a	261.500g	199.75a	28.32e	4.403a	3794.67a	2895.44a
Lilian	106.37i	4.267g	264.00d	89.167j	27.92f	3.438g	3246.33d	2579.00b
Lioness	113.95g	3.617j	265.500a	107.78e	28.93c	3.537f	2759.33k	2213.72ef
Modena	103.02k	4.117gh	262.00f	104.70f	26.57h	3.455fg	3655.00b	2860.37a
Oase	117.6e	4.783f	262.00f	132.083b	28.26e	3.515fg	2856.17i	2323.25de
Okapi	105.33j	6.667a	260.500h	102.95g	27.26g	3.518fg	3276.67c	2139.08fg
Opera	105.45j	5.167cd	260.83h	102.42g	26.61h	4.112b	2819.83j	2228.23ef
SLM046	122.8c	4.100h	261.00h	102.42g	28.06	3.723d	2973.33g	2394.66cd
Zarfam	116.42f	3.85i	264.50c	110.67d	23.68j	4.117b	3019.17f	2440.65bcd

میانگین هایی، در هر ستون و برای هر عامل، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد برا اساس آزمون حداقل تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level- Using LSD.

لیکورد می‌تواند ناشی از قابلیت بیشتر آن در جذب عناصر غذایی ریزمغذی و سایر منابع رشد در جهت افزایش عملکرد دانه باشد. در این تحقیق رقم اوکاپی کمترین عملکرد دانه و بیشترین میزان اسیدهای چرب پالمیتیک و اولئیک را دارا بود. نتایج نشان می‌دهد که افزایش عملکرد دانه و کیفیت روغن کلزا روند معکوسی دارند. اثر منابع مختلف تغذیه نیتروژن نیز بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود (جدول ۴). این نشان می‌دهد که مدیریت تغذیه نیتروژن، کارایی مصرف منابع به وسیله گیاه زراعی را تغییر می‌دهد.  
(Kramer *et al.*, 2002)

تغذیه تلفیقی از نظر عملکرد دانه بر تیمارهای دیگر برتری نشان داد که با نتایج سیلینگ و همکاران (Sieling *et al.*, 1998) و مولکی و همکاران (Mooleki *et al.*, 2004) و راتک و همکاران (Rathke *et al.*, 2005) مطابقت داشت. در تغذیه تلفیقی در مقایسه با آزوکمپوست جذب عناصر ریزمغذی منگنز و مس افزایش یافت و با کاربرد اوره روند نزولی نشان داد. بنابر این می‌توان دریافت که کاربرد تلفیقی آزوکمپوست با اوره در فراهمی و جذب عناصر غذایی ریزمغذی و افزایش عملکرد دانه کلزا نقش بارزی دارد چون مواد آلی به عنوان منبع عناصر غذایی برای گیاهان عمل می‌کنند و عملکرد محصولات زراعی را افزایش می‌دهند (Akhtar and Malik, 2000).

روغن دانه به تیمار آزوکمپوست و بیشترین

نشان دادند که بین ارقام کلزا تفاوت معنی داری از نظر محتوی عناصر ریزمغذی آهن، روی و مس وجود نداشت. علاوه بر این تفاوت های معنی داری بین ژنتیپ های کلزا از نظر جذب و استفاده نیتروژن از منابع مختلف گزارش شده است (Sieling *et al.*, 1998). مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم لیکورد از نظر عملکرد دانه، اسیدهای چرب استواریک و لینولینیک و غلظت گلوکوزینولات کنجاله و عناصر ریزمغذی آهن، روی، مس و منگنز بر ارقام دیگر برتری داشت (جدول ۵).

در هر سه رقم پرمحصول کلزا با کاهش عملکرد دانه میزان اسید لینولینیک نیز کاهش نشان داد. بدین ترتیب اسید لینولینیک را می توان یکی از عوامل موثر در افزایش عملکرد دانه ارقام پرمحصول کلزا برشمرد، چون اسید لینولینیک نقش مهمی در فتوستنتر ایفا می کند (Hugly *et al.*, 1989) و سنتر لینولینیک برای توسعه دانه گرده ضروری است (McConn and Browse, 1996). میزان گلوکوزینولات کنجاله نیز در رقم لیکورد بیشتر از ارقام دیگر بود. به نظر می رسد که ارقام پرمحصول کلزا محتوی گلوکوزینولات بیشتری نیز هستند و ممکن است حذف کامل گلوکوزینولات منجر به کاهش چشمگیر عملکرد دانه شود. علاوه بر این دانه های روغنی نیاز بالایی به عناصر ریزمغذی نظیر آهن، منگنز و روی دارند (Malakouti and Tehrani, 2001).

در نتیجه بخشی از افزایش عملکرد رقم

## جدول ۴- خلاصه تجزیه واریانس برای خصوصیات مختلف در ارقام کلزا تحت تاثیر منابع نیتروژن

Table 4. Summary of analysis of variance for different characteristics in rapeseed varieties as affected by nitrogen sources

S.O.V.	منبع تغیر	درجه آزادی df	MS میانگین مربوطات													روز	
			عملکرد دانه Seed yield	درصد روغن Oil content	درصد پروتئین Protein content	عملکرد روغن Oil yield	گلوکوزینولات Glucosinolate	پالمیتیک Palmitic	استاریک Stearic	اوئیک Oleic	لینولیک Linoleic	لینولنیک Linolenic	آهن Fe	منگنز Mn	مس Cu		
Replication	تکرار	2	5419.1 <sup>ns</sup>	0.007 <sup>ns</sup>	0.004 <sup>ns</sup>	1261.3 <sup>ns</sup>	0.013 <sup>a</sup>	0.00006 <sup>ns</sup>	0.00003 <sup>ns</sup>	0.009 <sup>ns</sup>	0.0001 <sup>ns</sup>	0.23 <sup>ns</sup>	1.21 <sup>ns</sup>	0.005 <sup>ns</sup>	0.056 <sup>ns</sup>		
Variety (V)	رقم	2	514982.4 <sup>**</sup>	2.926 <sup>**</sup>	103.033 <sup>**</sup>	9747.6 <sup>**</sup>	1.735 <sup>**</sup>	0.0344 <sup>**</sup>	0.0220 <sup>**</sup>	0.5468 <sup>**</sup>	0.006 <sup>ns</sup>	0.7568 <sup>**</sup>	44726.13 <sup>**</sup>	747.35 <sup>**</sup>	3.183 <sup>**</sup>	91.151 <sup>**</sup>	
Nitrogen source (N)	منبع نیتروژن	2	1449734.5 <sup>**</sup>	0.503 <sup>**</sup>	3.169 <sup>**</sup>	248873.5 <sup>**</sup>	0.997 <sup>**</sup>	0.1308 <sup>**</sup>	0.2066 <sup>**</sup>	0.7091 <sup>**</sup>	1.224 <sup>**</sup>	1.9576 <sup>**</sup>	179332.6 <sup>**</sup>	16.94 <sup>**</sup>	2.314 <sup>**</sup>	3.169 <sup>**</sup>	
N × V	رقم × منبع نیتروژن	4	47921.3 <sup>**</sup>	1.202 <sup>**</sup>	0.559 <sup>**</sup>	19459.4 <sup>**</sup>	1.725 <sup>**</sup>	0.0455 <sup>**</sup>	0.0069 <sup>**</sup>	0.3261 <sup>**</sup>	0.106 <sup>**</sup>	0.2263 <sup>**</sup>	19017.45 <sup>**</sup>	28.05 <sup>**</sup>	1.609 <sup>**</sup>	0.559 <sup>**</sup>	
Error	خطا	16	1797.59	0.017	0.027	449.81	0.001	0.0002	0.0001	0.00001	0.0079	0.00002	1.43	0.0904	0.142	0.082	
C.V. (%)	ضریب تغییرات (%)		1.28	0.31	0.71	1.49	0.55	0.35	0.57	0.01	0.52	0.07	0.35	0.51	2.53	0.51	

\* and \*\*: Significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.

.٪ احتمال ۵٪ و ۱٪

ns: Non-significant.

ns: غیر معنی دار

## جدول ۵- مقایسه میانگین اثر رقم و منابع نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن، ترکیب اسیدهای چرب روغن و میزان عناصر غذایی ریزمغذی در دانه کلزا

Table 5. Mean comparison for effect of varieties and nitrogen source on seed and oil yield, seed oil fatty acids composition and micro nutrients content in canola

	عملکرد دانه (کیلو گرم در هکتار) Seed yield (kg/ha)	درصد روغن Oil content (%)	درصد پروتئین Protein content (%)	عملکرد روغن (کیلو گرم در هکتار) Oil yield (kg/ha)	گلوکوزینولات (میکرومول بر کیلو گرم) Glucosinolate (μmol/kg)	پالمیتیک (%) Palmitic (%)	استاریک (%) Stearic (%)	اوئیک (%) Oleic (%)	لینولیک (%) Linoleic (%)	لینولنیک (%) Linolenic (%)	آهن (میلی گرم بر کیلو گرم) Fe (ppm)	منگنز (میلی گرم بر کیلو گرم) Mn (ppm)	رس (میلی گرم بر کیلو گرم) Cu (ppm)	مس (میلی گرم بر کیلو گرم) Zn (ppm)	روز	
															رقم	منبع تغییر
V1	3215.81c	42.53c	25.30a	1366.42c	6.6544b	4.304a	2.1674c	66.728a	17.243a	7.935c	290.89c	172.84c	5.258c	56.327b		
V2	3275.89b	43.19a	21.46c	1414.99b	6.384c	4.251b	2.205b	66.694b	17.247a	8.022b	356.207b	181.213b	5.755b	54.874c		
V3	3479.33a	42.80b	24.03b	1485.90a	6.891a	4.236c	2.224a	66.466c	17.214a	8.259a	365.62a	182.54a	5.917a	58.523a		
																Nitrogen source
N1	3064.74c	42.89a	23.89a	1314.68c	6.82a	4.34a	2.116	66.808a	17.427	7.767c	397.62a	178.71b	5.678b	57.63a		
N2	3511.52a	42.69b	23.69b	1498.88a	6.678b	4.227b	2.189b	66.493c	17.261b	8.172b	370.29b	179.72a	5.916a	56.44b		
N3	3394.78b	42.94a	23.22c	1453.75b	6.436c	4.22b	2.29a	66.585b	17.004c	8.277a	244.79c	178.16c	5.334c	55.645c		

میانگین هایی، در هر ستون و برای هر عامل، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دارند.

Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level- Using LSD.

V1، V2 و V3: به ترتیب اوکاپی، مودنا و لیکورد. N1، N2 و N3: به ترتیب آزو کمپوست ۵۰٪ درصد، آزو کمپوست + ۵۰٪ درصد اوره و اوره.

V1, V2 and V3: Okapi, Modena and Licord, respectively. N1, N2 and N3: Azocompost, 50% Azocompost + 50% Urea, and Urea, respectively.

اسید در تیمار اوره بیشتر بود. اسید اولئیک بیشترین میزان از اسیدهای چرب روغن کلزا را تشکیل می‌دهد و تغییرات عمدۀ آن در طی دوره نمو دانه اتفاق می‌افتد و شرایط نامساعد محیطی در این مرحله سبب تبدیل اسید اولئیک به اسید اروسیک شده و کیفت روغن را کاهش می‌دهد (Ahmad and Abdin, 2000).

چنین استنباط می‌شود که بهبود شرایط محیطی در طی نمو دانه در اثر کاربرد آزوکمپوست عاملی برای کاهش سنتز اسید اولئیک به اسید اروسیک و در نتیجه افزایش کیفیت روغن می‌باشد. همچنین گزارش شده است که کودهای آلی نظیر کمپوست، کود دامی، کود سبز و غیره برای رفع کمبود اغلب عناصر غذایی به ویژه آهن ضروری است (Malakouti and Tehrani, 2001). این نتایج با یافته‌های گوارتز و لمی (Govarts and Lemey, 2000) و دانیل و همکاران (Daniel *et al.*, 2001) نیز مشابه بود. اثر منابع نیتروژن بر اسیدهای چرب روند یکسانی نداشت و تاثیرپذیری اسیدهای چرب از منابع مختلف نیتروژن، متفاوت بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود آلی آزوکمپوست درصد روغن دانه را از طریق افزایش سنتز اسیدهای چرب به ویژه اولئیک و لینولئیک افزایش داد. کاربرد اوره محتوی اسیدهای چرب استئاریک و لینولئیک را افزایش و میزان اولئیک و لینولئیک را کاهش داد که می‌تواند ناشی از رقابت پروتئین با سنتز اسیدهای چرب دانه به

درصد پروتئین دانه به تیمار اوره اختصاص داشت. چون افزایش کود نیتروژن دار، سنتز پروتئین را به بهای کاهش سنتز روغن تشدید می‌کند (Lambers and Porter, 1992). تحقیقات نشان داده است که نیتروژن در کودهای آلی به آهستگی آزاد و به مقدار کمتری جذب گیاه می‌شود و در نتیجه سنتز پروتئین کاهش و درصد روغن دانه افزایش می‌یابد (Roe *et al.*, 1997).

در این تحقیق گلوکوزینولات کنجاله روند معکوس نشان داد. به نظر می‌رسد افزایش گلوکوزینولات ناشی از فراهمی بیشتر گوگرد در اثر کاربرد آزوکمپوست باشد. در این راستا گزارش‌های متناقضی وجود دارد. به طوری که فورستر (Forster, 1978) دریافت که با افزایش نیتروژن درصد روغن کاهش و میزان گلوکوزینولات کنجاله افزایش یافت. برخی محققان دیگر گزارش کرده‌اند که افزایش گوگرد و نیتروژن سبب افزایش گلوکوزینولات می‌شود (Grant and Baily, 1993). در حالیکه بیلزبورو و همکاران (Bilsborrow *et al.*, 1993) کمبود نیتروژن را عاملی برای افزایش گلوکوزینولات بر شمرده‌اند و اثر نیتروژن بر میزان گلوکوزینولات را از سالی به سال دیگر متفاوت گزارش کرده‌اند.

علاوه بر این میزان اسیدهای چرب پالمیتیک، اولئیک و لینولئیک و عنصر آهن در تیمار آزوکمپوست و میزان استئاریک و لینولئیک

## جدول ۶- مقایسه میانگین اثر متقابل منبع نیتروژن × رقم بر روی خصوصیات مختلف کلزا

Table 6. Mean comparison for nitrogen sources × variety interaction on different characteristics in rapeseed

منبع نیتروژن	ارقام	منبع نیتروژن	عملکرد دانه	درصد روغن	درصد پروتئین	عملکرد روغن (کیلوگرم در هکتار)	گلوکوزینولات (میکرومول بر کیلوگرم)	پالمیتیک (%)	استاریک (%)	اوئیک (%)	لینولیک (%)	لینولنیک (%)	آهن	منگنز	من	روی
Source of nitrogen	Variety	Seed yield (kg/ha)	Oil content (%)	Protein content (%)		Oil yield (kg/ha)	Glucosinolate (μmol/kg)	Palmitic (%)	Stearic (%)	Oleic (%)	Linoleic (%)	Linolenic (%)	Fe (ppm)	Mn (ppm)	Cu (ppm)	Zn (ppm)
N1	V1	2945.56g	42.67d	25.61a	1256.77g	7.031a	4.383a	2.094g	67.124a	17.402b	7.454i	305.619f	172.04f	5.166d	57.566c	
	V2	3038.22f	43.22b	21.58e	1314.16f	6.516e	4.36b	2.122f	66.739b	17.557a	7.725h	415.69b	181.55c	5.873b	58.523b	
	V3	3210.44e	42.78cd	24.47c	1373.13e	6.90b	4.289d	2.132f	66.564f	17.325b	8.121e	471.551a	182.55b	5.998ab	56.817d	
N2	V1	3350.00d	42.10f	25.57a	1407.94d	6.362f	4.223e	2.184e	66.478h	17.328b	8.099f	370.531d	173.83e	6.059a	55.079f	
	V2	3433.44c	42.86c	21.67e	1471.73b	6.908b	4.169f	2.187de	66.725c	17.231c	8.080g	387.667c	180.24d	5.666c	54.081g	
	V3	3751.11a	43.10b	23.83d	1616.97a	6.762c	4.289d	2.198d	66.278i	17.226c	8.337a	352.692e	185.10a	6.024a	60.171a	
N3	V1	3351.89d	42.82c	24.71b	1434.56c	6.570d	4.306c	2.224c	66.583e	17.001e	8.253d	196.523i	172.64f	4.549e	56.337e	
	V2	3356.00d	43.48a	21.14f	1459.09b	5.727g	4.225e	2.307b	66.617d	19.922e	8.259c	265.256h	181.86bc	5.726c	52.017h	
	V3	3476.44b	42.53e	23.80d	1467.60b	7.010a	4.129g	2.340a	66.557g	17.091d	8.318b	272.617g	179.98d	5.728c	58.582b	

میانگین هایی، در هر ستون، که دارای حداقل یک حرف مشترک می باشد بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی دار در سطح احتمال ۵٪ تفاوت معنی دار ندارند.

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level- Using LSD.

V1, V2 و V3: به ترتیب اوکاپی، مودنای و لیکورد. N1, N2 و N3: به ترتیب آزو کمپوست ۵۰ درصد، آزو کمپوست + ۵۰ درصد اوره و اوره.

V1, V2 and V3: Okapi, Modena and Licord, respectively. N1, N2 and N3: Azocompost, 50% Azocompost + 50% Urea and Urea, respectively.

به ترتیب به اثر متقابل آزوکمپوست × اوکاپی و آزوکمپوست × مودنای تغذیه تلفیقی × لیکورد و بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن به اثر متقابل تغذیه تلفیقی × لیکورد اختصاص داشت (جدول ۶). این نتایج نشان می‌دهد تاثیرپذیری اسیدهای چرب از آزوکمپوست در ارقام مختلف کلزا، متفاوت بود. تغییرات عملکرد کمی و کیفیت کلزا در واکنش به آزوکمپوست معکوس می‌باشد. ملکوتی و تهرانی (Malakouti and Tehrani, 2001) نیز اثر متقابل آهن و منگنز و مس را گزارش کرده‌اند به طوری که مقدار زیادی از منگنز در خاک می‌تواند مصرف آهن در گیاه را تحت تاثیر قرار دهد و کمبود مس سبب تجمع آهن در بافت‌های گیاهی می‌شود ولی زیادی مس در خاک باعث کمبود آهن در گیاه می‌شود. بطور کلی نتایج نشان داد که تغذیه تلفیقی منابع نیتروژن می‌تواند در افزایش کمی و کیفیت کلزا نقش بارزی ایفا کند و رقم لیکورد در تغذیه تلفیقی از عملکرد دانه بالایی برخوردار بود.

ویژه اولئیک و لینولئیک به هنگام فراهمی بیشتر نیتروژن در اثر کاربرد اوره باشد. چون فراهمی بیشتر نیتروژن، سنتز پروتئین را به بهای کاهش سنتز اسیدهای چرب، تشدید می‌کند (Rathke *et al.*, 2005). بدین ترتیب به نظر می‌رسد که آزوکمپوست از طریق حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از وقوع تنفس‌های آبی سبب افزایش سنتز اسید چرب لینولئیک می‌شود. بنابراین عوامل محیطی نسبت اسیدهای چرب را در محصولات دانه‌های روغنی تعیین می‌نماید (Baldini *et al.*, 2000). نتایج نشان داد که کلزا بسته به نوع منبع کود نیتروژن‌دار و رقم می‌تواند عناصر ریزمغذی آهن، منگنز، مس و روی را که در رژیم غذایی ضروری می‌باشند تأمین کند. محققان دیگری نیز نتایج مشابهی گزارش کرده‌اند (Miller *et al.*, 2009; Fowke *et al.*, 2006). بدین ترتیب گزینش رقم و مدیریت تغذیه مناسب با نیتروژن در زراعت کلزا برای افزایش عملکرد کمی و کیفیت و نوع کاربرد آن حائز اهمیت زیادی است. علاوه بر این بیشترین میزان اسیدهای چرب اولئیک، لینولئیک و لینولنیک

## References

- Ahmad, A., and M. Z. Abdin . 2000.** Effect of sulphur application on lipid, RNA and fatty acid content in developing seeds of rapeseed (*Brassica campestris* L.). *Plant Science* 150: 71–76.
- Akhtar, M., and Malik, A., 2000.** Role of organic soil amendments and soil organisms in the biological control of plant parasitic nematodes: A review. *Bioresource Technology* 74: 35-47.
- Ali Khan, R., and Hussain Khan, M., 2006.** Organic farming – composting and its mechanism. Connecting Agri-Community for better farming. Pakistan's Largest

Agricultural Website

- Baldini, M., Giovanardi, R., and Vannozzi, G. P. 2000.** Effects of different water availability on fatty acid composition of the oil in standard and high oleic sunflower hybrids. Pp. 79-84. In: Proceedings of the 15<sup>th</sup> International Sunflower Conference, France.
- Basalma, D. 2008.** The correlation and path analysis of yield and yield components of different winter rapeseed (*Brassica napus* L.) cultivars. Research Journal of Agricultural and Biological Science 4: 120-125.
- Bilsborrow, P. E., Evans, E. J., and Zhao, F. J. 1993.** The influence of spring nitrogen on yield, yield components and glucosinolate content of autumn-sown oilseed rape (*Brassica napus*). ]. Agricultural Science 120: 219–224.
- Blokhina, O., Virolainen, E., and Fagerstedt, K. V. 2003.** Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: A review. Annual Botany 91: 179-194.
- Daniel, J., Miralles, B., Ferro, C., and Slafer, G. A. 2001.** Developmental responses to sowing date in wheat, barley and rapeseed. Field Crops Research 71 (3): 211-223.
- Forster, H. 1978.** Influence of N and K fertilizers on the quality and yield of oil from old and new varieties of rapeseed (*Brassica napus* ssp. *oleifera*). Pp. 305–310. In: Fertilizer use and Production of Carbohydrates and Lipids.
- Fowke, J. H., Morrow, J. D., Motley, S., Bostick, R. M., and Ness, R. M. 2006.** Brassica vegetable consumption reduces urinary F2-isoprostane levels independent of micronutrient intake. Carcinogenesis 27 (10): 2096-2102.
- Grant, G. A., and Baily, L. D. 1993.** Fertility management in canola production. Canadian Journal of Plant Science 73: 651-870.
- Govarts, C., and Lemey, J. 2000.** Characterization of triglycerides isolated from Jojoba oil. Journal of American Oil Chemistry Society 77: 1325-1328.
- Hugly, S., Kunt, L., Browse, J., and Somerville, C. 1989.** Enhanced thermal tolerance of photosynthesis and altered chloroplast ultrastructure in a mutant of *Arabidopsis* deficient in lipid desaturation. Plant Physiology 90: 1134-1142.
- Hu, J., Li, G., Struss, D., and Quiros, C. F. 1999.** SCAR and RAPD markers associated with 18- carbon fatty acids in rapeseed (*Brassica napus* L.). Plant Breeding 118: 145-150.
- Jensen, C. R., Mogensen, V. O., Mortensen, G., and Fieldsen, J. K. 1996.** Seed glucosinolate, oil and protein contents of field grown rape (*Brassica napus* L.) affected by soil drying and evaporative demand. Field Crops Research 47: 93-105.
- Kramer, A. W., Timothy, A. D., Horwath, W. R., and Kessel, C. V. 2002.** Combining fertilizer and organic input synchronize N supply in alternative cropping system in

- California. Agriculture, Ecosystem & Environment 91: 233-243.
- Lambers, H., and Porter, H. 1992.** Inherent variation in growth rate between higher plants: a search for physiological causes and ecological consequences. Advanced Ecological Researches 23: 187 - 261.
- Malakouti, M. J., and Tehrani, M. M. 2001.** Effects of micronutrients on the yield and quality of Agricultural products 'Micro Nutrients with Macro Effects. 2nd edition. Tarbiat Modares University Press. pp.299 (In Persian).
- Marjanovic-Jeromela, A., Marinkovic, R., Mijic, A., Zdunic, Z., Ivanovska, S., and Jankulovska, M. 2008.** Correlation and path analysis of quantitative traits in winter rapeseed (*Brassica napus* L.). Agriculturae Conspectus Scientificus 73 (1): 13-18.
- Mason, M. G., and Brennan, R. F. 1998.** Comparison of growth response and nitrogen uptake by canola and wheat following application of nitrogen fertilizer. Journal of Plant Nutrition 21 (7): 1483 – 1499.
- Mattson, F. H., and Grundy, S. M., 1985.** Comparison of the effect of dietary saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids on plasma lipids and lipoproteins in men. Journal of Lipid Research 26: 194-202.
- McConn, M., and Browse, J., 1996.** The critical requirement for linolenic acid is pollen development, net photosynthesis, in an *Arabidopsis* mutant. The Plant Cell 8: 403-416.
- Miller-Cebert, R. L., Sistani, N. A. and Cebert, E. 2008.** Comparative mineral composition among canola cultivars and other cruciferous leafy greens. Journal of Food Composition and Analysis. 22: 112-116.
- Mooleki, S. P., Schoenau, J. J., Charles, J. L., and Wen, G. 2004.** Effect of rate, frequency and incorporation of feedlot cattle manure on soil nitrogen availability, crop performance and nitrogen use efficiency in east-central Saskatchewan. Canadian Journal of Soil Science 84: 199-210.
- Nasri, M., Khalatbari, M., Zahedi, H., Paknejad, F., and Tohidi-Moghadam, H. R. 2008.** Evaluation of micro and macro elements in drought stress condition in cultivars of rapeseed (*Brassica napus* L.). American Journal of Agricultural and Biological Sciences 3 (3): 579-583,
- Nuttall, W. F., Boswell, C. C., Sinc, A.G., Moulin, S. A., Townley-Smith, L. J., and Gallway, G. L. 1993.** The effect of time of application and placement of sulphur fertilizer source on yield of wheat, canola and barley. Communication of Soil Science and Plant Analysis 24: 2143-2202.
- Rathke, G. W., Behrens, T., and Diepenbrock, W. 2006.** Integrated nitrogen management strategies to improve seed yield, oil content and nitrogen efficiency of winter oilseed rape

- (*Brassica napus* L.): A review. Agriculture, Ecosystem & Environment 117: 90-108.
- Rathke, G. W., Christen, O., and Diepenbrock, W. 2005.** Effects of nitrogen source and rate on productivity and quality of winter oilseed rape (*Brassica napus* L.) grown in different crop rotations. Field Crops Research 94: 103-113.
- Roe, N. E., Stoffella, P. J., and Greatz, D. 1997.** Compost from various municipal solid waste feed stocks affect vegetable crops. I: Emergence and seedling growth. Journal of American Society of Horticultural Science 122: 427-432.
- Sieling, K., Schroder, H., and Hanus, H. 1998.** Mineral and slurry nitrogen effects on yield, N- uptake, and apparent N-use efficiency of oilseed rape (*Brassica napus* L.). Journal of Agricultural Science (Cambridge) 130: 165–172.
- Steer, T. B., and Seiler, J. G. 2005.** Change in fatty acid composition of sunflower (*Helianthus annus* L.) seeds in response to time of nitrogen application, supply rates and defoliation. Journal of the Science of Food and Agriculture 51(1): 11-26.
- Taylor, A. J., and Smith, C. J. 1992.** Effect of sowing date and seeding rate on yield and yield Components of irrigated Canola (*Brassica napus* L.) grown on a red-brown earth in south eastern Australia. Australian Journal of Agricultural Research 43: 1629 – 1641.
- Voldeng, H. D., Cober, E. R., Hume, D. J., Gillard, C., and Morrison, M. J. 1997.** Fifty eight years of genetic improvement of short season soybean cultivars in Canada. Crop Science 37: 428-431.