

زیست‌چینه‌نگاری و محیط دیرینه نهشته‌های سازند قم در شمال خاور ماه‌نشان

جهانبخش دانشیان^{۱*}، مصطفی شهرابی^۲ و معصومه اخلاقی^۱

^۱ گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
^۲ شرکت زرناب اکتشاف، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۱۲/۰۴

چکیده

در این مطالعه ۷۵ نمونه از نهشته‌های سازند قم در برش چینه‌شناسی اندآباد در شمال خاور ماه‌نشان از نظر روزن‌داران موجود مورد بررسی قرار گرفتند. سازند قم در برش یادشده با ستبرای ۳۰۱ متر شامل سنگ آهک و مارن بوده و مرز آن با نهشته‌های سازند سرخ فوقانی در بالا و سازند سرخ زیرین در پایین به صورت ناپوستگی هم شیب است. در این بررسی به طور کلی ۳۹ جنس و ۶۵ گونه از روزن‌داران کفزی و ۳ جنس و ۵ گونه از روزن‌داران پلانکتون تشخیص داده شد که ۳۷ جنس و ۵۷ گونه از روزن‌داران از این ناحیه برای نخستین بار گزارش می‌شوند. از میان میکروفسیل‌های موجود، روزن‌داران کفزی با توجه به تنوع و فراوانی اهمیت بیشتری داشته و مبنای بررسی زیست‌چینه‌نگاری قرار گرفتند. به علت شباهت مجموعه روزن‌داران کفزی سازند قم و سازند آسماری و نبود یک زون‌بندی زیستی رسمی برای سازند قم، از زون‌بندی زیستی (Adams & Bourgeois (1967) که برای سازند آسماری ارائه شده در بررسی‌های زیست‌چینه‌نگاری و تعیین سن نسبی نهشته‌های سازند قم در برش چینه‌شناسی اندآباد استفاده شد. بر همین اساس و با توجه به گونه‌های شاخص معرفی شده در زون‌بندی زیستی یادشده برش چینه‌شناسی اندآباد با زیست‌زون‌های شماره ۱ و ۲ قابل تطبیق و مقایسه است. بر پایه حضور، تجمع و گسترش چینه‌شناسی روزن‌داران سن نهشته‌های سازند قم در برش اندآباد اکتیانین پسین تا بوردیگالین تعیین شد. تجمع، فراوانی و تنوع گونه‌های روزن‌داران در نمونه‌های برش اندآباد تغییر شرایط محیطی را نشان می‌دهد و در طول برش تنوع روزن‌داران به طور متناوب کاهش و افزایش می‌یابد. این در حالی است که بیشترین تنوع روزن‌داران تا ۱۶ گونه می‌رسد. نهشته‌های سازند قم در برش اندآباد بر مبنای تغییرات تنوع گونه‌ای به ۹ تجمع (I تا A (assemblage) تقسیم‌بندی شد. بر پایه فراوانی روزن‌داران در هر تجمع نهشته‌های سازند قم مربوط به محیط دریایی و سکوی قاره‌ای درونی (inner shelf) بوده و با تغییرات ژرفا همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها: ایران مرکزی، ماه‌نشان، میوسن پیشین، زیست‌چینه‌نگاری، محیط دیرینه، روزن‌داران، سازند قم.

E-mail: daneshian@saba.tmu.ac.ir

* نویسنده مسئول: جهانبخش دانشیان

۱- مقدمه

روی زمین با توجه به ویژگی‌های سنگ‌شناسی و محتویات فسیلی نمونه‌ها قرار داده شد و در محل‌هایی که رخساره‌ها تغییرات چندانی نشان نمی‌دادند، فاصله نمونه‌برداری بیشتر در نظر گرفته شد. از نمونه‌های سخت طی چند مرحله مقاطع نازک تهیه شد. نمونه‌های نرم نیز پس از ۴۸ ساعت خیساندن در آب و ۲۴ ساعت خیساندن در آب اکسیژنه ۱۰٪ از روی الک‌های ۱۰۰، ۶۰، ۳۵، ۱۰ مش با فشار آب شسته و توسط اتو کلاو خشک شده و سپس ۳ گرم (از هر الک یک گرم) را وزن کرده و میکروفسیل‌های آن در زیر استریومیکروسکوپ جدا شدند. نمونه‌های سخت با میکروسکوپ نوری معمولی و نمونه‌های نرم با استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند و سپس بر اساس منابع و مقاله‌های موجود روزن‌داران شناسایی و از آنها عکس تهیه شد. پس از تعیین گسترش چینه‌شناسی این میکروفسیل‌ها در برش مورد بررسی، نمودارهای مربوط به آن رسم شد و سن نسبی برش بر اساس تجمع روزن‌داران و بویژه گونه‌های شاخص تعیین شد. در مرحله بعد گونه‌های روزن‌داران در نمونه‌ها شمارش شدند و در نهایت مقدار درصد برای روزن‌داران بر مبنای نوع پوسته (هیالین - پورسلانوز - آگلوتینه) تعیین شد. از آن جا که نوسان در میزان تغییرات تنوع گونه‌ای گویای تغییرات محیطی است، از این رو نهشته‌ها بر اساس افزایش و کاهش تنوع گونه‌ای دسته‌بندی شدند. در ادامه، برای هر تجمع، نمودار مثلثی بر مبنای پوسته روزن‌داران رسم شد و همچنین تعداد گونه‌های شناسایی شده به تفکیک در هر نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. بدیهی است تغییر در تعداد گونه‌ها نشانگر تغییر شرایط محیطی است. از این رو برای درک هر چه بهتر شرایط محیطی و بوم‌شناختی روزن‌داران در برش مورد مطالعه، بر اساس تغییرات تنوع گونه‌ای، نهشته‌های سازند قم به چند تجمع (assemblage) تقسیم شدند و با استناد به بررسی‌های Murray (1991, 2002) بر اساس فراوانی روزن‌داران محیط و ژرفا در هر تجمع قابل تشخیص است.

روزن‌داران از کم‌زرف‌ترین تا زرف‌ترین نقاط در دریاها و اقیانوس‌ها زیست می‌نمایند و پراکندگی شان تحت تأثیر عوامل محیطی و بوم‌شناسی (ecologic) است. بنابراین آشکار است که روزن‌داران و تغییرات تنوع گونه‌ای آن می‌توانند به عنوان یکی از بهترین ابزار برای درک و بازسازی محیط‌های گذشته به کار آیند. آنچه مسلم است روزن‌داران نقش مهمی در درک ارتباط شرایط فیزیکی و شیمیایی زیست‌شناختی محیط دارند و یکی از با اهمیت‌ترین تاکسا بویژه در محیط دریایی و حاشیه دریا به شمار می‌روند. همچنین با بررسی این میکروفسیل‌ها می‌توان به نتایج دقیقی در زمینه سن نهشته‌ها و گسترش چینه‌شناسی آن دست یافت. به همین منظور، برای مطالعه زیست‌چینه‌نگاری و محیط دیرینه نهشته‌های سازند قم بر پایه روزن‌داران در محدوده مورد نظر برش چینه‌شناسی اندآباد انتخاب شد.

۲- موقعیت جغرافیایی و راه دسترسی به برش مورد بررسی

به منظور بررسی سنگ‌چینه‌نگاری، زیست‌چینه‌نگاری و محیط دیرینه سازند قم، برش اندآباد انتخاب شد. این برش در شمال خاوری ماه‌نشان قرار دارد و دسترسی به آن از راه جاده زنجان- نیک‌پی امکان‌پذیر است. فاصله اندآباد تا زنجان حدود ۵۵ کیلومتر است. این برش دارای مختصات جغرافیایی "۳۶° ۳۳' ۳۶" عرض شمالی و "۳۶° ۵۷' ۴۷" طول خاوری است (شکل ۱).

۳- روش مطالعه

پس از جمع‌آوری منابع و تقسیم‌بندی موضوعی آنها با توجه به اهداف مطالعه، از محدوده مورد نظر بازدید زمین‌شناسی به عمل آمد، و برش چینه‌شناسی تعیین و در چند مرحله نمونه‌برداری انجام شد. مبنای نمونه‌برداری از نمونه‌های سخت و نرم در

۴- اهداف بررسی

افزون بر بررسی زیست‌چینه‌نگاری روزن‌داران، محیط دیرینه آنها نیز برای اولین بار در ناحیه مورد مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین هدف از انجام این بررسی‌ها عبارتند از:
۱- مطالعه واحدهای سنگی نهشته‌های سازند قم در برش انتخابی واقع در شمال خاوری ماه‌نشان، ۲- شناسایی، رده‌بندی و مطالعه سیستماتیک روزن‌داران موجود در نهشته‌های سازند قم و تعیین گسترش چینه‌شناسی آنها، ۳- تعیین سن نسبی و زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های برش مورد بررسی ۴- مطالعه محیط دیرینه روزن‌داران در برش مورد بررسی.

۵- زمین‌شناسی عمومی و چینه‌نگاری محدوده مورد بررسی

در زنجان در ناحیه اندآباد - موشمپا، ردیف ستبری از رسوبات تخریبی الیگوسن زیرین (پالئوژن) و لایه‌های متناوب سرخ و سبز نئوژن وابسته به محیط‌های کم ژرفا و تبخیری وجود دارد که به صورت تپه‌ماهوری دیده می‌شود. (Alavi-Naini et al. 1968) این نهشته‌ها را به سه بخش کنگلومرای قاعده‌ای، در حدود ۲۰۰ متر سنگ آهک فسیل‌دار سفید متمایل به زرد و ۴۰۰ متر مارن‌های سبز خاکستری و ماسه‌سنگ تقسیم نمودند. در زمان ته‌نشست رسوبات سازند قم در این بخش از حوضه، فعالیت آتشفشانی زیادی وجود داشته است. آثار این فعالیت به شکل گدازه و نهشته‌های آذرآواری با ترکیب‌های مختلف در درون رسوبات دریایی سازند قم به چشم می‌خورد. بر اساس اطلاعات موجود به نظر می‌رسد محدوده شمالی، شمال خاور و خاور تکاب بیشتر تحت تأثیر فعالیت آتشفشانی قرار گرفته و به طرف جنوب سنگ‌های آتشفشانی و آذرآواری نقش کمتری را در حوضه رسوبی الیگوسن - میوسن به عهده داشته‌اند، برای مثال در کوه شاه‌نشین، شمال تبریزک، شمال باختر ماه‌نشان، جنوب موشمپا و در خاور گوگلر در این مناطق سنگ‌های آتشفشانی دارای ستبرای زیادی هستند و در افق‌های چینه‌شناسی مختلفی نیز دیده شده‌اند (رحیم زاده، ۱۳۷۳). پژوهش‌های انجام شده در منطقه ماه‌نشان، نشان می‌دهد که نهشته‌های سازند قم در زنجان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، به عنوان مثال مظفری (۱۳۷۸) سنگ‌چینه‌شناسی، زیست‌چینه‌نگاری سازند قم و سنگ‌چینه‌نگاری سازندهای سرخ زیرین و بالایی را در شمال خاور تکاب مورد بررسی قرار داده و برای برش‌های مورد مطالعه خود به طور کلی از چند جنس و گونه روزن‌داران نام برده است.

۶- بحث

در این مطالعه ۷۵ نمونه از نهشته‌های سازند قم در برش چینه‌شناسی اندآباد در شمال خاوری ماه‌نشان از نظر محتویات روزن‌داران مورد بررسی قرار گرفتند. سازند قم در برش یادشده با ۳۰۱ متر ستبرای بیشتر شامل سنگ آهک و مارن بوده و مرز آن با نهشته‌های سازند سرخ بالایی (در بالا) و سازند سرخ زیرین (در پایین) به صورت ناپیوستگی فرسایشی است (شکل ۲). در این پژوهش برای شناسایی روزن‌داران از منابعی مانند: Adams & Bourgeois (1967); Becker & Dusenbury (1985); Bolli & Saunders (1987); Blow (1969); Henson (1950); Kennet & Srinivasan (1983); Loeblich & Tappan (1988); Mohsenul Haque (1959); Papp & Schmid (1985); Postuma (1971); Rahaghi (1973, 1980); Todd (1952) استفاده شد و نتیجه بررسی روزن‌داران به طور کلی منجر به تشخیص ۴۲ جنس و ۷۰ گونه شد که ۳۹ جنس و ۶۵ گونه از آنها روزن‌داران کفزی و ۳ جنس و ۵ گونه روزن‌داران پلانکتون هستند (شکل ۳) (ترتیب اسامی گونه‌ها بر مبنای اولین حضور آنها در برش مورد مطالعه است):

Ammonia beccarii, *Elphidium obtusum*, *Melonis pompilioides*, *Amphistegina* sp., *Spirolina austriaca*, *Cycloforina* spp., *Elphidium crispum*, *Nonionella hantkeni*, *Globigerinoides primordius*, *Globigerinoides triloba*, *Nonion*

commune, *Hanzawaia boueana*, *Amphistegina hauerina*, *Elphidium flexuosum*, *Elphidium fichtelianum*, *Elphidium hauerinum*, *Operculina compalanta*, *Globigerina praebulloides*, *Cibicides lobatulus*, *Lenticulina inornata*, *Borelis melo curdica*, *Borelis melo melo*, *Neoeponides schreibersi*, *Eponides umbonatus*, *Anomaliniodes* sp., *Quinqueloculina buchiana*, *Quinqueloculina peregrina*, *Glomospira* sp., *Planorbulina* sp., *Quinqueloculina* sp., *Massilina* spp., *Textularia*.sp.cf.*T.mexican*, *Pyrgo simplex*, *Guttulina consobrina*, *Triloculina gibba*, *Pyrgo lunula*, *Pyrgo clypeata*, *Quinqueloculina triangularis*, *Asterigerina planorbis*, *Textularia* spp., *Shaerogypsina globulus*, *Asterigerina* sp., *Bigenerina* sp., *Schlumbergerina* spp., *Globrotalia* sp., *Dendritina rangi*, *Meandropsina anahensis*, *Triloculina* sp., *Spiroloculina* sp., *Heterolina* sp., *Peneroplis* sp., *Haplophragmium* sp., *Archaias* sp., *Reussella* sp., *Cibicides ungerianus*, *Globigerinoides* sp., *Pyrgo inornata*, *Nonion* sp., *Uvigerina mexicana*, *Peneroplis evolutus*, *Valvulina* sp., *Miolepidocyclina* sp., *Meandropsina iranica*, *Discorbis* spp., *Triloculina tricarinata*, *Operculina* sp., *Meandropsina* sp., *Archaias kirkukensis*, *Triloculina trigonula*, *Miogyopsisina* spp., *Miogyopsinoides* spp.

در این میان گونه‌های شناسایی شده و مقایسه با مظفری (۱۳۷۸)، ۳۷ جنس و ۵۷ گونه برای اولین بار گزارش می‌شود، همچنین لازم به یادآوری است که مظفری هیچ گونه‌ای از روزن‌داران پلانکتیک را از منطقه گزارش نکرد. نکته قابل توجه دیگر آن است که گونه *Melonis pompilioides* تاکنون از نهشته‌های سازند قم گزارش نشده است که در این پژوهش برای نخستین بار گزارش می‌شود. دیگر جنس‌ها و گونه‌های دیگر که در محدوده مورد بررسی برای اولین بار شناسایی شدند عبارتند از: *Ammonia beccarii*, *Amphistegina* sp., *Archaias kirkukensis* *Archaias* sp., *Asterigerina* sp., *Asterigerina planorbis*, *Borelis melo melo*, *Cibicides ungerianus*, *Cibicides lobatulus*, *Cycloforina* spp., *Dendritina rangi*, *Discorbis* spp., *Elphidium crispum*, *Elphidium fichtelianum*, *Elphidium flexuosum*, *Elphidium hauerinum*, *Elphidium obtusum*, *Eponides umbonatus*, *Glomospira* sp., *Hanzawaia boueana*, *Haplophragmium* sp., *Heterolina* sp., *Lenticulina inornata*, *Massilina* spp., *Miogyopsisina* spp., *Miogyopsinoides* spp., *Miolepidocyclina* sp., *Neoeponides schreibersi*, *Nonionella hantkeni*, *Nonion commune*, *Operculina compalanta*, *Operculina* sp., *Peneroplis evolutus*, *Peneroplis* sp., *Planorbulina* sp., *Pyrgo lunula*, *Pyrgo clypeata*, *Pyrgo simplex*, *Pyrgo inornata*, *Quinqueloculina buchiana*, *Quinqueloculina triangularis*, *Quinqueloculina peregrina*, *Reussella* sp., *Shaerogypsina globulus*, *Textularia*.sp.cf.*T.mexican*, *Textularia* spp., *Triloculina* sp., *Triloculina gibba*, *Triloculina tricarinata*, *Triloculina trigonula*, *Uvigerina mexicana*, *Globigerinoides primordius*, *Globigerinoides triloba*, *Globigerinoides* sp., *Globrotalia* sp., *Globigerina praebulloides*.

حضور گونه‌های شاخص مانند: *Borelis melo curdica*, *Globigerinoides primordius*, *Dendritina rangi*, *Peneroplis evolutus*, *Globigerinoides trilobus* و *Triloculina trigonula* (plate1, plate2).

هم‌ارزی‌زمانی و شباهت گونه‌های روزن‌داران کفزی نهشته‌های سازند آسماری

گونه‌های *Borelis melo curdica*, *Discorbis* sp., *Pyrgo* sp., *Quinqueloculina* sp., *Asterigerina* sp., *Amphistegina* sp. و *Globorotalia* sp. از فراوانی بیشتری برخوردار است و نشانگر محیط shelf هستند. در تجمع (assemblage) H که گونه‌های *Borelis melo curdica*, *Pyrgo* sp., *Globorotalia* sp., *Elphidium* sp. و *Textularia* sp. از فراوانی بیشتری برخوردار هستند نیز نشانگر محیط shelf است. ولی در تجمع (assemblage) I که گونه‌های *Borelis melo curdica*, *Amphistegina* sp., *Pyrgo* sp., *Elphidium* sp., *Asterigerina* sp., *Quinqueloculina* sp., *Planorbulina* spp. و *Sphaerogypsina globulus* از فراوانی بیشتری برخوردار بوده و نشانگر محیط inner shelf هستند. بررسی کلی برش چینه‌شناسی اند‌آباد نشان می‌دهد که محیط سازند قم shelf و به احتمال بیشتر inner shelf است. برای بررسی تغییرات محیطی نمودارهای مثلثی فراوانی پوسته روزن‌داران در برش انتخابی از نظر نوع پوسته در تجمع‌های A تا I نیز رسم شدند (شکل ۵). بر اساس این نمودارها می‌توان دریافت که بیشتر روزن‌داران دارای پوسته پورسلانوز و هیالین هستند. به طوری که بیشترین تراکم در تجمع A و I با پوسته هیالین است، در حالی که در تجمع‌های G، F، E، D، C، B بین پورسلانوز و هیالین است. در تجمع H وضعیتی نامنظم داشته، بخشی در اطراف پوسته هیالین و بخشی بین پوسته پورسلانوز و آگلوتینه پراکنده شده‌اند. تمامی این تغییرات خود گواهی تغییر محیط و ژرفا هستند. بر اساس این نمودارها، تراکم بالای نمونه‌ها در اطراف پوسته هیالین در تجمع A و I حکایت از ژرف تر بودن نهشته‌ها نسبت به دیگر تجمع‌ها دارد و این شرایط در تجمع‌های B و C نیز قابل تعقیب است. با این تفاوت که تراکم برخی نمونه‌ها در اطراف پوسته پورسلانوز به احتمال حکایت از کاهش ژرفا نسبت به تجمع A و I را نشان می‌دهند. از سوی دیگر تراکم نمونه‌ها در اطراف پوسته پورسلانوز و کمتر هیالین در تجمع‌های E، F، G حاکی از کاهش ژرفا دارد.


۷- نتیجه‌گیری

- نهشته‌های سازند قم در برش چینه‌شناسی اند‌آباد که به طور عمده از سنگ آهک و مارن تشکیل شده با ستبرای ۳۰۱ متر با ناپوستگی هم‌شیب در زیر نهشته‌های سازند سرخ بالایی و بر روی سازند سرخ زیرین قرار گرفته است. در این برش با توجه به حضور روزن‌داران شاخص ۴۹/۵ متر از رسوبات وابسته به اکتیانین و ۲۵۱/۵ متر متعلق به بوردیگالین تشخیص داده شد.



- با بررسی روزن‌داران این برش ۴۲ جنس و ۷۰ گونه از آنها شناسایی شد که در این بین ۳۹ جنس و ۶۵ گونه از روزن‌داران کف‌زی و ۳ جنس و ۵ گونه از روزن‌داران پلانکتون هستند. با توجه به گسترش چینه‌شناسی گونه‌های شناسایی شده و مقایسه آنها با گونه‌های معرفی شده در زیست‌زون‌بندی (Adams & Bourgeois (1967) اولین حضور *Borelis melo curdica* در نمونه شماره An14 برش اند‌آباد به عنوان مشخص‌کننده مرز اکتیانین- بوردیگالین در نظر گرفته شد. از این محل تا انتهای برش چینه‌شناسی قابل انطباق با زیست‌زون *Meandropsina* - *Borelis melo* group و *iranica* Assemblage Zone از آن قابل انطباق با زیست‌زون *Archaia*s-*Valvulinid* Assemblage Zone هستند.


همچنین بررسی فراوانی و تنوع گونه‌های روزن‌داران در نمونه‌ها نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی در طول برش است، به طوری که بیشترین تنوع با ۱۶ گونه به نمونه An 29 تعلق دارد. بر مبنای تغییرات تنوع گونه‌های نهشته‌های سازند قم در برش اند‌آباد به ۹ تجمع (assemblage) A تا I دسته‌بندی شدند. بررسی تنوع و فراوانی روزن‌داران در تجمع‌های یادشده اشاره بر آن دارد که محیط دریایی، سکوی قاره‌ای و به احتمال بیشتر inner shelf بوده و در این محیط نیز با تغییرات ژرفا همراه بوده است.

در زاگرس و سازند قم در ایران مرکزی به ما اجازه می‌دهد که از نتایج کار Adams & Bourgeois (1967) که زیست‌چینه‌نگاری سازند آسماری را ارائه داده‌اند استفاده نماییم. با مقایسه این گونه‌ها با گونه‌های معرفی شده در زیست‌زون‌بندی (Adams & Bourgeois (1967) محل ظهور *Borelis melo curdica* در برش اند‌آباد (نمونه An14) به عنوان مشخص‌کننده مرز اکتیانین- بوردیگالین در نظر گرفته شد. بر اساس روزن‌داران از نمونه شماره An14 تا انتهای برش چینه‌شناسی منطبق با زیست‌زون *Borelis melo* group - *Meandropsina iranica* Assemblage Zone و پیش از آن قابل انطباق با زیست‌زون *Miogyopsinoides*-*Archaia*s-*Valvulinid* Assemblage Zone است (شکل ۳). در این برش با توجه به مجموع روزن‌داران و حضور فسیل‌های شاخص ۴۹/۵ متر از رسوبات وابسته به اکتیانین و ۲۵۱/۵ متر وابسته به بوردیگالین است. همچنین تعداد گونه‌های شناسایی شده به تفکیک در هر نمونه نشان داد که دامنه تغییرات در گونه‌های روزن‌داران بین ۱ تا ۱۶ گونه است، به طوری که کمترین تعداد گونه متعلق به نمونه‌های شماره ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۳، ۲۶ و بیشترین تعداد گونه متعلق به نمونه شماره ۲۹ است. بدیهی است تغییر در تعداد گونه‌ها نشانگر تغییر شرایط محیطی است. به عبارت دیگر، تغییرات تنوع گونه‌ای به طور قطع نشان می‌دهد که نهشته‌های سازند قم در برش اند‌آباد از شرایط محیطی پایداری برخوردار نبوده است. برای درک هر چه بهتر شرایط محیطی و بوم‌شناختی روزن‌داران در برش مورد مطالعه، نهشته‌های سازند قم بر اساس تغییرات تنوع گونه‌ای در این برش به ۹ تجمع (assemblage) A تا I تقسیم شدند. مبنای تفکیک و مرز بین تجمع‌ها، کاهش تنوع گونه‌ای قرار داده شد (شکل ۴). بررسی تعداد گونه‌ها در ۹ تجمع یادشده نشان می‌دهد که بیشترین تعداد گونه‌ها در تجمع A با ۱۰ گونه، در B با ۹ گونه، در C با ۷ گونه، در D با ۱۶ گونه، در E با ۱۳ گونه، در F با ۹ گونه، در G با ۱۴ گونه، در H با ۱۰ گونه و در I با ۱۳ گونه است. بر اساس Murray (1991) و Murray (2002) و Gallagher et al. (2001) با توجه به فراوانی گونه‌ها در هر تجمع محیط دیرینه آنها مشخص شد (جدول ۱). به طوری که در تجمع A (assemblage) A گونه‌های *Amphistegina*, *Ammonia beccarii*, *hauerina* و *Elphidium hauerinum* از فراوانی بیشتری برخوردارند. فراوانی *Ammonia beccarii* نشان دهنده محیط دریایی و کم ژرفا *Ammonia beccarii* lagoon-inner shelf است و بیشترین ژرفا نایستی فراتر از ۵۰ متر باشد. در تجمع B (assemblage) B گونه‌های *Amphistegina hauerina*, *Elphidium obtusum*, *Ammonia beccarii* و *Borelis melo* از فراوانی بیشتری برخوردار بوده و نشانگر محیط inner shelf هستند. به علت حضور و فراوانی *Borelis melo* نسبت به تجمع A محیط ژرف‌تر و درجه حرارت بیشتر شده است. در تجمع C (assemblage) C گونه‌های *Quinqueloculina* sp., *Borelis melo curdica*, *Amphistegina hauerina*, *Amphistegina* sp. از فراوانی بیشتری برخوردار بوده و نشانگر محیط shelf هستند. وجود روزن‌داران در این قسمت با توجه به کاهش فراوانی *Ammonia beccarii* حکایت از ژرف تر شدن محیط نسبت به تجمع‌های A و B دارد. در تجمع D (assemblage) D گونه‌های *Borelis melo curdica*, *Borelis melo melo*, *Quinqueloculina* sp., *Asterigerina* و *Dendritina rangi*, *Meandropsina anahensis*, *Spiroloculina* sp. از فراوانی بیشتری برخوردار هستند و نشانگر محیط inner shelf هستند. در تجمع E (assemblage) E گونه‌های *Borelis melo curdica*, *Pyrgo* sp. از فراوانی بیشتری برخوردار بوده و نشانگر محیط inner shelf و به احتمال ژرفای ۵ تا ۶۵ متر هستند. در تجمع F (assemblage) F گونه‌های *Borelis melo curdica*, *Pyrgo* sp., *Elphidium* sp. و *Globigerinoides triloba* از فراوانی بیشتری برخوردار است و نشانگر محیط inner shelf است. در تجمع G (assemblage) G



شکل ۳- گسترش چینه‌شناسی و فراوانی روزن‌داران در برش اندآباد در شمال خاور ماه‌نشان.





شکل ۴- نمودارهای مثلثی روزن‌داران بر اساس جنس پوسته در زون‌های تجمعی A تا I در
برش اندآباد در شمال خاور ماه‌نشان، H پوسته هیالین، P پوسته پورسلانوز، A پوسته آگلوتینه.

کتابنگاری

رحیم‌زاده، ف.، ۱۳۷۳- زمین‌شناسی ایران، الیگوسن، میوسن، پلیوسن، طرح تدوین کتاب زمین‌شناسی ایران، شماره ۱۲، سازمان زمین‌شناسی کشور.
مظفری، ب.، ۱۳۷۸- زیست‌چینه‌شناسی و سنگ‌چینه‌شناسی سازند قم و سنگ‌چینه‌شناسی سازندهای سرخ فوقانی و پایینی در شمال خاور تکاب (شیخ جابر، موشمیا و اندآباد)،
پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

References

- Adams, T. D. & Bourgeois, F., 1967- Asmari biostratigraphy. Iran. Oil Oper. Co., Geol. Explor. Div., Report no. 1074, pp.1-37, unpublished.
- Alavi-Naini, M. & Amidi, S. M., 1968 - Geology of Western Part of Takab Quadrangle, Geol. Surv. Iran. Note no. 49, 98p.
- Becker, E. & Dusenbury, A. N., 1985- Mio- Oligocene (Aquitanian) Foraminifera from the Goajira Peninsula, Colombia, pp.1-8.
- Blow, W. H., 1969- Late Middel Eocene to Recent planktonic foraminiferal biostratigraphy. Proceeding first International conference on planktonic microfossil genera, 1967, 1, 199 – 422.
- Bolli, H. M. & Saunders, J. B., 1987- Oligocene to Holocene low latitude planktic foraminifera. pp. 155- 262. In: Bolli, H. M., Saunders, J. B. and Perch – Nielsen, K.(eds.), Plankton stratigraphy, Cambridge University Press.
- Gallagher, S. J., Smith, A. J., Wallace, M. W., Holdgate, G. R. & Taylor, D., 2001-The Miocene palaeoenvironmental and palaeoceanographic evolution of the Gippsland Basin , Southeast Australia: a record of Southern Ocean change.
- Henson, F. R. S., 1950- Middle Eastern Tertiary Peneroplidae (Foraminifera), with remarks on the phylogeny and taxonomy of the family, The West Yorkshire Printing Co. Lim., Wakefield, England, pp. 1-70.
- Kennet, J. P. & Srinivasan, M. S., 1983- Neogene planktonic foraminifera, (a phylogenetic atlas), Hutchinson Ross publishing company, Stroudsburg, Pennsylvania.
- Loeblich, A. R. & Tappan, J. H., 1988- Foraminiferal General and their Classification., Van Nostrand Reinhold Co., 2 vols, pls. 847. New York, 869 p.
- Mohsenul Haque, A. F. M., 1959- The Foraminifera of the Ranikot and the Laki of the Nammal Gorge, Salt Rang, Volume I, pp.1-300.
- Murray, J. W., 1991- Ecology and Palaeoecology of Benthic Foraminifera. Longman, Harlow, Essex.
- Murray, J. W., 2002- Introduction to Benthic Foraminifera In: S. K (ed.) Haslett, 2002. Quaternary Environmental Micropaleontology, Arnold, London.
- Papp, A. & Schmid, M. E., 1985- Die fossilen Foraminiferen des rtiaren Beckens Von wien Revision der Monographie Von Alcide d'Orbigny (1846), Abhandle. Geol. Bundesanst., Vienna, v. 37, pp. 1- 311.
- Postuma, J. A., 1971- Manual of planktonic foraminifera, Elsevier publishing company.
- Rahaghi, A., 1980-Tertiary faunal Assemblage of Qum-Kashan, Sabzewar and Jahrum area., Nat. Iran. Oil Co., Geol. Lab. Public., no. 8.
- Todd, R., 1952- Vicksburg (Oligocene) Smaller Foraminifera from Mississippi, Geological survey professional paper 241, United State Government Printing Office, Washington: 1952 pp.-1-53.