

گزارش یک مورد جابه جایی بدون علامت آی یو دی به سروز رویه کوچک

دکتر صنم مرادان^۱

^۱ دانشیار گروه زنان، مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی رحم، دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره دوم خرداد و تیر ۹۳ صفحات ۱۸۱-۱۷۷

چکیده

مقدمه: یکی از عوارض جدی گذاشتن IUD پارگی رحم و جابه جایی آن به داخل ارگانهای مختلف شکمی است که معمولاً این جابه جایی با درد شکم یا لگن و عدم رویت نخ IUD همراه است. لذا در این گزارش موردی یک مورد از جابه جایی IUD به داخل حفره شکم و سروز رویه کوچک بدون وجود هیچگونه علائم و همراه با رویت نخ IUD از سرویکس را گزارش می‌نماییم.

گزارش مورد: خانم ۳۰ ساله‌ای ۴ ماه بعد از گذاشتن IUD در بوران شیردهی که یک ماه بعد از گذاشتن آن با سونوگرافی وجود آن در موقعیت مناسب بر حفره اندووتر تأیید شده بود جهت انجام توبکتومی به صورت الکتیو مراجعه و جهت توبکتومی به روش لاپاراسکوپی و خروج IUD به نبال آن بستره شد. حین لاپاراسکوپی چسبندگی امتنوم و رویه کوچک به فونتیوس رحم مشاهده می‌شود که بعد از آزاد کردن چسبندگی IUD که با سوراخ کردن کورن سمت چپ رحم وارد حفره شکم و وارد تاحیه سروز رویه کوچک شده مشاهده می‌شود و انتها IUD و نخ آن هنوز داخل حفره رحم وجود داشت. با گراسپ لاپاراسکوپ بدون هیچ عارضه خاصی IUD خارج می‌شود و لوله‌ها بسته می‌شود.

نتیجه‌گیری: جابه جایی IUD ممکن است بدون علامت بوده و رویت نخ IUD در معاینه نیزیکی رد کننده جا به جایی IUD نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها: آی یو دی - جابه جایی - پارگی رحم

نویسنده مسئول:
دکتر صنم مرادان
مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی
رحم دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سمنان - ایران
تلفن: +۹۸ ۹۱۲۱۸۰۶۴
پست الکترونیکی:
sm42595@yahoo.com

دریافت مقاله: ۹۱/۷/۲۴ اصلاح نهایی: ۹۱/۱۱/۲۵ پذیرش مقاله: ۹۲/۱/۲۸

است و در صورت تشخیص باید اقدام فوری به خارج کردن

مقدمه:


IUD نمود (۲).

در صورت پارگی رحم و جا به جایی IUD روش رایج برای خارج کردن IUD در گذشته روش لاپاراتومی بود. ولی امروز خارج کردن آن با استفاده از لاپاراسکوپ به عنوان یک روش مؤثر و بدون خطر پذیرفته شده است و در مطالعه‌ای با انجام روش لاپاراسکوپی بر روی ۱۱۵ بیمار در ۱۷۹ (۶۴/۲٪) امکان خروج IUD با روش لاپاراسکوپ وجود داشت و لذا در این مطالعه به انجام لاپاراسکوپی به عنوان خط اول درمان جهت خروج IUD تأکید شده است (۳). در مطالعه دیگر بر روی ۱۵ بیمار با خروج IUD با روش لاپاراسکوپ هیچ گونه عارضه جدی گزارش نشده است (۴).

وسایل داخل رحمی (IUD) یکی از شایع‌ترین روش‌های پیشگیری از بارداری در سراسر جهان می‌باشد. علاوه بر فواید بسیار زیاد این روش ممکن است با عوارضی هم همراه باشند. مهم‌ترین عارضه این روش‌ها پارگی رحم است. میزان بروز این عارضه حدود ۰/۲ تا ۰/۶ درصد در هزار مورد گذاشتن IUD است (۱). در صورتی که گذاشتن IUD با پارگی رحم همراه باشد، امکان جا به جایی و مهاجرت آن به ارگانهای نزدیک مثل مثانه یا رویه کوچک زیاد است و مهم‌ترین علائمی که به نبال پارگی رحم اتفاق می‌افتد، دردناک بودن پروسه گذاشتن IUD و عدم رویت نخ IUD می‌باشد. تشخیص پارگی رحم و جا به جا شدن IUD با انجام سونوگرافی و عکس‌برداری شکم امکان‌پذیر



تصویر شماره ۱- آزاد کردن آی یو دی از بین سروز روده



تصویر شماره ۲- خارج کردن آی یو دی با استفاده از گراسپ لپاراسکوپ

معرفی بیمار:

خانم ۳۰ ساله‌ای، با سابقه سه بار زایمان طبیعی و ۲ فرزند زنده که ۸ ماه قبل زایمان و ۴ ماه پیش IUD از نوع مسی ۲۸۰ گذاشته بود، جهت توبکتومی مراجعه کرد. بیمار یک ماه بعد از گذاشتن IUD با شکایت از درد زیر شکم به متخصص زنان مراجعه و مورد معاینه و سونوگرافی از نظر بررسی وضعیت IUD قرار می‌گیرد که در معاینه فقط عفونت کاندیبا داشته که درمان می‌شود و در معاینه و سونوگرافی IUD در موقعیت مناسب در کاویته قرار داشته است.

۳ ماه بعد بیمار به طور الکتیو کاندیباستن لوله‌های رحمی با روش لپاراسکوپ شد. بیمار شکایتی از خونریزی غیرطبیعی یا دردهای شکمی نداشت و صرفاً به جهت اطمینان بیشتر و عدم تمایل به حاملگی بعدی خواستار بستن لوله‌های رحمی شد و یک روز قبل از عمل جراحی حين معاینه واژینال نخ IUD سرویکس دیده شد.

پس از بستن در بیمارستان آزمایشات روتین انجام و تست حاملگی منفی بود. حين عمل جراحی با روش لپاراسکوپی در ابتدا رحم، لوله‌ها و تحمندان‌ها قابل رویت نبود و در ناحیه حفره لگن امتنوم و روده‌ها به صورت فشرده بر روی هم وجود داشتند. لذا اقدام به دور کردن روده‌ها و امتنوم از ناحیه لگن شد که متوجه چسبندگی امتنوم و روده‌ها در فوندوس رحم شدیم که چسبندگی‌ها به ترتیج آزاد و حين آزاد کردن چسبندگی‌ها IUD در لابلای سروز روده کوچک که با سوراخ کردن ناحیه کورن چپ وارد حفره شکم شده بود، یافت شد. ولی نخ IUD هنوز داخل حفره رحم قرار داشت. لذا چسبندگی‌ها آزاد شد و IUD با گراسپ لپاراسکوپ خارج شد. سروز روده و روده‌ها و امتنوم از نظر خونریزی بررسی و نقاط خونریزی دهنده هموستاز شد و کورن چپ رحم نیز از نظر خونریزی بررسی شد که خونریزی نداشت. لذا عمل جراحی بدون عارضه خاصی خاتمه یافت و بیمار در همان روز حدود ۸ ساعت بعد از عمل جراحی بدون مشکل خاصی از بیمارستان مرخص شد. با توجه به اینکه بیمار مذکور به دنبال گذاشتن IUD از عارضه خاصی مثل خونریزی غیرطبیعی و دردهای لگن شاکی نبود و به طور اتفاقی در زمان انجام توبکتومی با ترانس لوکاسیون IUD رو برو شدیم، لذا تصمیم به گزارش این مورد گرفتیم.

بحث و نتیجه‌گیری:
پارگی رحم و جابه جایی IUD به دنبال گذاشتن IUD پدیده ناشایعی است که در برخی از موارد اتفاق می‌افتد. ولی این عارضه جدی‌ترین عارضه‌ای است که به دنبال گذاشتن IUD اتفاق می‌افتد (۱،۵). لذا پدیده جابه جایی IUD و پارگی رحم پدیده ناشایعی است که در مورد بیمار ما اتفاق افتاد.
روشهای مختلفی جهت تشخیص پارگی رحم و جا به جا شدن IUD به کار می‌رود که شامل X-ray شکم، سونوگرافی و MRI هستند و روشهایی مثل هیستروسکوپی و لپاراسکوپی هم در جهت تشخیص و هم در جهت درمان این عارضه کاربرد دارد (۵). لپاراسکوپی به عنوان اولین روش درمان انتخابی محسوب می‌شود (۷).

است. در گزارشی جابه‌جایی IUD به آپاندیس (۱) و در گزارشی دیگر جابه‌جایی آن به روده کوچک که منجر به پارگی روده و نیاز به رزکسیون داشت، گزارش شده است (۹). در بیمار ما خوشبختانه جابه‌جایی به داخل سروز روده بود و منجر به آسیب روده نشد.

خروج IUD باید توسط فردی با تجربه که مهارت کافی جهت خروج آن دارد، انجام شود (۱۰) که در مورد بیمار ما نیز خروج آن توسط متخصص باتجربه که تجربه کافی در انجام لапاراسکوپی داشت، صورت گرفت. لذا با توجه به اهمیت عارضه جابه‌جایی IUD و پارگی رحم به دنبال آن لازم است که همه افرادی که در مورد روش‌های پیشگیری به بیماران آموزش می‌دهند، باید حین مشاوره تأکید بیشتری در رابطه با عوارض احتمالی IUD داشته باشند (۱۱) تا بیماران با آگاهی بیشتری در مورد روش پیشگیری خودشان تصمیم بگیرند.

در مورد بیمار ما چون هیچ گونه علائمی نداشت و صرفاً جهت توبکتومی مراجعه کرده بود، روش‌های تشخیصی فوق انجام نشد. ولی به جهت تمایل بیمار و اعلام رضایت وی به انجام لپاراسکوپی جهت توبکتومی، IUD جابه‌جا شده نیز از طریق روش لپاراسکوپی تشخیص داده شد و خروج آن نیز از طریق لپاراسکوپی انجام شد.

جابه‌جایی IUD معمولاً با علائمی مثل درد حین گذاشتن IUD و بعد از آن یا عدم رویت نخ IUD همراه است (۲). ولی در مورد بیمار ما هیچکدام از موارد فوق وجود نداشت و حتی انتهاهای نخ IUD از دهانه سرویکس درست روز قبل از عمل قابل رویت بود. لذا صرف عدم وجود علائم مذکور رد کننده جابه‌جایی IUD نمی‌باشد و در همه بیمارانی که IUD دارند، امکان جابه‌جایی آن وجود دارد.

در یک گزارش مروری توسط میراندا و همکاران وی که جابه‌جایی IUD اتفاق افتاده بود، درد قابل توجه شکم به دنبال گذاشتن IUD وجود داشت (۸)، ولی در مورد بیمار ما هیچ گونه علائمی حین گذاشتن IUD و یا بعد از آن وجود نداشت.

جابه‌جایی IUD با پرزانتاسیونهای متعددی همراه است و در گزارشات متعدد انواع متفاوتی از جابه‌جایی‌ها گزارش شده

References

منابع

- Bozkurt M, Yumru AE, Coskun EI, Ondes B. Laparoscopic management of a translocated intrauterine device embedded in the gastric serosa. *J Pak Med Assoc*. 2011;61:1020-1022.
- Kuś E, Swierczewski A, Pasinski J, Estemberg D, Brzozowska M, Kowalska-Koprek U, et al. Intrauterine contraceptive device in an appendix—a case report. *Ginekol Pol*. 2012;83:132-135.
- Gill RS, Mok D, Hudson M, Shi X, Birch DW, Karmali S. Laparoscopic removal of an intra-abdominal intrauterine device: case and systematic review. *Contraception*. 2012;85:15-18.
- Balci O, Capar M, Mahmoud AS, Colakoglu MC. Removal of intra-abdominal mislocated intrauterine devices by laparoscopy. *J Obstet Gynaecol*. 2011;31:650-652.
- Grimaldi L, De Giorgio F, Andreotta P, Dálessio MC, Piscilli C, Pascali VL. Medicolegal aspect of an unusual uterine perforation with multiload cu 375R. *Am J Forensic Med Pathol*. 2005;26:365-366.
- Heinberg EM, McCoy TW, Pasic R. The perforated intrauterine device: endoscopic retrieval. *JSLS*. 2008;12:97-100.
- Demir SC, Cetin MT, Ucunsak IF, Atay Y, Toksöz L, Kadavifci O. Removal of intra-abdominal intrauterine device by laparoscopy. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2002;7:20-23.
- Miranda L, Settembre A, Capasso P, Cuccurullo D, Pisaniello D, Corcione F. Laparoscopic removal of an intraperitoneal translocated intrauterine contraceptive device. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2003;8:122-125.

9. Sajjad Y, Selvan G, Kirwan JM, King Sland CR. Gynaefix frameless IUD: cause of bowel resection. *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2006;11: 241-242.
10. Mülavim B, Mülavim S, Celik NY .A lost intrauterine device. Guess where we found it and how it happened? *Eur J Contracept Reprod Health Care*. 2006;11:47-49.
11. Jenabi E, Alizadeh SM, Baga RI, continuation rates and reasons for discontinuing. TCU380A IUD use in Tabriz, Iran. *Contraception*. 2006;74:483-486.

Asymptomatic small bowel serosa translocation of intra uterine device, A case report

S. Moradan, MD¹

Associate Professor Department of Obstetrics¹, Research Center of Abnormal Uterine Bleeding, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

(Received 15 Oct, 2012 Accepted 7 Apr, 2013)

ABSTRACT

Introduction: One of the serious complications of intra uterine device (IUD) is uterine perforation and translocation of it to abdominal organs. Translocation is usually accompanied with abdominal or pelvic pain and absence of string in vaginal examination. Therefore, it was decided to report an asymptomatic case of translocation of IUD to small bowel serosa with presence of string in vaginal exam.

Patients: A 30 years old woman was candid for elective laparoscopic tubectomy 4 months after IUD insertion. One month after IUD insertion transabdominal ultrasonography showed her IUD in proper position in uterine cavity. During the laparoscopy, tubal ligation omentum and small bowel adhesion to uterus were present .After adhesionlysis the IUD was embedded in serosa of small bowel and the string was present in uterine cavity. So, IUD removal was performed by laparoscopic grasp and there was no post operative complication.

Conclusion: IUD translocation might be asymptomatic and the presence of string in physical exam could not rule out the translocation.

Key words: Intra Uterine Devices – Translocation - Uterine Perforation

*Correspondence:
S. Moradan, MD.
Research Center of Abnormal
Uterine Bleeding, Semnan
University of Medical Sciences.
Semnan, Iran
Tel: +98 9121318046
Email:
sm42595@yahoo.com*