

ارزیابی بیو آئروسل‌های هوابرد باکتریایی در یک صنعت نساجی

مهدی قاسم خانی^{۱*} - مهناز شیخ علیشاهی^۲ - مهدی اصغری^۳

ghasemkh@sina.tums.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۹۲/۸/۴

تاریخ دریافت: ۹۲/۴/۳۰

چکیده

مقدمه: بیو آئروسل‌ها به آئروسل‌ها یا ذرات با منشأ میکروبی، گیاهی یا حیوانی اطلاق می‌شود. از جمله مشاغل که کارگران با بیوآئروسل‌ها مواجهه شغلی دارند، کار در کارگاه‌های صنایع نساجی است. بیشترین تراکم آلودگی بیوآئروسل‌ها در صنعت نساجی در مراحل حلاجی و کاردینگ متمرکز است. با توجه به بومی بودن صنعت نساجی در ایران و اشتغال به کار تعداد کثیری از کارگران کشورمان در این صنعت، این بررسی در یک صنعت نساجی با هدف ارزیابی تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی انجام گرفت.

روش کار: مطالعه به شکل مقطعی در کارگاه‌های مختلف یک کارخانه تولید نخ و همچنین محوطه آن انجام گردید. تراکم بیوآئروسل‌های هوابرد با روش استاندارد ۰۸۰۰ سازمان NIOSH در فصل تابستان نمونه برداری شد و مورد سنجش قرار گرفت. تشخیص نوع کلنی و باکتری رشد یافته در محیط کشت آگار خونی، با استفاده از رنگ آمیزی گرم تحت بررسی واقع گردید. تراکم بیوآئروسل‌ها بر حسب CFU/m^3 محاسبه و سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱/۵ تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین تراکم بیوآئروسل‌ها در محوطه کارخانه بالاترین میزان تراکم ($9/5 \pm 94 CFU/m^3$) و در کارگاه ۲ (رینگ) پایین‌ترین میزان تراکم ($1/0 \pm 64 CFU/m^3$) را به خود اختصاص داد. اختلاف میانگین تراکم بیوآئروسل‌ها در کارگاه ۱ (حلاجی و کاردینگ) و ۲ (رینگ) از نظر آماری معنی دار بود. بالاترین تعداد کلنی بیو آئروسل‌ها را استافیلوکوکوس اپیدرمیس با ۱۷۴۳ کلنی و پایین‌ترین تعداد کلنی را استرپتوکوکوس پنومونی با ۶۴ کلنی در کل کارخانه به خود اختصاص داد.

نتیجه گیری: علیرغم این حقیقت که تراکم بیوآئروسل گزارش شده در مطالعه حاضر کمتر از سایر مطالعات صورت گرفته قبلی است، ولی همین مقدار نیز از مقادیر پیشنهادی سازمان ACGIH بالاتر می‌باشد.

کلمات کلیدی: بیوآئروسل‌های باکتریایی، حلاجی و کاردینگ، استافیلوکوکوس اپیدرمیس،

استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس انتراسپیس

۱- دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- کارشناس بهداشت حرفه ای

۳- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

مقدمه

فن‌آوری به‌شمار می‌رود. کارگران صنعت نساجی اغلب با گردو غبار طبیعی و مصنوعی در مراحل مختلف فرایند تولیدی ریسندگی و بافندگی مواجهه دارند (Greenberg, 1997). گردوغبار پنبه نخستین منبع آلودگی بیو آئروسول‌ها در کارگاه‌های نساجی محسوب می‌شود (Rylander and Bergstorm, 1993). در صنعت نساجی یکی از مواد اولیه مهم پنبه خام است که پس از ورود عدل‌های پنبه خام به کارخانه، در مراحل حلاجی و کاردینگ، آماده برای ریسندگی و بافندگی می‌گردد. بیشترین تراکم آلودگی بیوآئروسول‌ها در صنعت نساجی در این مراحل متمرکز است. عملیات گوناگون و متنوع در کارگاه‌های نساجی موجب تماس با سطوح مختلفی از مواجهه با تراکم بیوآئروسول‌ها می‌شود (Greenberg, 1997; Su, 2002). در کشور آمریکا تا قبل از سال ۱۹۸۰ میلادی، متجاوز از ۸۰۰۰۰۰ کارگر و در سال ۱۹۹۶، تعداد ۶۲۴۰۰۰ نفر در صنایع نساجی مشغول به کار بودند، که از این میان ۳۰۰۰۰۰ کارگر به‌طور مستقیم با گردوغبار پنبه تماس داشتند (Greenberg, 1997; Merchant, 2001); (Mittelhauser, 1997). به گزارش دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن، تا پایان سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۸۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در تعداد ۹۳۹۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ صنعت نساجی در سراسر کشور مشغول به کار بوده‌اند (Haeri and Roshani, 1389).

علیرغم آن‌که مطالعات زیادی در کشورهای خارجی و در ایران بر روی عوامل شیمیایی و آلودگی هوا در صنعت نساجی انجام گرفته و نتایج آن در مجلات معتبر علمی هم به چاپ رسیده، اما بررسی بیوآئروسول‌های هوا در این صنعت در جهان بسیار محدود بوده است. از آن جمله مطالعه Su و

مواجهه با عوامل بیولوژیکی در محیط‌های شغلی و غیر شغلی و ارتباط آن با دامنه وسیعی از اثرات بهداشتی نامطلوب شامل بیماری‌های عفونی مسری، اثرات حاد سمی، عوارض آلرژیک و سرطان اهمیت بیشتری یافته است (Douwes *et al.*, 2003). رشد میکروارگانیسم‌ها بسیار سریع است، به‌طوری‌که برخی از گونه‌های آن در هر بیست دقیقه تکثیر شده و در شرایط مطلوب می‌توانند هر ۸ ساعت در محیط کشت به تعداد ۱۷ میلیون سلول تقسیم شوند (Eduard and Halstensen, 2009). قطر ذرات بیو آئروسول بین ۱۰۰-۰/۳ میکرون است. دامنه اندازه سلول باکتری بین ۲-۰/۵ میکرون و به‌طور معمول باکتری‌های هوابرد به شکل کروی (کوکسی)، میله‌ای (باسیلی) یا مارپیچی بوده، اما میکروارگانیسم‌های هوابرد اغلب به‌صورت ذرات بزرگتر و توده‌ای شکل هستند. دامنه قطر ذرات بیو آئروسولی که در هوا معلق اند بین ۵-۱ میکرون می‌باشد. عوامل فیزیکی و محیطی عامل رسوب بیو آئروسول‌ها بر روی سطوح می‌باشند. جریان هوا، رطوبت نسبی و دما از عوامل موثر و مهم محیطی در ته نشینی بیو آئروسول‌ها بوده و مهم‌ترین عامل معنی دار در ته نشینی آن‌ها، اندازه و غلظت آن‌ها می‌باشد (Stetzenbach *et al.*, 2004). کارگران در تعداد زیادی از مشاغل و فعالیت‌های صنعتی با بیو آئروسول‌ها مواجهه شغلی دارند. از جمله مشاغلی که کارگران با بیوآئروسول‌ها مواجهند، کار در کارگاه‌های تولید نهاده‌های دامی و طیور، بازیافت مواد زاید جامد، کشتارگاه‌ها و همچنین صنایع نساجی است (Su *et al.*, 2002; Olenchock *et al.*, 1990); (Christiani *et al.*, 1993; Rylander and Lundholm, 1978; Oldenburg *et al.*, 2007). صنعت نساجی یکی از قدیمی‌ترین و از جامع‌ترین صنایع از نظر

(NIOSH, 1998). نمونه برداری بیو آئروسل‌ها در فصل تابستان و در تیر ماه با استفاده از پمپ نمونه بردار باکتریال سمپلر مدل (MK2-HB3109-02 Casella Ltd) و با توجه به دستورالعمل شرکت تولید کننده نمونه بردار (Bacteria sampler, 2002)، دبی ۴۰ لیتر بر دقیقه به مدت ۳۰ دقیقه و اندازه‌گیری دما و رطوبت نسبی با دماسنج و رطوبت سنج چرخان مدل LUTRON HT-30005 HA تایوان انجام شد. پیش از نمونه برداری، ابتدا پلیت‌های حاوی آگار خونی Blood Agar Culture (محیط کشت پایه) و کلیه وسایل نمونه برداری به وسیله الکل اتیلیک ۹۶٪ تمیز و استریل شد و به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۳۴ درجه سانتی‌گراد درون اتوکلاو قرار گرفت تا استریل شوند. حجم نمونه برای برآورد میانگین از فرمول زیر به‌دست آمد (Haghdoust, 2009).

$$n = \frac{2(Z_{1-\alpha/2} + Z_{1-\beta})^2 S^2}{d^2}$$

در این رابطه $\alpha=0/05$ ، $\beta=0/20$ ، $d=10$ و تعداد نمونه‌های محیطی با استفاده از روش مذکور در کارگاه ۱ و ۳ هر کدام ۹ نمونه و در کارگاه ۲ تعداد ۱۲ نمونه و در محوطه کارخانه نیز ۱۲ نمونه و جمعا ۴۲ نمونه با حدود ۱۰٪ خطا در زمان‌های مختلف شیف‌ت کاری (صبح، ظهر و شب) برآورد گردید و محل نمونه‌ها در ارتفاع منطقه تنفسی کارگران در نظر گرفته شد. در مطالعه تعدادی نمونه شاهد از محیط آزمایشگاه مجهز به هواکش برای اعتبار و کیفیت نمونه برداری گرفته شد. پس از نمونه برداری نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل گردید و به مدت ۴۰ ساعت در انکوباتور ۳۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد و روز بعد جهت تشخیص نوع کلنی

همکاران طی سه سال در تایوان را می‌توان ذکر کرد که میزان آلودگی باکتریایی در صنایع نساجی را مورد مطالعه قرار دادند. بررسی آنان نشان می‌دهد که میزان تراکم بیو آئروسل‌ها در سال سوم تحقیق در داخل کارگاه‌ها به میزان 4170 CFU/m^3 و در خارج کارگاه 2191 CFU/m^3 بوده است (Su et al., 2002). گزارش عبدالحمید و همکاران در سال ۲۰۰۷ در مصر و در صنعت نساجی نشان داد که میزان تراکم باکتری‌ها در بخش کاردینگ به میزان $17/6 \text{ CFU/m}^3$ و در مرحله نخ ریزی 14 CFU/m^3 برآورد شد (Abdel-Hameed et al., 2007).

باتوجه به بومی بودن صنعت نساجی در ایران و اشتغال به کار تعداد کثیری از کارگران کشورمان در این صنعت، ارزیابی میزان مواجهه با بیو آئروسل‌های هوابرد در محیط‌های کاری این صنعت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. از سوی دیگر تاکنون مطالعات چندانی در این صنعت صورت نپذیرفته است. لذا این بررسی در یک صنعت نساجی با هدف ارزیابی تراکم بیو آئروسل‌های باکتریایی به صورت مقطعی تحلیلی انجام گرفت.

روش کار

مطالعه حاضر به شکل مقطعی در یک کارخانه تولید نخ (ریسندگی) در شهرک صنعتی یک شهر کویری انجام گردید. مکان‌های مورد مطالعه، کارگاه ۱ (حلاجی، کاردینگ، پاساژ و فلایر)، کارگاه ۲ (رینگ)، کارگاه ۳ (اسپرو، دولکنی و دولاتاب) و محوطه کارخانه (خارجی) انتخاب شد. ارزیابی تراکم بیو آئروسل‌های باکتریایی با استفاده از روش استاندارد ۰۸۰۰ سازمان (National Institute for Occupational Safety and Health) NIOSH انجام پذیرفت

تراکم بیوآئروسولها در محوطه کارخانه بالاترین میزان تراکم ($9/5 \pm 94$ CFU/m³) و در کارگاه ۲ پایینترین میزان تراکم ($18/0 \pm 64$ CFU/m³) اندازه‌گیری شد. به‌طور کلی میانگین تراکم بیوآئروسولها در محوطه کارخانه از کلیه کارگاهها بیشتر بود. بالاترین نمونه اندازه‌گیری شده تراکم بیوآئروسولها در کارگاه ۱، ۱۳۵ CFU/m³ و پایینترین تراکم در کارگاه ۲ به میزان ۳۵ CFU/m³ تعیین گردید. همچنین تراکم بیوآئروسولهای نمونه‌های شاهد بسیار کم و قابل اغماض بود. شرایط جوی محیط از نظر میانگین رطوبت نسبی در کارگاه ۱ (۴۶٪) بالاترین و در محوطه کارخانه (۱۴٪) پایینترین و نیز میانگین میزان درجه حرارت در محوطه کارخانه (۳۶/۶) درجه سانتیگراد) بالاترین و در کارگاه ۳ (۲۹) درجه سانتیگراد) پایینترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. نسبت نمایش داده شده داخل به خارج کمتر از یک در جدول مبین بالا بودن آلودگی خارج نسبت به داخل در همه کارگاههاست که این نسبت با کارگاه یک از همه کوچک تر و با کارگاه دو از همه بزرگ تر است.

جدول ۲ نتایج آزمون آماری تراکم بیو آئروسولها را نشان میدهد. میانگین تراکم بیو

و باکتری رشد یافته در محیط کشت آگار خونی، با استفاده از رنگ آمیزی گرم، رنگ پذیری و مثبت یا منفی بودن گرم نیز مورد بررسی قرار گرفت. سپس خصوصیات مرفولوژی باکتری به لحاظ کوکسی یا باسیلی شکل بودن آنها مشخص گردید (Murray et al., 2009). شمارش کلنی‌های تشکیل شده با روش چشمی و به‌وسیله شمارنده انجام گرفت. برای محاسبه تراکم کلنی‌های شمارش شده بر روی محیط کشت و ثبت آن در جدول مربوطه، ابتدا حجم هوای نمونه برداری با توجه به دما و فشار محیط تصحیح شد و سرانجام تراکم بر حسب (Colony Forming Unit CFU/m³) "حجم هوای نمونه برداری شده/ تعداد کلنی‌های شمارش شده = CFU/m³" محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس ANOVA مدل Sheffe, Tukey HSD و LSD و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱/۵ صورت پذیرفت. میزان سطح معنی داری برای تجزیه و تحلیل آماری ($P < 05/0$) در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

جدول ۱ میانگین تراکم بیوآئروسولها در واحدهای مختلف کارخانه را نشان می‌دهد. میانگین

جدول ۱: میانگین تراکم بیوآئروسولها با حدود اطمینان ۹۵٪، دمای محیط و رطوبت نسبی در مکانهای نمونه‌گیری

نسبت داخل به خارج	حدود اطمینان ۹۵٪		تراکم بیوآئروسولها (cfu/m ³)		دمای محیط (درجه سانتیگراد)		رطوبت نسبی (درصد)		تعداد نمونه n=۴۲	مکان
	حد بالا	حد پایین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین		
۰/۹۰	۱۳۵	۵۸	۲۳/۸	۸۵	۰/۷۲	۳۰/۹	۴/۵	۴۶	۹	کارگاه ۱
۰/۶۸	۹۵	۳۵	۱۸/۰	۶۴	۲/۸۸	۳۰/۸	۵/۹	۲۹	۱۲	کارگاه ۲
۰/۸۴	۱۲۰	۶۰	۱۷/۹	۷۹	۲/۸۷	۲۹/۰	۶/۸	۲۹	۹	کارگاه ۳
-	۱۱۲	۸۵	۹/۵	۹۴	۱/۴۶	۳۶/۶	۴/۲	۱۴	۱۲	محوطه کارخانه

جدول ۲: نتایج آزمون آماری ANOVA تراکم بیو آنروسول‌ها در کارگاهها و محوطه کارخانه

P Value												مکان
LSD				Tukey HSD				Scheffe				
محوطه کارخانه	کارگاه ۳	کارگاه ۲	کارگاه ۱	محوطه کارخانه	کارگاه ۳	کارگاه ۲	کارگاه ۱	محوطه کارخانه	کارگاه ۳	کارگاه ۲	کارگاه ۱	
NS	NS	۰/۰۱	-	NS	NS	NS	-	NS	NS	NS	-	کارگاه ۱
۰/۰۰۰۱	NS	-	۰/۰۱	۰/۰۰۰۱	NS	-	NS	۰/۰۰۱	NS	-	NS	کارگاه ۲
۰/۰۲	-	NS	NS	NS	-	NS	NS	NS	-	NS	NS	کارگاه ۳
-	۰/۰۲	۰/۰۰۰۱	NS	-	NS	۰/۰۰۰۱	NS	-	NS	۰/۰۰۱	NS	محوطه کارخانه

NS- Not Significant

جدول ۳: تعداد و درصد کلنی بیو آنروسولهای نمونه گیری شده بر اساس نوع باکتری در کارگاهها و محوطه کارخانه

کل (تعداد)	محوطه کارخانه (تعداد (درصد))	کارگاه ۳ (تعداد (درصد))	کارگاه ۲ (تعداد (درصد))	کارگاه ۱ (تعداد (درصد))	نوع باکتری
۹۳۳	۲۱۳ (۲۲/۸)	۲۰۴ (۲۱/۸)	۲۷۹ (۳۰/۰)	۲۳۷ (۲۵/۴)	استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت)
۱۷۴۳	۳۸۶ (۲۲/۲)	۴۶۱ (۲۶/۴)	۴۴۵ (۲۵/۵)	۴۵۱ (۲۵/۸)	استافیلوکوکوس اپیدرمیس (گرم مثبت)
۲۳۷	۱۳۶ (۵۷/۴)	۴۴ (۱۸/۶)	۵۷ (۲۴/۰)	-	باسیلوس انتراسیس (گرم مثبت)
۶۴	۶۴ (۱۰۰/۰)	-	-	-	استرپتوکوکوس پنومونی (گرم مثبت)

جدول ۴: میانگین تراکم بیو آنروسولها بر اساس نوع باکتری و مکان آن (CFU/m³)

محوطه کارخانه	کارگاه ۳	کارگاه ۲	کارگاه ۱	نوع باکتری
۲۵	۲۲	۲۲	۲۹	استافیلوکوکوس اورئوس (گرم مثبت)
۴۶	۵۰	۳۶	۵۶	استافیلوکوکوس اپیدرمیس (گرم مثبت)
۱۷	۷	۶	-	باسیلوس انتراسیس (گرم مثبت)
۶	-	-	-	استرپتوکوکوس پنومونی (گرم مثبت)

تعداد کلنی بیو آنروسولها به ترتیب، استافیلوکوکوس اپیدرمیس و استافیلوکوکوس اورئوس با ۱۷۴۳ و ۹۳۳ کلنی و پایینترین تعداد کلنی را استرپتوکوکوس پنومونی با ۶۴ کلنی به خود اختصاص داده است. باکتریهای استافیلوکوکوس اپیدرمیس و استافیلوکوکوس اورئوس در همه مکانها یافت شد در صورتی که استرپتوکوکوس پنومونی تنها در محوطه کارخانه مشاهده گردید. همچنین پراکندگی باکتری باسیلوس انتراسیس در محوطه کارخانه از درصد بالایی (۵۷/۴٪) برخوردار است.

آنروسولها در کارگاه ۲ با محوطه کارخانه با هر سه روش LSD, Tukey HSD, Scheffe و LSD معنی دار است، در صورتی که میانگین تراکم بین کارگاه ۱ و ۲ و همچنین بین کارگاه ۲ و محوطه کارخانه تنها در روش آماری به روش LSD معنی دار بود. این نتایج حاکی از آنست که روش LSD در تجزیه و تحلیل آزمون آماری نسبت به دو روش دیگر نتایج را معنی دارتر نشان می دهد. جدول ۳ تعداد و درصد کلنی بیو آنروسولها بر اساس نوع باکتری را ارایه می کند. بالاترین

آزار است، عامل مثبتی تلقی می‌شود. همچنین باکتری استرپتوکوکوس پنومونی که عامل بیماری پنومونی (ذات‌الریه) بوده، در داخل محیط‌های کارگاهی مشاهده نگردید و تنها در محوطه کارخانه به‌میزان جزئی دیده شد لذا به‌عنوان یک بیوآئروسول هوابرد، کارگران در داخل کارگاه‌ها با آن به‌عنوان یک عامل شغلی مواجهه ندارند. باکتری باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری‌زای هوابرد تنها بیوآئروسولی است که به‌میزان جزئی در داخل کارگاه ۲ و ۳ و کمی بیشتر در محوطه کارخانه در آزمایشات میکروبیولوژی مطالعه مشاهده گردید. با توجه به این‌که باسیلوس آنتراسیس، می‌تواند انسان را در اثر تماس با حیوانات آلوده، یا فراورده‌های آنها نظیر پشم، مو، پوست، استخوان و سفیداب مبتلا نماید و از آن‌جاییکه این بیماری هنوز در کشورمان یافت می‌شود (pezeshk, 2014)، ممکن است از طریق ورود هوای بیرون به داخل کارگاه‌های ۲ و ۳ منتقل شده باشد.

در مطالعه حاضر محوطه کارخانه که با هوای محیط خارجی و عمومی مرتبط است، بالاترین میزان تراکم بیو آئروسول‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. دلیل اصلی آن این است که تنوع منابع تولید بیوآئروسولها در خارج نسبت به داخل بسیار بالاتر است. گیاهان، خاک و حیوانات از جمله این منابع هستند.

میکروارگانسیم‌های خارجی معمولاً در جایی که ساکن می‌شوند، با رطوبت نسبی و پرتوهای تابشی خورشید خود را تطبیق داده و قابل تحمل و زیست می‌شوند (Chatigny, 1995). این نتایج با نتایج مطالعه Li وهمکاران که میزان تراکم بیو آئروسول‌ها را خارج کارگاه 735 CFU/m^3 و داخل آن 384 CFU/m^3 گزارش کردند، همخوانی داشته

در جدول ۴ میانگین تراکم بیو آئروسول‌ها بر اساس نوع باکتری و مکان آن ارایه شده است. بالاترین تراکم بیو آئروسول‌ها، استافیلوکوکوس اورئوس و اپیدرمیس به ترتیب با میانگین ۲۹ و ۵۶ CFU/m^3 در کارگاه ۱ و کمترین تراکم با میانگین 6 CFU/m^3 به ترتیب به استرپتوکوکوس پنومونی اختصاص دارد که تنها در محوطه کارخانه مشاهده گردید.

بحث

طبق بررسی به عمل آمده در این مطالعه، چهارنوع باکتری، به‌نام‌های استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، باسیلوس انتراسیس و استرپتوکوکوس پنومونی گرم مثبت در محیط کارخانه شناسایی شد. استافیلوکوکوس اورئوس ممکن است به شکل همزیست بر روی پوست وجود داشته باشد. هنگامی که سد پوستی از بین برود، باکتری به بافت حمله می‌کند. این باکتری یکی از مهم‌ترین پاتوژن‌هایی است که باعث مسمومیت غذایی می‌شود (wikipedia 2013; Nowroozi *et al.*, 2012). باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیس جزو فلور طبیعی مخاط پوست است و استرپتوکوکوس پنومونی عامل اصلی بیماری پنومونی (ذات‌الریه) می‌باشد (wikipedia, 2013). باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری سیاه زخم است (wikipedia, 2013; Stetzenbach *et al.*, 2004).

براساس نتایج به‌دست آمده باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیس که در تمام کارگاه‌ها و محوطه کارخانه، دارای بالاترین درصد و میزان تراکم بیو آئروسول‌ها بوده و از نظر میکروبیولوژی در شرایط عادی خطری برای سلامت انسان نمی‌باشد و بی

مطالعه‌ای مشابه در تایوان نشان دادند که میزان تراکم بیه آئروسول‌ها در بخش کاردینگ صنایع نساجی به ترتیب به میزان ۶۸۵۵ و ۵۸۵۷ و در بخش پاساژ ۶۱۴۸ و 14750 CFU/m^3 بوده است (Su *et al.*, 2002). همچنین Li و همکاران میزان تراکم بیه آئروسول‌ها را 384 CFU/m^3 اندازه‌گیری نمودند (Li, 1997)، که این نتایج بسیار بالاتر از مطالعه حاضر است. همچنین باید اشاره نمود که بخشی از تراکم آلودگی کارگاه‌ها می‌تواند منشاء خارجی داشته باشد و به‌طور محدود از هوای آزاد و از طریق درب‌ها و یا پنجره‌ها وارد کارگاه شوند. ضمناً منشاء بیه آئروسول‌های داخل کارگاهی به‌طور الزام آور، تنها از گرد و غبار پنبه نیست، اما بخش مهم آن می‌تواند از گردوغبار پنبه باشد. یکی دیگر از دلایل پایین بودن میزان تراکم آلودگی در کارگاه‌ها نسبت به خارج، ممکن است استفاده از آفت‌کش‌ها در مزارع کشت پنبه برای مبارزه با آفات نباتی باشد. همان‌طوری‌که در مطالعه لارسن و همکاران نقش استفاده از آفت‌کش‌ها در کاهش بیه‌آئروسول‌ها در مزارع کشت تنباکو مورد تأیید قرار گرفت (Larsson *et al.*, 2008).

پایش بیه‌آئروسول‌ها اغلب به منظور مقایسه با رهنمودهای عمومی و حدود توصیه شده در محیط‌های تحت کنترل انجام می‌شود زیرا حدود مواجهه شغلی برای بیه‌آئروسول‌ها وجود ندارد (Golbabaie *et al.*, 1388) و علیرغم اینکه خطرات بهداشتی مواجهه با بیه‌آئروسول‌ها شناسایی شده و قطعیت دارد، اما تاکنون برای این دسته از آلاینده‌های هوابرد حدود مجاز خاصی توصیه نشده و مقادیر ارایه شده هنوز در قالب پیشنهاد می‌باشد. مقادیر پیشنهاد شده نیز دارای طیف گسترده‌ای است. مهم‌ترین علت

ولی با نتایج مطالعه Su و همکاران در سال ۲۰۰۲ در دو کارخانه بزرگ نساجی در جنوب تایوان و در کارگاه‌هایی مشابه نوع کار مطالعه حاضر، مغایرت دارد. نتایج این پژوهشگران نشان داد که در سال سوم پژوهش، میزان تراکم کل بیه آئروسول‌ها در داخل کارگاه‌ها 8502 CFU/m^3 و در خارج کارگاه‌ها 1835 CFU/m^3 اندازه‌گیری شد. علت اصلی تراکم بیشتر در داخل کارگاه‌ها نسبت به خارج در این مطالعه بنا به اظهار نویسنده مقاله، وجود یک منبع فعال از باکتری در داخل کارگاه‌ها به‌علاوه منابع مختلف و متنوع پنبه‌های وارداتی به کارخانه بود (Su *et al.*, 2002). کارگاه ۱ شامل بخش‌های حلاجی، کاردینگ، پاساژ و فلایر از بین سایر کارگاه‌ها دارای بالاترین میزان تراکم بیه آئروسول‌ها می‌باشد. در این بخش عدل‌های پنبه خام پس از ورود به کارخانه باز شده و سپس ضایعات آن گرفته می‌شود. در طی این فرایند گرد و غبار زیادی در فضای کارگاه پخش می‌گردد. به‌طور معمول ذرات گرد و غبار حاوی بیه‌آئروسول‌ها در هوای کارگاه پراکنده و آنرا آلوده می‌نماید. همچنین به‌دلیل بالابودن رطوبت نسبی و دما نسبت به دو کارگاه دیگر و عدم تهویه مناسب ناشی از عدم وجود پنجره، شرایط برای رشد و تکثیر باکتری‌ها بهتر فراهم شده و موجب افزایش باکتری‌ها در این کارگاه نسبت به دو کارگاه دیگر گردیده، تا آنجا که تراکم بیه آئروسول‌ها به میزان 135 CFU/m^3 می‌رسد. از طرفی با توجه به پایین بودن منابع آلودگی و رطوبت نسبی کمتر در کارگاه ۲ نسبت به کارگاه ۱، که اختلاف میانگین تراکم بیه آئروسول‌ها بین این دو کارگاه از نظر آماری معنی دار است. Su و همکاران در سال ۲۰۰۲ و در سال دوم و سوم تحقیق خود و در

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاری و مساعدت به عمل آمده توسط مسوولین محترم کارخانه که شرایط این مطالعه را فراهم کردند، سپاسگزاری می‌گردد.

منابع

Abdel-Hameed, H.; Abdulazim, A.; Mostafa, M.; Kamel, E.G., (2007). Evaluation of fungal and bacterial aerosols in cotton dust in a Spin Factory in El-Minia City and its relation to pulmonary function changes among workers. *Egyptian J. Med. Microbiol.*, 16(2), 351-363.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, (1989). American Conference of Governmental Industrial Hygienists Bioaerosol Committee: Guidelines for the Assessment of Bioaerosols in the Indoor Environment. Cincinnati, OH.

Bacteria sampler, user's handbook, (2002). HB 3109-05 Casella Cel Ltd.

Chatigny, M.A., (1995). Sampling airborne microorganisms. In: Cohen BS, Hering, S.V., Eds. Air sampling instruments for evaluation of atmospheric contaminants. 8th ed. ACGIH, Cincinnati, Ohio; E-3.

Christiani, D. C.; Wegman, D. H.; Ellen A.; Ye, T.T.; Lu, P.L.; Olenchock, S. A., (1993). Cotton dust and gram-negative bacterial endotoxin correlations in two cotton textile mills. *Am. J. Ind. Med.*, 23(2), 333-342.

این موضوع را می‌توان به نوع بیوآئروسول‌ها و پتانسیل متفاوت آن‌ها در بیماری‌زایی نسبت داد. راهنمای سازمان (American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)، مقادیر بیوآئروسول‌های باکتریایی در محیط‌های داخلی را 50 CFU/m^3 پیشنهاد کرده است (ACGIH, 1989). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیز فاقد حدود مجاز بیوآئروسول‌های باکتریایی می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که میزان تراکم بیوآئروسول‌های باکتریایی در کارگاه‌های کارخانه از مقادیر پیشنهادی راهنمای سازمان ACGIH بالاتر است.

نتیجه گیری

نتایج این بررسی نشان داد که فراوان‌ترین گونه‌های باکتریایی در مطالعه‌ی حاضر به ترتیب استافیلوکوکوس اپیدرمیس، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس آنتراسیس و استرپتوکوکوس پنومونی بود. کارگاه ۱ با میانگین 85 CFU/m^3 دارای بالاترین میزان تراکم بیوآئروسول‌ها در میان کارگاه‌هاست. علی‌رغم آن که نتایج تراکم بیوآئروسول‌ها در مطالعه کنونی از سایر پژوهش‌های محدودی که انجام گرفته بسیار پایین‌تر است، ولی تراکم بیوآئروسول‌ها در کلیه کارگاه‌ها از مقادیر پیشنهادی راهنمای سازمان ACGIH بالاترست. لذا به منظور بهبود شرایط کیفی هوای کارگاه‌ها، لازم است اقدامات کنترلی مناسب و قابل قبولی برای تهویه هوای محیط کار و کاهش آلودگی صورت پذیرد تا مخاطرات احتمالی برای سلامتی کارگران به حداقل ممکن کاهش یابد.

- toms among workers in day-care centers. *Arch. Environ. Health.* 52, 200-207.
- Merchant, J.A., (2001). Cotton and Other Textile Dusts. In: Patty's toxicology. Volume 1. Ed, John Wiley & sons, INC, Fifth Ed. 661-665.
- Mittelhauser, M., (1997). Employment trends in textiles and apparel, 1973-2005.
- Murray, P.R.; Rosental, K.S.; Pfaller, M.A., (2009). *Medical Microbiology*. 6th ed. Philadelphia: Mosby, 9.
- NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4th ed., (January, 1998). Bioaerosol Sampling (Indoor Air), Method No. 0800
- Nowroozi, J.; Goudarzi, G.; Pakzad, P.; Raza-vipour, R., (2012). Isolation and detection of *Staphylococcus aureus* enterotoxins A-E and TSSst-1 genes from different sources by PCR method. *Qom Univer. Med. Sci.*, 6(3) (in Persian).
- Oldenburg, M.; Latza, U.; Baur, X., (2007). Exposure-response relationship between endotoxin exposure and lung function impairment in cotton textile workers. *Int. Arch. Occup. Environ. Health*, 80, 388-395.
- Olenchock, S. A., Christiani, D. C., Mull, J. C., et al. (1990a). Airborne endotoxin concentrations in various work areas within two cotton textile mills in the people's Republic of China. *Biomed. Environ. Sci.* 3, 443-451.
- Rylander, R., and Bergstorm, R. (1993). Bronchial reactivity among cotton workers in-
 Douwes, J.; Thorne, P.; Pearce, N.; Heederik, D., (2003). Bioaerosol health effects and exposure assessment: Progress and prospects. *Ann. Occup. Hyg.*, 47(3),187-200.
- Eduard, W.; Halstensen, A. S., (2009). Quantitative exposure assessment of organic dust. *Scand. J. Work. Hea.*, Suppl. (7), 30-35.
- Golbabaee, F.; Jahangiri, M.; Khavaji, S., (2008). *Industrial Hygiene Evaluation Methods*. University of Tehran Press, 273-274 (in Persian).
- Greenberg, M.I., (1997). Textile manufacture. In: *Occupational Industrial and Environmental Toxicology*. Ed, Mosby-Year Book, Inc, 395-398.
- Haeri, A. R.; Roshani, A., (1389). Discussion industrial development strategy country. Association of Iran Textile Industries (in Persian).
- Haghdoust A.A., (2009). Do you want to gain a profound insight into sample size and statistical power? *Iran J. Epidemiol.*, 5(1), 57-63 (in Persian).
- <http://fa.wikipedia.org>.
- Larsson, L.; Szponar, B.; Ridha, B.; Pehrson, C.; Dutkiewicz, J.; Krysińska-Traczyk, E.; Sitkowska, J., (2008). Identification of bacterial and fungal components in tobacco and tobacco smoke. *Tob. Induc. Dis.*, 4(4), 1-8.
- Li, C.S.; Hsiu, C.W.; Tai, M.L., (1997). Indoor pollution and sick building syndrome symp-

- borne biocontaminants. *Curr. Opin. Biotech.*, 15:170-174.
- Su, H.J.J.; Chen, H.L.; Huang, C.F.; Lin, C.Y.; Li, F.C.; Milton D.K., (2002). Airborne Fungi and Endotoxin Concentrations in Different Areas within Textile Plants in Taiwan: A 3-Year Study. *Environ. Res.*, 89(1), 58-65.
www.pezeskh.us/p=14100
- lation to dust and endotoxin exposure. *Ann. Occup. Hyg.*, 37, 57-63.
- Rylander, R.; Lundholm, M., (1978). Bacterial contamination of cotton and cotton dust and effects on the lung. *Brith. J. Ind. Med.*, 35, 204-207.
- Stetzenbach, L. D.; Buttner, M. P.; Cruz, Pa., (2004). Detection and enumeration of air-

Assessment of airborne bacterial bioaerosols in a textile industry

*M. Ghasemkhani*¹; *M. Sheikh Alishahi*²; *M. Asghari*³

¹ *Associated professor of Occupational Health, Department of Occupational Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran*

² *BS of Occupational Health*

³ *Msc of Occupational Health, Department of Occupational Health, School of Public Health, Arak University of Medical Sciences, Arak*

Abstract

Introduction: IBioaerosols are usually defined as aerosols or particles with microbial, plant or animal origin. Textile industries are of the working environments in witch workers are exposed to bioaerosols. In textile industry, the highest contamination concentration is the belonged to carding step. Since, textile industry in iran is native and a large number of employers are working in this industry, this study was undertaken to assess bacterial bioaerosols concentration in a textile in industry in iran.

Material and Method: In cross-sectional study was done in different units and also outdoor environment of a cotton textile plant. The concentration of bioaerosols were sampled and measured according 0800 method presented by NIOSH, during summer. Diagnosis of type of colonies and bactories, grown on blood agar, was done using gram staining.

Result: The mean bioaerosols concentration obtained the highest and lowest values in outdoor environment (94 ± 9.5 CFU/m³) and unit 2 (Ring site) (64 ± 18.0 CFU/m³), respectively. The mean difference of bioaerosols concentration in unit 1 (Carding sites) and unit 2 (Ring site), was statistically significant in this study. The highest number of bioaerosols colony was for staphylococcus Epiderms (N=1743) and the lowest number was for streptococcus pneumonia (N=64) in the whole plant.

Conclusion: Although the bioaerosols concentration obtained in the present study is lower than those reported in other studies, these values are above the threshold recommended.

Key words: *Bacterial bioaerosols, Opening and Carding, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis*