

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: ۹۰/۵/۲۵ تاریخ پذیرش: ۹۰/۷/۲۶

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

سال بیست و نهم / شماره ۱۶۲ / هفته دوم دی ماه ۱۳۹۰

گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟

سیدعلی سنبلستان^۱، دکتر نوشین خلیلی^۲، دکتر مهین هاشمی‌پور^۳

خلاصه

مقدمه: گواتر اندریک به طور معمول در نواحی کوهستانی و مناطق با کمبود ید در کشورها شایع می‌باشد. هورمون‌های تیروپید برای رشد و تکامل طبیعی بدن انسان ضروری هستند. مشخص شده است که اختلال شدید در عملکرد تیروپید می‌تواند روحی وزن تأثیرگذار باشد، ولی تأثیر اختلالات جزئی عملکرد تیروپید بر روی وزن بدن و ارتباط آن‌ها با چاقی و میزان شاخص توده‌ی بدنی (BMI) مشخص نیست. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان BMI در گروهی از کودکان و بررسی ارتباط آن با عملکرد تیروپید و بیماری گواتر بود.

روش‌ها: ۴۳۴۵ کودک در سنین مدرسه (۲۳۹۷ نفر از اصفهان و ۱۹۴۸ نفر از سمیرم) با محدوده سنی ۶ تا ۱۳ سال وارد مطالعه شدند. کودکانی که هر گونه بیماری حاد یا مزمن و یا هر گونه سابقه‌ی بیماری شناخته شده تیروپید و یا عالیم و نشانه‌های بیماری تیروپید را داشتند، وارد مطالعه نگردیدند.

یافته‌ها: میانگین سنی کودکان مورد مطالعه $1/10 \pm 9/38$ سال بود. میانگین BMI در کودکان ساکن اصفهان به طور معنی‌داری از کودکان سمیرم بیشتر بود (کودکان با و بدون گواتر). در اصفهان کودکان سالم BMI بیشتری نسبت به کودکان مبتلا به گواتر داشتند، در حالی که در کودکان سمیرم بر عکس بود ($P < 0.045$).

نتیجه‌گیری: گواتر ممکن است ارتباطی با برخی شاخص‌های تن‌سنجی مثل وزن و BMI کودکان داشته باشد، ولی به نظر می‌رسد که عوامل اجتماعی-اقتصادی تأثیر بیشتری بر این شاخص‌ها دارند.

وازگان کلیدی: گواتر اندریک، شاخص توده‌ی بدنی، کودک.

صرفی مردم فاقد مقادیر کافی ید است، مشاهده می‌شود (۳-۴).

پیش از این در سال‌های طولانی گواتر اندریک در اکثر نقاط ایران شایع بود (۵) و در این سال‌ها کمبود آهن به عنوان یک عامل مسبب این بیماری مطرح شد (۶). مشخص شده است که تغییر در عملکرد تیروپید طی دوران کودکی تحت تأثیر عواملی همچون جنس، سن، بافت چربی، نژاد، تغذیه، دریافت ید و منطقه‌ی

مقدمه

بیماری‌های ناشی از کمبود ید هنوز به عنوان یک مشکل سلامتی عمده که حدود ۷۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان را گرفتار کرده‌اند، شناسایی می‌شوند (۱). این بیماری‌ها شامل شرایطی از جمله گواتر اندریک، هیپوتیروپیدیسم، کرتینیسم اندریک و سایر آنومالی‌های مادرزادی می‌شوند (۲). گواتر اندریک به طور معمول در نواحی کوهستانی و نواحی با کمبود ید که غذای

^۱ کارورز، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^۲ استادیار، فوق تخصص غدد داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^۳ استاد، فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، مرکز تحقیقات سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

Email: hashemipour@med.mui.ac.ir

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر مهین هاشمی‌پور

تیرویید یا سابقه‌ی بیماری عمدی زمینه‌ای مثل بیماری‌های قلبی-ریوی، کبدی یا کلیوی داشتند، وارد مطالعه نشدند. رضایت‌نامه‌ی کتبی از والدین کودکان اخذ گردید.

وزن افراد و قد آن‌ها در حالت ایستاده اندازه‌گیری شد. قد به نزدیک‌ترین ۱۰۰ سانتی‌متر و وزن به نزدیک‌ترین ۱۰۰ گرم گرد شد. BMI از تقسیم وزن (کیلوگرم) به محدود قدر (مترمربع) محاسبه گردید. از همه‌ی شرکت کنندگان ۵ سی‌سی خون جهت انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی تهیه گردید. نمونه‌های خون بر روی یخ به آزمایشگاه انتقال یافتند و در فریزر ۷۰- درجه‌ی سانتی‌گراد تازمان آنالیز ذخیره گردیدند.

سطح T4 سرم با روش رادیو ایمونو اسی (شرکت ایران کاوشن‌بار، تهران، ایران) بررسی شد و محدوده‌ی T4 بین ۴/۵ تا ۱۲ میکروگرم در دسی‌لیتر تعیین گردید. سطح TSH سرم نیز با روش ایمونورادیومتریک (شرکت ایران کاوشن‌بار، تهران، ایران) اندازه‌گیری شد و محدوده‌ی طبیعی آن بین ۰/۳ تا ۳/۹ میلی‌واحد در میلی‌لیتر تعیین گردید.

گروه بندی گواتر توسط دو متخصص غدد بر اساس طبقه‌بندی WHO/ UNICEF/ ICCIDD به شکل زیر انجام شد:

گروه صفر: عدم وجود گواتر قابل لمس یا قابل مشاهده

گروه ۱: گواتری که در معاینه قابل لمس است، ولی زمانی که گردن در حالت طبیعی و خنثی است قابل مشاهده نیست (تیرویید از لحاظ مشاهده بزرگ نشده است).

گروه ۲: نورمی در ناحیه‌ی گردن که به طور واضح در حالت طبیعی گردن قابل مشاهده است و در معاینه

جغرافیایی قرار می‌گیرد (۷-۸).

اغلب اختلال شدید عملکرد تیرویید، وزن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ولی اثر اختلالات جزئی کارکرد تیرویید روی وزن بدن و ارتباط آن با چربی بدن نامشخص مانده است (۹). از سوی دیگر، مقادیر بالاتر تیروتروپین (TSH Thyroid stimulating hormone) در کودکان چاق در مقایسه با کودکان طبیعی یافته شده است (۱۰)، ولی هنوز مشخص نشده است که چه میزان از تغییرات در عملکرد تیرویید در کودکان، با خصوصیاتی هم چون وزن و ترکیب بدن ارتباط دارند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی شاخص توده‌ی بدنی (BMI) در گروه‌ی از کودکان و بررسی ارتباط آن با عملکرد تیرویید و بیماری گواتر بود.

روش‌ها

این مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی- تحلیلی در گروه‌ی از کودکان سینین مدرسه در سمیرم و اصفهان در سال ۱۳۸۴ انجام شد. سمیرم یک منطقه‌ی کوهستانی در مرکز ایران است که از لحاظ گواتر، هیپراندیمیک محسوب می‌شود (۱۰) که با اصفهان به عنوان یک منطقه‌ی مجاور با شیوع کمتر گواتر و شرایط بهتر اجتماعی اقتصادی مقایسه شد.

کودک در سینین مدرسه (۲۳۹۷ نفر از اصفهان و ۱۹۴۸ نفر از سمیرم) در محدوده‌ی سنی ۶ تا ۱۳ سال وارد مطالعه شدند. کودکانی که به هر گونه بیماری حاد یا مزمن مبتلا بودند و یا سابقه‌ی ابتلا به هر گونه بیماری تشخیص داده شده تیرویید داشتند، وارد مطالعه نگردیدند. در مطالعه هیچ گونه علایم و نشانه‌هایی از بیماری‌های تیرویید نداشتند. همچنین افرادی که سابقه‌ی برخورد با ید رادیو اکتیو، جراحی

معنی‌داری نداشت.

میانگین BMI در کودکان اصفهانی به طور واضح از کودکان ساکن سمیرم بالاتر بود (چه در کودکان مبتلا به گواتر و چه در کودکان سالم، در هر دو گروه $P < 0.001$).

همبستگی معنی‌داری بین سطح BMI و TSH یافت نشد ($P = 0.534$).

کودکان سالم اصفهانی BMI بالاتری نسبت به کودکان بیمار داشتند 16.98 ± 3.35 در مقابل 15.59 ± 2.31 ($P < 0.001$)، ولی در سمیرم این قضیه بر عکس بود ($P = 0.404$ در مقابل 14.81 ± 1.63).

در کودکان اصفهان اختلاف معنی‌داری بین سطح BMI در گروه‌های مختلف گواتر مشاهده گردید. طبق آنالیز Tukay HSD تفاوت BMI بین گروه‌های صفر و ۱ ($P < 0.001$) و ۲ و صفر ($P < 0.001$) معنی‌دار بود (جدول ۳).

ولی چنانچه در جدول ۴ نشان داده شده است، ارتباط معنی‌داری در این مورد در کودکان ساکن سمیرم مشاهده نشد.

نیز تیرویید بزرگ شده قابل لمس است.

این مطالعه توسط کمیته‌ی اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأیید شده است.

داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۱۶ (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) آنالیز شد. متغیرهای کمی به صورت میانگین \pm انحراف معیار ($Mean \pm SD$) نشان داده شدند. برای مقایسه‌ی متغیرهای کمی بین دو گروه از آزمون Student-t برای بررسی ارتباط BMI و گروه‌های گواتر از آزمون One way ANOVA استفاده گردید. مقدار P کمتر از ۰.۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

مشخصات دموگرافیک افراد و متغیرهای اندازه‌گیری شده در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند.

همان طور که در جدول ۲ دیده می‌شود، در مقایسه‌ی بین دو شهر، کودکان اصفهانی به طور چشمگیری قد، وزن و BMI و سطح TSH بالاتری داشتند، ولی T4 در کودکان دو گروه اختلاف

جدول ۱. مشخصات دموگرافیک افراد شرکت کننده در مطالعه

متغیر مورد بررسی	کودکان ساکن اصفهان	کودکان ساکن سمیرم	همه‌ی کودکان
سن (سال) [*]	9.42 ± 1.15	9.33 ± 1.02	9.38 ± 1.10
جنس (ملکر- مؤنث) ^{**}	$60.8 - 39.2$	$48 - 52$	$55.1 - 44.9$

^{*}: انحراف معیار \pm میانگین، ^{**}: درصد

جدول ۲. متغیرهای مورد بررسی در دو گروه کودکان

متغیر مورد بررسی	کودکان ساکن اصفهان	کودکان ساکن سمیرم	همه‌ی کودکان	متغیر مورد بررسی
انحراف معیار \pm میانگین	قد (سانتی‌متر)			
$132/35 \pm 7/54$	$134/04 \pm 9/13$	$133/29 \pm 8/50$	< 0.001	وزن (کیلوگرم)
$26/20 \pm 4/58$	$30/12 \pm 8/57$	$28/37 \pm 7/34$	< 0.001	(کیلوگرم بر مترمربع)
$14/87 \pm 1/53$	$16/53 \pm 3/10$	$15/79 \pm 2/66$	< 0.001	T4 (میکروگرم در دسی‌لیتر)
$8/83 \pm 1/48$	$8/70 \pm 1/48$	$8/79 \pm 1/48$	0.778	TSH (میلی واحد در لیتر)
$2/50 \pm 1/47$	$2/83 \pm 2/54$	$2/61 \pm 1/88$	< 0.001	BMI

BMI: Body mass index; TSH: Thyroid stimulating hormone

جدول ۳. ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و گروه گواتر در کودکان ساکن اصفهان

P مقدار	F	BMI حداقل	BMI میانگین	BMI انحراف معیار ± میانگین	گروه گواتر
< 0/001	۵۳/۳۴۰	۴۲/۳۲	۹/۸۳	۱۶/۹۸ ± ۲/۳۵	۰
	۲۹/۲۲	۱۰/۲۰		۱۵/۶۴ ± ۲/۳۸	۱
	۲۲/۳۵	۱۲/۱۵		۱۵/۲۸ ± ۱/۸۶	۲

BMI: Body mass index

جدول ۴. ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و گروه گواتر در کودکان ساکن سمرم

P مقدار	F	BMI حداقل	BMI میانگین	BMI انحراف معیار ± میانگین	گروه گواتر
۰/۱۷۲	۱/۷۶۱	۲۷/۳۹	۸/۷۷	۱۴/۸۱ ± ۱/۶۳	۰
	۲۱/۹۵	۱۱/۴۸		۱۴/۹۶ ± ۱/۳۷	۱
	۲۷/۳۹	۸/۷۷		۱۴/۸۶ ± ۱/۵۳	۲

BMI: Body mass index

آزاد در افراد لاغر و چاق یوتیرویید دیده نشد. در این مطالعه ارتباطی بین عملکرد در محدوده‌ی طبیعی تیرویید و میزان BMI مشاهده نگردید (۹).

نتایج به دست آمده در این مطالعه با مطالعه‌ی دیگری که آن هم همبستگی خاصی بین TSH و BMI یافت نکرده بود، تطابق داشت (۱۲). همچنین این یافته‌ها در تقابل با یافته‌های مطالعاتی است که سطوح بالاتر TSH و هورمون‌های تیروییدی را در کودکان چاق نسبت به کودکان طبیعی مطرح کرده بودند. کاهش وزن در کودکان چاق باعث کاهش واضحی در میزان T3، TSH و T4 می‌شود و مجموع این موارد نشان می‌دهد که افزایش هورمون‌های تیروییدی نتیجه‌ی چاقی و نه علت آن هستند (۱۶-۱۸).

یک توضیح احتمالی در مورد این اختلافات می‌تواند این باشد که بین TSH و BMI در زمانی که BMI طبیعی است همبستگی وجود ندارد، ولی در شرایط BMI بالا همبستگی مثبتی قابل مشاهده است. همچنین بر طبق یافته‌های مطالعه، کودکان اصفهانی که در گروه‌های ۱ و ۲ گواتر قرار داشتند، BMI پایین‌تری

بحث

طبق مطالعات گذشته عوامل مختلفی مانند سن، جنس، بلوغ و میزان چربی بدن ممکن است روی سطح TSH و هورمون‌های تیروییدی اثر داشته باشند، ولی این اطلاعات مورد اختلاف هستند (۱۱-۱۴).

مطالعات مختلفی پیش از این برای بررسی ارتباط شاخص‌های تن‌سنجه و عملکرد تیرویید انجام شده‌اند. به عنوان مثال در مطالعه‌ای که در ترکیه انجام شد، به این نتیجه رسیدند که کودکان با گواتر قابل لمس لاغرتر هستند. همچنین بیماری‌های تغذیه‌ای در کودکان مبتلا به گواتر قابل لمس بیشتر از کودکان سالم نبود و گواتر و اشکالات تغذیه‌ای در کودکان با سطح اجتماعی-اقتصادی پایین شایع‌تر بودند (۱۵).

همچنین مطالعه‌ای که در انگلستان انجام شد، نشان داد که ارتباطی بین سطح TSH و یا T4 آزاد سرم به عنوان یک متغیر کمی پیوسته و BMI وجود ندارد و بین میزان BMI زمانی که افراد بر حسب TSH و یا T4 آزاد سرم طبقه‌بندی شدند، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. همچنین اختلاف واضحی بین TSH و یا T4

همچنین وضعیت اجتماعی-اقتصادی ارتباط مهمی با شاخص‌های تن‌سنجدی مثل BMI دارد. عدم وجود تغذیه‌ی مناسب می‌تواند اثرات سویی در رشد و تکامل کودکان داشته باشد. بنابراین در نواحی با سطح اجتماعی-اقتصادی پایین، سطوح پایین‌تری از BMI نیز مدنظر می‌باشد.

نتیجه‌گیری

گواتر ممکن است ارتباطی با ویژگی‌های تن‌سنجدی مثل وزن، قد و BMI کودکان داشته باشد، ولی عوامل اجتماعی-اقتصادی به نظر نقش مهم‌تری در این ارتباط دارند.

نسبت به گروه صفر داشتند. این مطلب می‌تواند نشان دهنده‌ی تأثیر شدت بیماری در کنار سایر علل ژنتیکی و محیطی بر روی وضعیت تن‌سنجدی کودکان باشد. از سوی دیگر، برخی از عوامل نظیر سن و بلوغ می‌توانند بر روی هورمون‌های تیروپییدی تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال یک مطالعه نشان داده است که سطح TSH و هورمون‌های تیروپییدی در دخترها و نه در پسرها در زمان بلوغ در مقایسه با زمان قبل از بلوغ کاهش می‌یابد. این اختلافات جنسی می‌توانند نشانه‌ای از وجود اثرات مهاری استروژن‌ها در محور TRH-TSH و همچنین در تغییرات ساختار بدن در سیر بلوغ در دو جنس باشند (۱۹).

References

- World Health Organization, ICCIDD, UNICEF. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring their Elimination. A Guide for Programme Managers. 2nd ed. Geneva: WHO; 2001.
- Saggiorato E, Mussa A, Sacerdote C, Rossetto R, Arecco F, Origlia C, et al. Thyroid volume and urinary iodine excretion in the schoolchild population of a Northwestern Italian sub-Alp metropolitan area. *J Endocrinol Invest* 2004; 27(6): 516-22.
- Koutras DA, Christakis G, Trichopoulos D, Dakou-Voutetaki A, Kyriakopoulos V, Fontanares P, et al. Endemic goiter in Greece: nutritional status, growth, and skeletal development of goitrous and non goitrous populations. *Am J Clin Nutr* 1973; 26(12): 1360-8.
- Koutras DA, Papapetrou PD, Yataganas X, Malamos B. Dietary sources of iodine in areas with and without iodine-deficiency goiter. *Am J Clin Nutr* 1970; 23(7): 870-4.
- Emami A, Shahbazi H, Sabzevari M, Gawam Z, Sarkissian N, Hamedi P, et al. Goiter in Iran. *Am J Clin Nutr* 1969; 22(12): 1584-8.
- Kimiagar M, Azizi F, Navai L, Yassai M, Nafarabadi T. Survey of iodine deficiency in a rural area near Tehran: association of food intake and endemic goitre. *Eur J Clin Nutr* 1990; 44(1): 17-22.
- Bulow P, I, Knudsen N, Jorgensen T, Perrild H, Ovesen L, Laurberg P. Large differences in incidences of overt hyper- and hypothyroidism associated with a small difference in iodine intake: a prospective comparative register-based population survey. *J Clin Endocrinol Metab* 2002; 87(10): 4462-9.
- Stockling JR. Serum thyrotropin and thyroid hormone measurements and assessment of thyroid hormone transport. In: Braverman LF, Utiger RD, Ingbar SH, Werner SC, editors. Werner and Ingbar's the Thyroid. 7th ed. Philadelphia: Lippincott; 1996. p. 377.
- Manji N, Boelaert K, Sheppard MC, Holder RL, Gough SC, Franklyn JA. Lack of association between serum TSH or free T4 and body mass index in euthyroid subjects. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2006; 64(2): 125-8.
- Azizi F, Mehran L. Experiences in the prevention, control and elimination of iodine deficiency disorders: a regional perspective. *East Mediterr Health J* 2004; 10(6): 761-70.
- Soldin OP, Hoffman EG, Waring MA, Soldin SJ. Pediatric reference intervals for FSH, LH, estradiol, T3, free T3, cortisol, and growth hormone on the DPC IMMULITE 1000. *Clin Chim Acta* 2005; 355(1-2): 205-10.
- Cioffi M, Gazzero P, Vietri MT, Magnetta R, Durante A, D'Auria A, et al. Serum concentration of free T3, free T4 and TSH in healthy children. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2001; 14(9): 1635-9.
- Kratzsch J, Schubert G, Pulzer F, Pfäffle R, Koerner A, Dietz A, et al. Reference intervals for TSH and thyroid hormones are mainly affected

- by age, body mass index and number of blood leucocytes, but hardly by gender and thyroid autoantibodies during the first decades of life. *Clin Biochem* 2008; 41(13): 1091-8.
- 14.** Nelson JC, Clark SJ, Borut DL, Tomei RT, Carlton EI. Age-related changes in serum free thyroxine during childhood and adolescence. *J Pediatr* 1993; 123(6): 899-905.
- 15.** Ersoy B, Gunes HS, Gunay T, Yilmaz O, Kasirga E, Egemen A. Interaction of two public health problems in Turkish schoolchildren: nutritional deficiencies and goitre. *Public Health Nutr* 2006; 9(8): 1001-6.
- 16.** Reinehr T, Andler W. Thyroid hormones before and after weight loss in obesity. *Arch Dis Child* 2002; 87(4): 320-3.
- 17.** Reinehr T, Isa A, de SG, Dieffenbach R, Andler W. Thyroid hormones and their relation to weight status. *Horm Res* 2008; 70(1): 51-7.
- 18.** Reinehr T, de SG, Andler W. Hyperthyrotropinemia in obese children is reversible after weight loss and is not related to lipids. *J Clin Endocrinol Metab* 2006; 91(8): 3088-91.
- 19.** Kaloumenou I, Duntas LH, Alevizaki M, Mantzou E, Chiotis D, Mengreli C, et al. Gender, age, puberty, and BMI related changes of TSH and thyroid hormones in schoolchildren living in a long-standing iodine replete area. *Horm Metab Res* 2010; 42(4): 285-9.

The Relation between Goiter and BMI among Children in Isfahan and Semiroom

Seyed Ali Sonbolestan¹, Noushin Khalili², Mahin Hashemipour³

Abstract

Background: Endemic goiter is generally seen in mountainous and iodine-deficient regions of the countries where the people's diet lacks sufficient amount of iodine. Moreover, thyroid hormones are important for normal somatic growth and development. On the other hand, changes in thyroid function during childhood are affected by various factors, like gender, age, adiposity, nutrition, iodine intake and geographic region. Although it is known that severe thyroid dysfunction affects weight, the effects of minor disturbances of a normal thyroid function on body weight, obesity and body mass index (BMI) remain vague. In this study, our goal was to assess BMI in a group of children and investigate its relation with thyroid function and goiter.

Methods: A total number of 4345 children (2397 from Isfahan and 1948 from Semiroom), aged 6-13 years (with a mean of 9.38 ± 1.10 years) were recruited in this study. The children with any acute or chronic disorder or any history of diagnosed thyroid disease and clinical signs or symptoms of thyroid disease were excluded.

Findings: The mean of BMI in children from Isfahan was significantly higher than the children from Semiron in both goitrous ($P < 0.01$) and healthy ($P < 0.01$) groups. Although healthy children of Isfahan had higher BMIs than the patients ($P < 0.01$), in Semiroom the relation was reversed ($P = 0.045$).

Conclusion: Goiter may have some relations with anthropometric features such as weight and BMI, especially among children. However, socioeconomic factors seemed to have more important roles because BMI was higher in both goitrous and healthy children from Isfahan.

Keywords: Endemic goiter, Body mass index, Children.

¹ Intern, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

² Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

³ Professor, Department of Pediatrics Endocrinology, Health Promotion Research Center, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Corresponding Author: Mahin Hashemipoor, Email: hashemipour@med.mui.ac.ir