

## ساختار و مراحل ترمیم پوست

در جامعه‌ی بشری تغییرات بدفرم و ناهنجاری‌های پوستی ناشی از سوختگی و جراحات حاصل از جراحی و حوادث و امثال آن‌ها در فرد بازتاب‌های روانی و رفتاری ناخوشایندی ایجاد می‌کنند. ماتریکس خارج سلولی (extra cellular matrix [ECM]) بزرگ‌ترین جزء تشکیل‌دهنده‌ی پوست طبیعی است که ژل مانند است و به‌وسیله‌ی سلول‌های پوست تولید می‌شود. ساخته‌شدن ECM یک عامل کلیدی برای پرشدن ضایعات پوستی از قبیل سوختگی، سالک، آبله مرغان و محل جراحات و جوش است. اجزاء ماتریکس خارج سلولی عبارت‌اند از: پلی‌ساکاریدهای مختلف، آب و پروتئین‌های کلاژنی. قدرت انبساط و استحکام پوست طبیعی با در نظر گرفتن وزن آن نزدیک به قدرت آهن است در حالی که دارای الاستیسیته و قابلیت تراکم‌پذیری بالایی می‌باشد. این ویژگی‌ها به‌دلیل اثر توأم دو دسته‌ی اصلی از مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌ی ECM می‌باشد که به‌وسیله‌ی فیبروبلاست و سلول‌های اپی‌درم ترشح می‌شوند: (۱) پروتئین‌های ساختاری فیبری شکل مانند: کلاژن‌ها، الاستین، فیبرونکتین و لامینین که به ECM استحکام و حالت ارتجاعی می‌بخشند. (۲) پروتئوگلیکان‌ها مثل درماتان‌سولفات و هیالورونیک اسید، که معمولاً از چندین رشته گلیکوزآمینوگلیکان که از یک هسته‌ی پروتئینی منشعب می‌شوند. پروتئوگلیکان‌ها مولکول‌های بزرگ و جاذب آب هستند که حالت ضربه‌گیری ECM را برای حفظ سلول‌ها ایجاد می‌کنند. در کل اطلاع از ساختار و مراحل ترمیم پوست ما را در طراحی آزمایشات و انجام تحقیقاتی دقیق‌تر در این راستا کمک می‌کند.

**کلیدواژه‌ها:** فیبروبلاست، ماتریکس خارج سلولی، ترمیم جراحی

دریافت مقاله: ۹۰/۰۸/۰۱ پذیرش مقاله: ۹۰/۰۹/۱۷

پوست و زیبایی؛ زمستان ۱۳۹۰، دوره‌ی ۲ (۴): ۲۲۹-۲۴۴

منا ملک محمدی<sup>۱</sup>  
دکتر حسین عبدالتهرانی<sup>۱</sup>  
دکتر ناصر اقدمی<sup>۲</sup>

۱. گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  
۲. گروه سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران.

نویسنده‌ی مسئول:

منا ملک محمدی

تهران، بزرگراه جلال آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ی علوم پزشکی، صندوق پستی ۳۳۱-۱۴۱۱۵، پست الکترونیک:

monamalek.m@gmail.com

تعارض منافع: اعلام نشده است.

### مقدمه

آراستگی از موضع علمی و درمانی نیز بسیار حایز اهمیت است از وظایف دانشمندان و متخصصان علاقمند به حل مسایل علمی، کشف دلایل بروز و درمان این نوع ناهنجاری‌ها است.

نقش ترمیمی سلول‌های فیبروبلاست در ضایعات پوستی علاوه‌بر ماهیت خود سلول تا اندازه‌ی زیادی به بازسازی محیط خارج سلولی نیز وابسته است. به‌گونه‌ای که برخی مطالعات نشان داده‌اند تزریق مواد پرکننده همانند کلاژن می‌توانند بستر مناسبی را برای رشد و تکثیر این سلول‌ها فراهم نمایند. یکی از سلول‌های درگیر در مسیر ترمیم پوست به‌خصوص بعد

تغییرات بدشکل و ناهنجاری‌های پوستی ناشی از عوامل ارثی، بیماری، تصادف، سوختگی، جراحی، حوادث و مانند آن‌ها بازتاب‌های روانی و رفتاری ناخوشایندی در افراد مبتلا ایجاد می‌کنند که صرف‌نظر از مشکل درمان و هزینه‌ی آن، ممکن است به ناهنجاری‌های رفتار فردی و اجتماعی از جمله ایجاد انزوای اجتماعی، قطع رابطه‌های خانوادگی، فامیلی و اجتماعی یا حتی افسردگی منجر شوند. کمک به این قبیل افراد که البته علاوه‌بر رفع مشکل ظاهری و حفظ

از آسیب‌های گسترده‌ی سلول‌های بنیادی مزانشیمی است که با ترشح مواد خارج سلولی و فاکتورهای رشد و هم‌چنین تماس سلولی نقش مهمی در تکثیر و عملکرد مناسب سلول‌های فیبروبلاستی دارند. هرچند در مطالعاتی این نقش به واسطه‌ی تغییر در ترشحات سلول‌های فیبروبلاست نشان داده شده‌اند ولی تأثیر سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدانشده از منابع گوناگون هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

## پوست

پوست بزرگ‌ترین بافت بدن مهره‌داران است که عملکردهای زیادی شامل تنظیم حرارت، هدایت حس‌های فیزیکی و عمل به‌عنوان سد مکانیکی (برای حفاظت بدن در مقابل هجوم میکروارگانیسم‌ها و عوامل مضر محیطی از قبیل تابش اشعه، آسیب‌های مکانیکی و سوختگی‌های گرمایی و شیمیایی) دارد. حفظ ساختار طبیعی پوست، به‌خصوص پوست صورت، از آن‌جاکه ظاهر و جلوه‌ی تعیین‌کننده‌ی مهمی برای ارتباط شکلی فرد است، ارزش بالایی در روابط اجتماعی دارد بسیار مهم است. تا جایی که درمان‌های آرایشی و جراحی‌های پلاستیک برای طراوت یا رفع ضایعات پوست یک تجارت عظیم را در سراسر دنیا تشکیل داده است. میان پوست یا درم بازسازی نمی‌شود، بلکه با فیروز ترمیم می‌شود. پوست خوک که از نظر آناتومی و فیزیولوژی نزدیک‌ترین شباهت را به پوست انسان دارد، بهترین مدل برای مطالعه‌ی ترمیم جراحات با فیروز است. اگر چه، به‌دلیل تفاوت پوست آن‌ها با پوست انسان نمی‌توان نتیجه‌ی مطالعات ترمیم آسیب‌ها در این حیوانات را به پوست انسان تعمیم داد. با این حال، بیشتر کارهای تحقیقاتی به‌دلیل سهولت در پرورش و تکثیر، کارکردن و هزینه‌ی کم نگهداری، روی جوندگان (موش‌ها و رت‌ها) یا لاگومورفا (خرگوش‌ها) انجام می‌شوند. پوست انسان سفت است و انقباض آن نقش زیادی در

ترمیم زخم ایفا نمی‌کند. برعکس، پوست جوندگان و خرگوش شل است و به همین دلیل هم برای کاهش اندازه‌ی زخمی که باید ترمیم شود، تحت تأثیر انقباض شدید قرار می‌گیرد. مشکل کلی مطالعات ترمیم آسیب‌های پوستی این است که به‌علت تنوع در نوع زخم، گونه‌ی حیوانات، جنس، سن، محل و اندازه‌ی زخم آن‌ها به‌سختی قابل مقایسه هستند. بنابراین باید هشدار داد که تفسیر نتایج تحقیقات در زمینه‌ی ترمیم پوست، بدون در نظر گرفتن مدلی که از آن استفاده شده، پارامترهایی که مشاهده‌ها و اندازه‌گیری‌ها بر مبنای آن‌ها صورت گرفته به خوبی استاندارد نشده‌اند.

پوست از جمله بزرگ‌ترین بافت‌های بدن است که دایم در طول زندگی در حال گسترش و نوسازی است. پوست از لحاظ مورفولوژی و عملکردی، از دو لایه تشکیل شده است که عبارتند از روپوست یا اپی‌درم (epidermis) که لایه‌ای اپی‌تلیال با منشأ اکتودرم است، سلول‌های کراتینوسیت درون آن قرار گرفته، و حایلی بین بیرون و داخل بدن فراهم کرده؛ مانع از دست‌رفتن رطوبت بدن می‌شود و فعالانه بدن را در مقابل خطرات محیطی مثل عفونت‌ها، مواد شیمیایی و اشعه‌ی فرا بنفش حفظ می‌کند. میان‌پوست یا درم (dermis) که یک بافت همبند با منشأ مزودرمی و غنی از کلاژن است که نقش آن تأمین و تغذیه‌ی روپوست می‌باشد و مسئول انعطاف‌پذیری و انسجام مکانیکی پوست است. پوست ممکن است پوشیده از مو باشد، که اهمیت و نقش اثبات‌شده‌ای برای بازسازی خود و تمایز، و فرآیند ترمیم زخم دارد<sup>۱</sup>.

آزمایش‌های متعددی بر روی مدل‌های انسانی و جوندگان در *in vitro* و *in vivo* انجام شده که به سه گروه دسته‌بندی می‌شوند: الف) درک بهتر زیست‌شناسی پوست و مبانی سلولی، مولکولی و بیوشیمیایی فرآیند ترمیم زخم، ب) توسعه‌ی بالینی مؤثر جایگزین‌های پوست و ج) معرفی، بومی‌سازی و

جایگزین ساخته‌شده‌ی پوست را براساس ساختار و عملکرد فعلی پوست طراحی کردند.

در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، این نظریه که لایه‌ی میانی کراتینوسیت‌های لایه‌ی پایه‌ی اپی‌درم از نظر توانایی رشد متفاوتند شکل گرفت. کراتینوسیت‌ها که ظرفیت رشد وسیع‌تری داشتند (۱۳۰ بار تقسیم می‌شوند) به عنوان هولوکلون یا «سلول بنیادی» نامیده شدند. پاراکلون‌ها که سلول‌های تولیدکننده‌ی موقت هستند که دچار تمایز نهایی می‌شوند و حداکثر ۱۵ بار تقسیم می‌شوند. مروکلون‌ها نوع حد وسط بودند.

در حال حاضر، این موضوع پذیرفته شده است که اپی‌درم بالغ با سلول‌های بنیادی چندتوان نگهداری می‌شوند، که به سلول‌های مختلفی از جمله آن‌هایی که ریشه‌ی مو را می‌سازند، اپی‌درم داخل ریشه، و غده‌های چربی تمایز می‌یابند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین محل ذخیره‌ی این سلول‌های بنیادی اپی‌درم برآمدگی فولیکول مو باشد.

اگرچه، فرض شده بود که در شرایط معمولی ممکن است سلول‌های بنیادی ریشه‌ی مو در بازسازی اپی‌درم شرکت نداشته باشند، اما ممکن است به‌عنوان ذخیره عمل کنند و پس از صدمه‌دیدن اپی‌درم به کار گرفته شوند و به محل انتقال یابند.<sup>۱</sup>

## ساختار پوست

پوست از دو لایه ساخته شده؛ روپوست یا اپی‌درم و میان‌پوست یا درم. روپوست یک لایه‌ی اپی‌تلیال با منشأ اکتودرم است که در درجه‌ی اول از کراتینوسیت‌ها در مراحل مختلف تمایز، و سلول‌های پایه‌ی فعال میتوتیکی (لایه‌ی قاعده‌ای و طبقه‌ی زایا) تا سلول‌های سطحی به‌شدت کراتینیزه‌شده (طبقه‌ی شاخی) که دائماً ریخته می‌شوند تشکیل شده است. کراتینوسیت‌ها به یکدیگر از پهلو متصل‌اند تا یک لایه‌ی نفوذناپذیر را در برابر آب تشکیل دهند.

شناساندن سلول‌های بنیادی جنینی و بالغ و روشن‌سازی نقش آن‌ها در بازسازی پوست و ترمیم زخم. تحلیل این مطالعات نشان‌دهنده‌ی آن است که یکی پس از دیگری به‌دست آمده و مکمل‌بودن پیوسته‌ی این مطالعات است. روش‌های نوین دست‌ورزی ژن در مدل‌های مختلف پوست مستلزم استفاده‌ی ژن‌درمانی بالینی است. البته دیدمان بازسازی پوست روند پیچیده‌ای است که نیازمند تلاش و همکاری چندین رده‌ی سلولی مانند سلول‌های خون (پلاکت‌ها، ماکروفاژها، نوتروفیل‌ها و لنفوسیت‌ها)، اکتودرم (کراتینوسیت‌ها)، و سلول‌های مزودرم (فیبروبلاست‌ها) است. همه‌ی فاکتورهای رشد و مارکرهای ماتریکسی ترشح که در مراحل طبیعی ترمیم جراحات مانند: التهاب، رشد و تکثیر، مهاجرت، سنتز ماتریکس، بالغ‌شدن، و تغییر شکل شرکت دارند، به آن‌ها پاسخ می‌دهند که عملکرد و جنبه‌ی زیبایی پوست را حفظ می‌کنند.<sup>۱</sup>

آسیب به پوست و نیاز به پوشانیدن پوست برای حفظ زندگی، استفاده و توسعه‌ی جایگزین‌های کاشت پوست را گسترش داده است که شامل محصولات موقت و دائمی‌ای هستند که دارای بنیان زیستی، سلول‌های کشت داده‌شده (سلولی)، ساخته‌شده، غیر سلولی و جایگزین‌های پوستی پیچیده می‌باشند که بیشتر آن‌ها به‌صورت تجاری در دسترس هستند یا به‌وسیله‌ی آزمایشگاه‌های بانک پوست تهیه می‌شوند. اولین کسانی که جداسازی و رشد سلول‌های کراتینوسیت انسان را گزارش کردند هووارد و همکارانش بودند. آن‌ها در اولین کاربرد بالینی استفاده‌ی کشت کراتینوسیت‌های اوتولوگ برای کاشتن در محل‌های سوختگی شرکت کردند. بل جایگزین‌های مرکبی برای کراتینوسیت‌های اپی‌درم نوزادی پوشیده‌شده با کلاژن با فیبروبلاست‌های پوست نوزاد را طراحی کرد. یاناس، بورک و همکاران یک

ECM حاوی شبکه‌ی رشته‌های کلاژنی و الاستین است. رشته‌های کلاژن و الاستین در هر دو لایه‌ی پاپیلاری و رتیکولر به حالت مشبک (سببباف) سازمان‌دهی شده‌اند. مویرگ‌چندانی از داخل لایه‌ی رتیکولر نمی‌گذرد. لایه‌ی رتیکولر روی لایه‌ی هیپودرم یا زیرپوست، که قسمتی از پوست نیست قرار دارد. مجموعه‌ای از رشته‌های کلاژنی منفصل که از لایه‌ی رتیکولر کشیده شده‌اند، آن‌را به پوست زیرین قلاب می‌کند. این قلاب‌ها بسته به نوع موجودات، یک دامنه‌ی حرکتی‌ای دارند که حرکت‌های مختلف سطحی پوست را با توجه به هیپودرم فراهم می‌آورد. پروتئین‌های ECM پوست سه دسته هستند: پروتئوگلیکان‌ها (PGs)، پروتئین‌های فیبری و پروتئین‌های چسبنده<sup>۴۵</sup>. پروتئوگلیکان‌ها پروتئین‌هایی هستند که به GAG‌های سولفات متصل شده‌اند که در بین آن‌ها درماتان‌سولفات، هپاران‌سولفات و کندروایتین‌سولفات در ECM پوست مهم هستند. پروتئوگلیکان‌های مهم در پوست PG‌های بلند ورسیکان و PG‌های کوچک دکورین هستند. چندین PG به مولکول‌های HA متصل شده‌اند تا اسید هیالورونیک - PG را بسازند. این ترکیب‌ها، که از جمله بزرگ‌ترین مولکول‌های شناخته‌شده‌ی زیستی هستند، یا تمایل آب را از میان ورسیکان‌ها دربرمی‌گیرند و باعث تورم ماتریکس پوستی می‌شوند. اتصال آب به ECM پوست آسیب‌ندیده باعث ایجاد مقاومت در برابر نیروی فشار و ایجاد فضا برای جابه‌جایی سلول در پوست آسیب‌دیده می‌شود. کلاژن‌ها و اندکی الاستین مهم‌ترین پروتئین‌های اصلی فیبری شکل در ECM هستند. کلاژن به ECM قدرت انبساط و الاستین به آن حالت ارتجاعی می‌بخشد و به پوست اجازه می‌دهد کشیده شود و بعد به حالت اولیه‌ی خود برگردد. کلاژن نوع I (۸۰٪) و کلاژن نوع III بیشترین کلاژن‌ها در ماتریکس پوست هستند. البته مقدار کمی هم از سایر انواع کلاژن در آن وجود دارد. کلاژن نوع VI یک

ماتریکس خارج سلولی (ECM) (extra cellular matrix) طبقه‌ی قاعده‌ای حاوی اسید هیالورونیک (hyaluronic acid [HA]) است که یک گلیکوزآمینوگلیکان (glycosaminoglycan [GAG]) چندین یونی و سولفات‌نشد است که به آب و سلول‌های پایه‌ی بیان‌کننده‌ی گیرنده‌ی CD44 متصل می‌شود<sup>۲</sup>. سلول‌های بنیادی طبقه‌ی قاعده‌ای به‌طور دایم در حال تقسیم برای نوسازی خود هستند و بیشتر به کراتینوسیت‌هایی متمایز می‌شوند که به بیرون مهاجرت می‌کنند تا جایگزین سلول‌های طبقه‌ی شاخی پوست که ریخته می‌شوند، گردند. سه نوع سلول دیگر غیر اپی‌تلیالی به میزان کمتری در اپی‌درم وجود دارند که عبارتند از: ملانوسیت‌ها، که به پوست رنگ می‌بخشند، سلول‌های لانگرهانس یا سلول‌های دندریتی سیستم ایمنی که ارایه‌کننده‌ی آنتی‌ژن هستند و سلول‌های مرکل، که به‌نظر می‌رسد به‌عنوان گیرنده‌های مکانیکی عمل می‌کنند<sup>۳</sup>. تعدادی از ضمیمه‌های اپی‌درم به سمت داخل، در درم واقع شده‌اند که شامل فولیکول مو، غدد ترشح‌کننده‌ی عرق و چربی هستند. میان پوست از دو لایه‌ی فیبروبلاست واقع در ECM، لایه‌ی پاپیلاری مجاور لایه‌ی قاعده‌ای اپی‌درم و لایه‌ی مشبک عمیق‌تر تشکیل شده است<sup>۳</sup>. در لایه‌ی پاپیلار درم، شبکه‌ی مویرگی‌ای نفوذ کرده است که مواد غذایی برای اپی‌درم فراهم آورده و به‌عنوان تبادل‌کننده‌ی گرما عمل می‌کند. محیط خارج سلولی داخل لایه‌ی پاپیلاری شبکه‌ای از رشته‌های کلاژنی و کشش‌پذیر دارد. mast cells یا سلول‌های ایمنی که در واکنش‌های حساسیتی، هیستامین آزاد می‌کنند، در درم و در سایر قسمت‌های بافت همبند بدن وجود دارند.

ماکروفاژهای بافت (سلول‌های فاگوسیتوزکننده)، از درم حفاظت می‌کنند. لایه‌ی رتیکولار درم ضخیم‌تر از لایه‌ی پاپیلاری است و خصوصیت آن داشتن یک

می‌شود.<sup>۸</sup> غشای مذکور از دو لایه تشکیل شده است، اول تیغه‌ی شفاف که مستقیماً زیر سلول‌های اپی‌درم است و تیغه‌ی متراکم که بلافاصله بعد از لایه‌ی پاپیلاری درم است. تیغه‌ی شفاف بیشتر از گلیکوپروتئین لامینین (laminin [Ln]) تشکیل شده، درحالی که تیغه‌ی متراکم از کلاژن نوع IV، پرلکان، یک پروتئین دیگر، انتکتین که کلاژن نوع IV و Ln را به هم متصل می‌کند، تشکیل شده است. پرلکان یک هیپران‌سولفات PG - است که هم کار ساختاری و هم غربالگری را برعهده دارد. سلول‌های اپی‌درم به‌وسیله‌ی همیدسموزوم‌ها از میان اینتگرین  $\alpha 6\beta 4$  به تیغه‌ی شفاف متصل شده‌اند درحالی که فیبرهای کلاژن نوع هفت، تیغه‌ی متراکم را به ECM لایه‌ی پاپیلاری درم متصل می‌کند.<sup>۵،۸</sup> ماتریکس خارج سلولی پوست به‌عنوان ذخیره‌ی فاکتورهای رشد عمل کرده و آن‌ها را به‌صورت پنهان به‌هم متصل می‌کند و در موقع آسیب‌دیدن پوست آن‌ها را رها می‌کند. فاکتورهای رشد، مولکول‌های سیگنال‌دهنده‌ای هستند که بسته به نوع سلول باعث تحریک یا مانع تکثیر، مهاجرت، و تمایز می‌شود. به‌عنوان مثال، فاکتور رشد تومور  $\beta$  (tumor growth factor- $\beta$  [TGF $\beta$ ])، که در سه ایزوفرم وجود دارد، به دکورین، کلاژن نوع IV، Fn، و ترومبوسپاندین (thrombospondin) متصل می‌شود.<sup>۹</sup> ماتریکس خارج سلولی فاکتورهای رشد، مولکول‌های چسبنده‌ی سلولی (cell adherent molecules [CAM]) و گیرنده‌های فاکتورهای رشد، نقش‌های مهمی در هماهنگ کردن ترمیم زخم پوست ایفا می‌کنند.

### سلول‌های فیبروبلاست

فیبروبلاست‌ها تشکیل‌دهنده‌ی اصلی‌ترین سلول‌های مستقر در بافت همبند هستند و سنتز و ترشح ترکیب‌های بافت همبند و مولکول‌های پیش‌ساز انواع مختلف کلاژن و فیبرهای الاستین را برعهده دارند. برنامه‌ی ترشحي فیبروبلاست‌ها تعیین‌کننده‌ی

شبکه‌ی پرشاخه از رشته‌های احاطه‌کننده‌ی رشته‌های کلاژن نوع I را به وجود می‌آورد. کلاژن نوع IV جزئی از غشای پایه‌ای رگ‌های خونی است، و کلاژن نوع VIII اطراف ریشه‌های مو و رگ‌های کوچک خونی واقع شده است. فیبرونکتین (fibronectin [Fn])، ویترونکتین (vitronectin [Vn]) و تناسین C - C (tenasin-C [Tn-C]) پروتئین‌های چسبنده‌ی غالب پوست هستند. Fn و Vn به‌عنوان پیش‌ماده‌ای برای چسبیدن سلول‌های مهاجر یا ثابت عمل می‌کنند.<sup>۴</sup> Tn-C یک پروتئین فاقد قدرت چسبندگی است که به همراه Fn میزان چسبندگی سلول به ECM را کنترل می‌کند. پروتئین‌هایی که ECM پوست و هم‌چنین ECM سایر بافت‌ها و اعضا را می‌سازند، سکانس‌های شناسایی آمینواسیدهای کوتاهی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به‌وسیله‌ی انواع گیرنده‌ها به سلول‌ها بچسبند. خانواده‌ی اصلی گیرنده‌ی سلول برای مولکول‌های ECM، مانند کلاژن‌های نوع I، نوع III و Fn، اینتگرین‌های پروتئین‌های پیوندی هتروداایمریک با میل ترکیبی کم هستند که از دو جزو  $\alpha$  و  $\beta$ ی غیر هم‌ظرفیت گلیکوپروتئینی خلال غشایی تشکیل شده‌اند. اینتگرین‌ها در سه مورد عمل می‌کنند: چسباندن سلول‌ها به ECM، مهاجرت سلول‌ها در ECM، و حفاظت و آسان‌سازی بیان ژن به‌وسیله‌ی انتقال سیگنال‌ها به هسته.<sup>۶</sup> Tn-C و کلاژن نوع I، دامین‌های (domains) تکرار فاکتورهای رشد اپی‌درم (epidermal growth factor [EGF]) را دارند که به گیرنده‌های فاکتور رشد اپی‌درم (epidermal growth factor receptors [EGFR])، که یک کیناز تیروزینی است، متصل می‌شوند.<sup>۷</sup> جایگاه‌های شناسایی دیگر به پروتئین‌ها اجازه می‌دهند که به یکدیگر بچسبند، در نتیجه، سازمان ECM را تنظیم می‌کنند. یک غشای پایه که حدود ۱۰۰ نانومتر ضخامت دارد، به‌وسیله‌ی اپی‌درم ساخته می‌شود و به‌وسیله‌ی لایه‌ی پاپیلاری درم به اپی‌درم وصل

بین بیشتر سلول های گیاهی<sup>۱۰</sup> و حیوانی<sup>۱۱</sup> یافت می شود. این ماده سلول ها و عضوهای موجودات زنده ی پرسلولی را به هم می چسباند. هم چنین برای شکل دهی آن ها ضروری است و یک چهارچوب پایدار را برای حفظ شکل بافت های تحت تأثیر جاذبه و سایر فشارهای فیزیکی فراهم می آورد<sup>۱۲</sup>. بدون این ماده، زندگی پرسلولی نمی تواند وجود داشته باشد یعنی گیاهان رشد نمی کنند و حیوانات نمی توانند شنا کنند، راه بروند یا پرواز کنند. با توجه به اهمیت ECM برای تکامل موجودات پیچیده، تعجب آور نیست که سیر تکامل ترکیب های آن کاملاً به تکامل نژادی گیاهان و حیوانات مرتبط باشد<sup>۱۳-۱۶</sup>. زندگی روی زمین تقریباً ۴ میلیارد سال پیش آغاز شد، و دست کم ۳ میلیارد سال بعد از حیات تک سلول، حیات شکل گرفت، پرسلولی ها احتمالاً به تدریج از تحول موجودات کلنی شکل تک سلولی به وجود آمدند<sup>۱۷ و ۱۶</sup>.

به سختی می توان تاریخ پیدایش موجودات پرسلولی واقعی را تعیین کرد. به طور قطع یک مرحله ی مهم در تکامل پدید آمدن انواع مختلف سلول های ویژه ی فناپذیر در کنار رده ی سلول های جنینی و بنیادی بالقوه جاودان درون یک کلونی سلولی است<sup>۱۸</sup>. در نهایت، این بخش از کار باعث به وجود آمدن موجودات رده بالای شده است که اجزای آن ها دیگر نمی توانند به تنهایی به حیات خود ادامه دهند. ولوکس گوپچه ی نیمه شفافی از ECM به همراه سلول های سوماتیک یکسان و ریشه دار سطحی است که سلول های جنینی در مرکز آن قرار دارند. ماتریکس خارج سلولی ولوکس به خوبی ساخته شده ولی بسیار متنوع تر از آن چه در گیاهان و حیوانات امروز دیده می شود است و همین وضعیت ممکن است در مورد اولین موجودات پرسلولی در تکامل هم بوده باشد.

قلمروهای گیاه و حیوان یک میلیارد سال پیش از هم جدا شدند و این اتفاق ممکن است با پدید آمدن هم زمان دو نوع پیشرفته ECM بوده باشد. جلبک های

ساختار ECM و در نتیجه فراهم کننده ی اساس ساخت نوع به خصوصی از بافت همبند می باشد. فیبروبلاست ها دوکی شکل هستند و تمام خصوصیات سلول های فعال تولید کننده ی پروتئین را دارند. آن ها سیتوپلاسم کشیده با چندین زائده ی سطحی که حاوی شبکه ی آندوپلاسمی خشن به شدت متراکم است را دارند. در دستگاه گلژی، پروتئین های ترشحی اصلاح می شوند، سپس، در وزیکول های کوچک یا سایر حمل کنندگان گلژی بسته بندی می شوند تا متعاقباً به سطح سلول فرستاده شوند و توسط اگزوسیتوز بیرون بریزند. همه ی ترکیب های ماده ی زمینه ای و هم چنین پروکلاژن ها و ترکیب های رشته های الاستیک پی در پی ترشح می شوند. برخلاف اتفاق های حین ترشح تنظیم شده، محصول های سلول مرتبط در دستگاه گلژی بسته بندی و سپس صادر می شود: یعنی آن ها درون سلول ها متراکم نمی شوند. مولکول های پروکلاژن از دستگاه گلژی عبور می کنند و به طور همگام به همراه سایر پروتئین ها دستگاه گلژی را بدون ترک کردن قنات های صاف طی می کنند. قطعه های بی نهایت دقیق انتهایی فرآیندهای فیبروبلاست ها در تماس با یکدیگرند و شبکه ای را سامان می دهند، که با هم و با دسته رشته های کلاژن معماری اولیه بافت همبند را فراهم می آورند. فیبروبلاست غیرفعال یا فیبروسیت از فیبروبلاست فعال کوچک تر و دوکی شکل است. این سلول زوائد کمتر، هسته ی کوچکتر، تیره تر و طولی تری دارد. سیتوپلاسم اسیدوفیل و آندوپلاسمی خشن کم است.

### ماتریکس خارج سلولی

ماتریکس خارج سلولی نه تنها چهارچوبی برای نگهداری شکل موجودات پرسلولی در زیر فشار فیزیکی و حین حرکت را فراهم می آورد بلکه برای حفظ ساختار و توانایی بازسازی آن ها هم بسیار اساسی است. ECM یک اصطلاح برای یک ماده ی معدنی است که

ممکن است تفاوت‌های زیادی در توالی و ساختار داشته باشند تا عملکردهای متفاوتی از خود نشان دهند. ترکیب دمین‌های مختلف منجر به چند عملکردی بودن همه‌ی پروتئین‌های ECM می‌شود. معمولاً، چندین دمین در یک پروتئین با هم کار می‌کنند. هم‌چنین مشاهده شده که دمین‌های یک پروتئین چند دمینی با یکدیگر در تعاملند و از این راه یک هویت کارکردی جدیدی را به‌وجود می‌آورند. چند عملکردی بودن و شکل‌های گسترده، ظرفیت تعامل جانبی را در جهت تشکیل فیبرها و سایر ساختارهای فوق مولکولی در پروتئین‌های ECM فراهم می‌آورند. پروتئین‌های ECM به چند دسته گلیکوپروتئین‌ها، PGها و کلاژن‌ها تقسیم شده‌اند. PGها شامل زنجیره‌های بلند و باردار GAGها هستند که با پیوند کووالانسی به سرین‌ها یا تریونین‌های هسته‌ی پروتئینی متصل شده‌اند. برخی زنجیره‌های GAG، مثل هیالورونان هم که به پروتئینی اتصال ندارند یافت شده‌اند. کلاژن‌ها به‌عنوان گلیکوپروتئین‌ها یا پروتئوگلیکان‌ها با یک یا چند قلمرو کلاژنی تعریف شده‌اند. انتهای آن‌ها یک قسمت با تکرار سکانس (GXY)<sub>n</sub> می‌باشد. سه زنجیره با چنین سکانس‌هایی با هم ترکیب می‌شوند تا کلاژن سه هلیکسی را به‌وجود آورند.<sup>۲۲</sup>

### خود سازماندهی ماتریکس خارج سلولی

به‌عنوان یک اصل، ترکیبات ECM به‌صورت مولکول‌های محلول مجزا عمل نمی‌کنند، بلکه بیشتر به‌صورت تجمع ماکروسکوپی با ترکیبی پیچیده عمل می‌کنند. مولکول‌های ECM یک خصوصیت ذاتی دارند که می‌توانند به خود متصل شوند و ساختارهای منظمی با سایر پروتئین‌های ECM تشکیل دهند. این خصوصیت‌ها به‌دلیل ساختار مولکولی‌ای می‌باشد که در آن دمین‌ها با قابلیت به‌هم‌بستن مختلف و الگوهای تعریف‌شده، مرتب شده‌اند. بیشتر واکنش‌های بین

چسبنده، قارچ‌ها و گیاهان به‌طور نسبی ECM یکسانی را در دیواره‌های سلول خود به‌دست آوردند<sup>۱۰</sup> که در مرحله‌ی اول از پلی‌ساکاریدهای مختلف زنجیره‌ی بلند (مانند سلولز در گیاهان) با مقدار کم ولو مهم پروتئین‌ها تشکیل شده است.<sup>۱۹</sup> این با ECM پیچیده‌تر و متنوع‌تر حیوانات مغایرت دارد. حدود ۴۵۰ میلیون سال پیش، در مرحله‌ی کوتاهی از تکامل به نام «انفجار کمبرین»<sup>۲۰،۲۱</sup>، تمام گروه حیواناتی که امروزه روی زمین زندگی می‌کنند به همراه تعداد خیلی بیشتری که مدت‌ها پیش ناپدید شده‌اند و فقط اثر فسیلی آن‌ها برجامانده است به وجود آمدند.<sup>۲۲</sup>

### اجزای سازنده‌ی ماتریکس خارج سلولی

ECM به‌وسیله‌ی انواع زیادی پروتئین‌های متنوع با ساختارها و عملکردهای متفاوت ولی با برخی ویژگی‌های مشترک، شکل گرفته است. بسیاری از پروتئین‌های ECM بسیار بزرگ هستند. در اندازه‌ی آن‌ها اغلب گلیکوزیله‌شدن گسترده، که به‌طور متوسط ۳۵٪ وزن را دارد، و در مورد پروتئوگلیکان‌ها اتصال کووالانسی رشته‌های گلیکوز آمینوگلیکان، دخالت می‌کنند. جرم مولی آن‌ها اغلب بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ kDa متغیر است البته، پروتئین‌هایی بزرگ‌تر از این هم شناخته شده‌اند. در کل، پروتئین‌های ECM از لحاظ شکل خیلی نامتقارن هستند. همه‌ی پروتئین‌های ECM چند دمینی هستند که در آن‌ها دمین‌های مساوی یا متفاوت در یک سازمان دمینی خاصی مرتب شده‌اند. دمین‌ها به‌عنوان واحدهای همسان (هومولوگ) تعریف شده‌اند. همسانی در پی مقایسه‌های توالی آمینواسیدی می‌آید. در موارد زیادی، ساختار دمین‌ها به‌عنوان قدرت تفکیک اتمی که قدرت شناسایی حساس‌تری برای همسانی ساختار فراهم می‌کند شناخته شده است. هر دمین ممکن است حتی پس از قطعه‌قطعه یا جداشدن از پروتئین عملکردهای مجزایی داشته باشد. حتی دمین‌های همسان هم

زیست‌شناسی به‌طور گسترده‌ای شناخته شده‌اند و قسمت‌های ECM ممکن است چنین در نظر گرفته شوند.<sup>۲۸</sup>

### مراحل ترمیم جراحی

ترمیم یک جراحی پوستی را می‌توان به سه مرحله‌ی تلفیقی نزدیک به هم که بسته به اندازه‌ی جراحی چارچوب زمانی متفاوتی را اشغال می‌کنند، تقسیم کرد. این مراحل عبارتند از: جلوگیری از خون‌ریزی، آماس (التهاب) و ترمیم ساختاری<sup>۲۹-۳۲</sup>. هر مرحله با هم‌پوشانی مرحله‌ی دیگر آغاز می‌شود. مرحله‌ی ترمیم ساختاری را می‌توان به شکل‌گیری بافت گرانولاسیون جدید و تغییر وضعیت بافت گرانولاسیون به شکل‌گیری جای زخم تقسیم کرد که ممکن است بین ۶ ماه تا دو سال طول بکشد.<sup>۳۳</sup>

سلول‌های متفاوتی در فرآیند ترمیم درم و اپی‌درم نقش اساسی ایفا می‌کنند. پلاکت‌ها، نوتروفیل‌ها، ماکروفاژها، سلول‌های T، Mast Cells و اکسون‌های آسیب‌دیده‌ی حسی و اعصاب پس‌غده‌ای در توقف خون‌ریزی و التهاب نقش دارند. سلول‌های اپی‌درم، فیبروبلاست‌های درم و سلول‌های اندوتلیال شرایط لازم برای ترمیم ساختاری را فراهم می‌کنند. این نوع سلول‌ها فرایند ترمیم را با تولید مولکول‌های ECM، پروتئازها، فاکتورهای رشد، سایتوکاین‌ها و کموکاین‌هایی که تحریک‌کننده یا بازدارنده‌ی فعالیت‌های خاص سلول هستند، هماهنگ می‌کنند.<sup>۳۳</sup> مراحل ترمیم عبارتند از: (۱) تشکیل لخته. لخته‌ی فیبرونی پلاکت‌ها را به دام می‌اندازد و سلول‌های قرمز خون لخته در سطح پوست خشک‌شده یا جای زخم را پدید می‌آورد. (۲) التهاب. لخته به‌وسیله‌ی ماکروفاژها و نوتروفیل‌ها مورد هجوم قرار گرفته است. سلول‌های پایه‌ی اپی‌درم در حال مهاجرت به داخل لخته و زیر زخم هستند. فیبروبلاست‌ها در پایان مرحله‌ی تورم شروع به ورود به لخته می‌کنند. فیبروبلاست زخم را

ترکیبات ECM غیر کووالانسی هستند، اگرچه، به دلیل چند والانسی بودن و اتصال دسته‌جمعی و همکارانه، بسیار پایدار هستند. علاوه بر این، آنزیم‌های خاص می‌توانند پیوندهای متقابل کووالانسی غیرقابل‌برگشتی را شکل دهند. لامینین‌ها در حضور یون‌های کلسیم خودبه‌خود شبکه‌های گسترده‌ای را شکل می‌دهد و با نیدوزن/انتکتین، آ- دیستروگلیکان و پروتئین‌های دیگر کنش متقابل دارد. فرآیند ساخت در نهایت به ساختارهای پیچیده‌ای مانند غشای پایه منجر می‌شود که از تعداد زیادی پروتئین ساخته شده که شامل لامین‌ها و کلاژن نوع IV می‌باشد.

گام‌های مهم اصلی در شکل‌گیری ساختارهای فرا مولکولی فرآیندهای خودساز برانگیخته از توانایی‌های تعامل بین دمنین‌ها هستند. خودسازی با نفوذ گیرنده‌های سلولی و فشارهای محیط پیرامون سلول ترکیب شده است. این فرایند ساخت به‌وسیله‌ی تاثیر سلول‌ها و تغییر و تبدیل پروتئین بسیار منظم است. نتیجه‌ی ساختارهای فرا مولکولی یک حد بالایی از پیچیدگی را به نمایش می‌گذارد. عملکردهای زیستی آن‌ها معمولاً در نتیجه‌ی کارکرد دسته‌جمعی ترکیبات فراوانی است که با هم همکاری می‌کنند. این که یک دمنین دورافتاده از ECM یک عملکرد مشخص دارد، گمراه‌کننده است. در واقع، چندین دمنین یک پروتئین و سایر پروتئین‌ها در یک شبکه با همکاری هم، کار می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌توان به شبکه‌ی بین الاستین و فیبریلین<sup>۲۳</sup>، ارائه و فعال‌سازی پروتئین‌های مربوط به ریخت‌شناسی استخوان با دمنین‌هایی درون فیبریلین<sup>۲۴</sup>، فعال‌سازی اینتگرین‌ها با پروتئین‌های سیتوزولی، بخش خلال غشایی و خارج سلولی اشاره کرد<sup>۲۵-۲۷</sup>. قدرت فزاینده‌ی روش‌های ساختاری و پویا جزئیات سازوکار برهم‌کنش و انتقال‌های ساختاری در شبکه ECM را آشکار می‌کند. در مقیاس نانو، قسمت‌هایی از این ساختار، مانند اجزای یک ماشین با یکدیگر همکاری می‌کنند. ماشین‌های مولکولی در



توده می‌کنند. هم‌زمان، مویرگ‌های جدید در بافت فیبروبلاستی جوان بازسازی می‌شوند که بافت گرانولاسیون نامیده می‌شود زیرا مویرگ‌ها به آن‌ها ظاهری قرمز رنگ و دانه‌دار (گرانول) می‌دهند.<sup>۳۳</sup>

تشکیل بافت گرانولاسیون با فاکتورهای رشد ترشح‌شده از ماکروفاژها (در درجه‌ی اول platelet derived growth factor [PDGF] و TGF- $\beta$ ) آغاز می‌شود. آزمایش‌هایی با کاهش نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها نشان دادند که ترمیم جراحات‌ها در غیاب نوتروفیل‌ها هم می‌تواند صورت بگیرد ولی در نبود ماکروفاژها این امر اتفاق نمی‌افتد.<sup>۳۴</sup> لیوویچ و راس (۱۹۷۵)<sup>۳۵</sup> گزارش دادند که ترمیم جراحات‌های پوست در خوکچه‌های هندی، که با سرم آنتی‌ماکروفاژ و استروئید (هیدروکورتیزون) تیمار شده بودند تا مانع تولید مونوسیت‌های سیار شود خراب شد. ماکروفاژها، فیبروبلاست‌ها و مویرگ‌ها یک‌جا به محل جراحی یورش می‌برند<sup>۴</sup>، که به‌خوبی با وابستگی زیستی متقابل این سلول‌ها در ترمیم جراحی همبستگی دارد. ماکروفاژها فاکتورهای رشدی از خود ترشح می‌کنند که محرک مهاجرت و تکثیر فیبروبلاست است، فیبروبلاست‌ها یک ماتریکس انتقالی برای جایگزینی ماتریکس فیبرینی می‌سازند و مویرگ‌های جدید اکسیژن و مواد غذایی برای پایداری سوخت‌وساز لازم برای فرآیندهای سلولی را حمل می‌کنند.<sup>۳۳</sup>

### مهاجرت و رشد فیبروبلاست‌ها

به‌نظر می‌رسد منبع فیبروبلاست‌ها برای ترمیم ساختاری دو جانبه باشد، یکی فیبروبلاست‌های مستقر در محل و دیگری فیبروبلاست‌های متمایز شده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی در حال گردش مغز استخوان، که از طریق مجاری رگی و عروقی وارد محل جراحی می‌شوند.<sup>۳۶</sup> فیبروبلاست‌هایی که منشأ مغز استخوان دارند، هر دو کلاژن نوع I و نوع III را

پر می‌کند و فیبرین لخته را با ECM جدید جایگزین می‌کند که بافت گرانولاسیون را شکل می‌دهد که مویرگ‌های جدید به درون آن نفوذ کرده‌اند. پوشیده‌شدن با اپی‌درم ادامه می‌یابد.<sup>۴</sup> بازپوششی با اپی‌درم و رگ‌زایی کامل می‌شود و رشته‌های کلاژن بافت گرانولاسیون با اتصال متقاطع با یکدیگر دسته‌ی ضخیمی را به موازات سطح زخم به وجود می‌آورند.<sup>۳۳</sup>

### ترمیم ساختاری

ترمیم ساختاری شامل چند مرحله می‌شود: پوشش مجدد با بافت اپی‌تلیال، تشکیل بافت گرانولاسیون و تغییر بافت گرانولاسیون منبع جوشگاه (scar). این مرحله‌ها به شرح زیر هستند:

#### الف) پوشش مجدد با بافت اپی‌تلیالی

سلول‌های لایه‌ی پایه‌ی اپی‌درم در خلال چند ساعت بعد از آسیب اتصالات خود را در لبه‌ی جراحی به یکدیگر سست کرده و مانند یک ورقه شروع به مهاجرت از میان توده‌ی فیبرینی می‌کنند تا روی سطح جراحی را بپوشانند. سلول‌های مهاجر تقسیم نمی‌شوند، بلکه در سطح پهن می‌شود چرا که سلول‌های پایه در داخل لبه‌ی جراحی تقسیم می‌شوند و سلول‌های جوان را به لایه‌ی مهاجر می‌فرستند. بعد از این که اپی‌درم مهاجر برای پوشاندن سطح زخم پهن شد، سلول‌هایش به‌صورت عمودی تقسیم می‌شوند تا اپی‌درم را ضخیم کنند و یک غشای پایه‌ای جدید بسازند. در آسیب‌های شدید پوستی، اپی‌درم موارد ضمیمه یعنی مو و غده‌ها را بازسازی نمی‌کند.<sup>۳۳</sup>

#### ب) گسترش بافت گرانولاسیون

مرحله‌ی ترمیم زخم با جایگزین شدن توده‌ی فیبرینی با بافت فیبروبلاستی مملو از مویرگ مشخص می‌شود. در طی دو روز بعد از جراحی، قبل از این که مرحله‌ی التهاب به اتمام برسد، فیبروبلاست‌ها شروع به مهاجرت از اطراف غشای میانی پوست به داخل

فیبروبلاست‌ها و سلول‌های اندوتلیال عروقی به درون جراحی عمل می‌کند<sup>۴۴ و ۴۵</sup>.

مهاجرت، تکثیر و ساخت ECM توسط فیبروبلاست‌ها در *in vitro* به‌وسیله‌ی ماکروفاژها و با تولید چندین فاکتور رشد در مرحله‌ی التهابی تحریک می‌شوند، که از بین آن‌ها PDGF و TGF- $\beta$  نقش کلیدی ایفا می‌کنند<sup>۴۶-۴۹</sup>. مطالعه‌های *in vivo* با استفاده از چنبره‌های جراحی کاشته‌شده در زیر پوست رت، نشان داد حیواناتی که ترمیم جراحی آن‌ها با از بین بردن پیش‌ماده‌ی ماکروفاژها ناقص مانده، به میزان زیادی سطح فعالیت PDGF، TGF $\beta$  و EGF را کاهش داده‌اند<sup>۵۰</sup>. با توجه به مطالب فوق چنین به‌نظر می‌رسد که PDGF اصلی‌ترین فاکتور رشدی است که باعث می‌شود فیبروبلاست‌ها قابلیت ترک مرحله‌ی G0 را داشته و وارد مرحله G1 در چرخه‌ی سلولی شوند، اگرچه فاکتور رشد فیبروبلاستی ۲ (fibroblast growth factor-2 [FGF-2]) هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل رقابتی عمل کند<sup>۵۱</sup>. گیرنده‌های PDGF به‌وسیله‌ی فیبروبلاست‌های پوست بیان می‌شوند و القای قابلیت نیازمند بیان تعدادی پروتئین است، ژن‌هایی که با PDGF برای آن‌ها فعال شده‌اند<sup>۵۱</sup>. PDGF شش ساعت پس از احراز قابلیت به‌طور هم‌افزا (سینرژیک) با فاکتور رشد شبیه به انسولین ۱ (insulin-like growth factor-1 [IGF-1]) و یک پروتئین با فعالیت شبه EGF تعامل می‌کند تا به نقطه‌ی به اصطلاح V در G1 برسد. البته فقط IGF-1 برای رسیدن به محل گذار G1/S لازم است که وقتی این نقطه حاصل شد، چرخه‌ی سلول فیبروبلاست بدون نیاز به فاکتورهای رشد پیش می‌رود<sup>۵۲</sup>. عمل پاراکراین مانند PDGF به‌وسیله‌ی ماکروفاژها انجام می‌شود، اما IL-1 ترشح‌شده توسط ماکروفاژها فیبروبلاست‌ها را برای تولید PDGF تحریک می‌کند، که بعد به‌عنوان یک حلقه‌ی اوتوکراینی عمل کند و قابلیت را بالا ببرد<sup>۵۳</sup>. ممکن است اینترفرون- $\beta$

می‌سازند، درحالی‌که فیبروبلاست‌های مستقر در محیط فقط کلاژن نوع I را می‌سازند. فیبروبلاست‌های مستقر هم از لایه‌های رتیکولر درم و بافت هیپودرم (زیرجلدی) سرچشمه می‌گیرند<sup>۳۸</sup>.

در مورد فیبروبلاست‌های کلون‌شده از پوست انسان شواهد ناهمگن زیادی وجود دارد<sup>۳۷-۴۰</sup>. زیرا گروه‌های فیبروبلاست‌های پوست از نظر ریخت‌شناسی، میزان کلاژن بیان‌شده به‌ازای هر سلول و پاسخ آن‌ها به سایتوکاین‌های مشتق از ماکروفاژها متفاوت هستند. فیبروبلاست‌های لایه‌ی پاپیلاری، اگرچه از لحاظ ریخت‌شناسی به فیبروبلاست‌های رتیکولر شباهت دارند، اما فعالیت متابولیکی و تکثیر و تراکم سلولی بیشتری در پرکردن کف فلاسک از خود نشان می‌دهند<sup>۳۸</sup>. تفاوت در مارکرهای سطحی نیز بین این لایه‌ها مشاهده شده است<sup>۴۱</sup>. بیان mRNA‌های پروکلاژن نوع I و نوع III نیز در لایه‌ی پاپیلاری بالاتر است درحالی‌که بیان mRNA کلاژناز در فیبروبلاست‌های لایه‌ی رتیکولر کم‌تر است<sup>۴۲</sup>. بین فیبروبلاست‌های مشتق از جراحی‌های داخل دهانی و غشای میانی پوست جنین ناهمگنی مشابهی مشاهده شده است<sup>۳۸</sup>. آن‌چه این تفاوت‌ها در کارکردهای بالقوه افتراقی فیبروبلاست‌ها در تشکیل بافت گرانولاسیون پدید می‌آورند هنوز شناخته نشده است. قابل توجه این‌که جابه‌جایی فیبروبلاست‌ها در ماتریکس فیبرین جراحی با واسطه‌گری گیرنده‌های اینتگرین آن‌ها انجام می‌شود. Fn و HA اجزای اصلی ماتریکس بافت اولیه التیامی در جراحی‌های پوست رت می‌باشند<sup>۴۳ و ۴۴</sup>. ترکیب HA و PG که در فضای ECM به آب متصل می‌شود مهاجرت فیبروبلاست‌ها را تسهیل می‌کند. فیبروبلاست‌ها گیرنده‌ی CD44 را بیان می‌کنند تا به این واسطه اتصال سلول به لایه‌ی HA و نقل‌وانتقال روی آن انجام شود و RHAMM، گیرنده‌ای است که به‌واسطه‌ی آن حرکت سلول در جواب به HA محلول تسهیل می‌شود<sup>۴</sup>. Fn به‌عنوان یک لایه برای مهاجرت

## ماتریکس خارج سلولی ساخته‌شده توسط فیبروبلاست‌ها

هنگامی که فیبروبلاست‌ها به محل جراحی حمله می‌کنند، ماتریکس موقتی فیبرین را با ECM، که از HA، Fn و PG‌های سولفات و کلاژن‌های نوع I و نوع III ساخته شده است، جایگزین می‌کند.<sup>۵۸،۵۹</sup> HA بر Fn در بافت گرانولاسیون اولیه چیرگی دارد و فضا را برای مهاجرت فیبروبلاست‌ها فراهم می‌کند.

کلاژن نوع III عمده‌ترین کلاژنی است که در این زمان ساخته می‌شود.<sup>۵۸،۶۰</sup> ظهور اولیه ی کلاژن نوع III با از بین رفتن Fn مرتبط است، یعنی ممکن است Fn به عنوان یک الگو برای از بین رفتن رشته‌های کوچک کلاژن نوع III عمل کند.<sup>۶۱</sup> کلاژن‌ها نخست به صورت یک شبکه‌ی معمولی مشبک سازمان‌دهی می‌شوند. سپس، ترمیم پوستی شروع به نشان دادن علامت‌های پی‌گیری مسیر فیروز به جای بازسازی می‌کند. ساخت کندروایتین‌سولفات - و درماتان‌سولفات - PG‌ها جایگزین ساخت HA می‌شود. فیبروبلاست‌ها غالباً کلاژن نوع I را می‌سازند و کلاژن بیشتری نسبت به پوست آسیب‌نندیده تولید می‌کنند. به نظر می‌رسد این تغییر جهت در الگوی ساخت ECM با PDGF و TGF- $\beta$  هماهنگ می‌شود. حال آن‌که این فاکتورهای رشد که در مرحله‌ی التهابی به وسیله‌ی پلاکت‌ها و ماکروفاژها ساخته شده‌اند، به وسیله‌ی خود فیبروبلاست‌ها در خلال شکل‌گیری بافت گرانولاسیون تولید شده‌اند. PDGF ساخت اولیه HA و در مرحله‌ی بعد سنتز GAG‌های سولفات را بهبود می‌بخشد.<sup>۶۲</sup> TGF- $\beta$  سنتز زود هنگام Fn و بعد سنتز کلاژن نوع I، الاستین، و PG‌های سولفات را تحریک می‌کند و مانع تجزیه‌ی کلاژن می‌شود.<sup>۶۳،۶۴</sup> TGF- $\beta$  تجزیه‌ی کلاژن را با دو روش تکمیلی: کاهش رونویسی ژن کلاژناز و افزایش ساخت بازدارنده‌های بافتی متالوپروتئیناز (TIMPs) [tissue inhibitors of metalloproteinases] کاهش می‌دهد.<sup>۶۲</sup>

(Interferon- $\beta$  [IFN- $\beta$ ]) فیبروبلاست‌ها را از ورود به فاز G1 باز دارد.<sup>۵۴</sup> اضافه کردن IFN- $\beta$  به فیبروبلاست‌های کشت داده‌شده در مدت ۶ ساعت بعد از تحریک PDGF، تکثیر را ممنوع کرده و این ماده مانع سنتز پروتئین تحریک‌شده توسط PDGF (شامل پروتئین‌های کدشده به وسیله‌ی ژن‌های فعال‌شده توسط (PDGF) می‌شود.<sup>۵۱</sup>

هم TGF- $\beta$  و هم TNF- $\beta$  تکثیر فیبروبلاست‌ها را تحریک می‌کنند، اما این‌که این تحریک چگونه صورت گرفته فعلاً روشن نیست. این احتمال وجود دارد که TGF- $\beta$  با تحریک سنتز PDGF تأثیر خود را به‌طور غیرمستقیم نشان دهد.<sup>۵۵</sup>

فاکتور رشد TNF- $\alpha$  سنتز DNA را فقط در رده‌ی سلولی فیبروبلاست‌ها تحریک می‌کند.<sup>۵۱</sup> اکتیوین A، یکی دیگر از اعضای خانواده TGF- $\beta$  است، که آن‌هم در فاز التهابی تنظیم می‌شود و هنگامی که جراحی مملو از بافت گرانولاسیون می‌شود به بالاترین حد خود می‌رسد.<sup>۵۶</sup> ولی در هر صورت، عملکرد اکتین A ناشناخته است.

مادام که تعداد فیبروبلاست‌هایی که به فضای جراحی هجوم می‌آورند زیاد می‌شوند و تعداد نوتروفیل‌ها کاهش می‌یابد، ماتریکس موقتی فیبرین از طریق تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین با (tissue-type plasminogen activator [tPA]) ترشح شده توسط سلول‌های اندوتلیال مویرگ‌های بازسازی شده و (matrix metallo proteinase [MMP]) ترشح شده از فیبروبلاست‌ها به اجزای محلول تجزیه می‌شوند. هنگامی که فیبرین تجزیه می‌شود، از ترشح tPA جلوگیری می‌شود و بیان بازدارنده‌ی فعال‌کننده‌ی پلاسمینوژن (plasminogen activator [PAI]) inhibitor) تحریک می‌شود، بنابراین تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین کاهش می‌یابد. از این طریق است که سیستم tPA/PAI نفوذ نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها را آهسته می‌کند.<sup>۵۷</sup>

## References

1. Singer AJ, Simon M. Wound healing and skin substitutes. In: Battler A, Leor J (editors). Stem cell and gene-based therapy: frontiers in regenerative medicine. United States of America: Springer; 2006: 372-5.
2. Chen WY, Abatangelo G. Functions of hyaluronan in wound repair. *Wound Repair Regen* 1999; 7: 79-89.
3. Ham AW, Cormak HD. Histology. Philadelphia: JB Lippincott; 1979: 614-44.
4. Clark RAF. Molecular and cellular biology of wound repair. In: Clark RAF (ed). Wound repair: overview and general considerations. New York: Plenum Press; 1996: 3-50.
5. Alberts B, Bray D, Lewis J, et al (eds.). Molecular biology of the cell. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Garland Press; 1994.
6. Adams JC, Watt FM. Regulation of development and differentiation by the extracellular matrix. *Development* 1993; 117: 1183-98.
7. Tran KT, Griffith L, Wells A. Extracellular matrix signaling through growth factor receptors during wound healing. *Wound Repair Regen* 2004; 12: 262-8.
8. Yannas IV. Tissue and organ regeneration in adults. New York: Springer; 2001: 100-20.
9. Roberts AB, Sporn MB. The molecular and cellular biology of wound repair. In: Clark RAF (ed). Transforming growth factor-beta. New York: Plenum Press, 1996: 275-310.
10. Dhugga KS. Building the wall: genes and enzyme complexes for polysaccharide synthases. *Curr Opin Plant Biol* 2001; 4:488-93.
11. Hay ED. Cell biology of extracellular matrix. New York and London: Plenum; 1991.
12. Alberts Br, Johnson A, Lewis J, et al (eds.). Molecular biology of the cell 4th ed. New York: Garland Science; 2002.
13. Exposito JY, Cluzel C, Garrone R, Lethias C. Evolution of collagens. *Anat Rec* 2002; 268: 302-16.
14. Hynes RO, Zhao Q. The evolution of cell adhesion. *J Cell Biol* 2000; 150: F 89-96.
15. Adair WS, Mecham R (eds.). Organization and assembly of plant and animal extracellular matrix. San Diego: Academic Press Inc; 1990.
16. Muller WE, Wiens M, Adell T, et al. Bauplan of urmetazoa: basis for genetic complexity of metazoa. *Int Rev Cytol* 2004; 235: 53-92.
17. Furusawa C, Kaneko K. Origin of multicellular organisms as an inevitable consequence of dynamical systems. *Anat Rec* 2002; 268: 327-42.
18. Sanchez Alvarado A, Kang H. Multicellularity, stem cells, and the neoblasts of the planarian *Schmidtea mediterranea*. *Exp Cell Res* 2005; 306: 299-308.

19. Brownlee C. Role of the extracellular matrix in cell-cell signalling: paracrine paradigms. *Curr Opin Plant Biol* 2002; 5: 396-401.
20. Couso JP. Segmentation, metamerism and the Cambrian explosion. *Int J Dev Biol* 2009; 53: 1305-16.
21. Cummings FW. On the origin of pattern and form in early Metazoans. *Int J Dev Biol* 2006; 50: 193-208.
22. Engel J, Chiquet M. An overview of extracellular matrix structure and function. In: Mecham RP (ed). *The extracellular matrix: an overview*. Washington: Springer; 2011: 1-40.
23. Ramirez F, Dietz HC. Extracellular microfibrils in vertebrate development and disease processes. *J Biol Chem* 2009; 284: 14677-81.
24. Sengle G, Charbonneau NL, Ono RN, et al. Targeting of bone morphogenetic protein growth factor complexes to fibrillin. *J Biol Chem* 2008; 283: 13874-88.
25. Collier BS, Shattil SJ. The GPIIb/IIIa (integrin  $\alpha$ IIb $\beta$ 3) odyssey: a technology-driven saga of a receptor with twists, turns, and even a bend. *Blood* 2008; 112: 3011-25.
26. Hynes R. Molecular biology of fibronectin. *Annu Rev Cell Biol* 1985; 1: 67-90.
27. Hynes RO. Integrins: bidirectional, allosteric signaling machines. *Cell* 2002; 110: 673-86.
28. Engel J. Visions for novel biophysical elucidations of extracellular matrix networks. *Int J Biochem Cell Biol* 2007; 39: 311-8.
29. Kirsner RS, Eaglstein WH. The wound healing process. *Dermatol Clin* 1993; 11: 629-40.
30. Linares HA. From wound to scar. *Burns* 1996; 22: 339-52.
31. Sicard RE, Shearer JD, Caldwell MD. Wound repair. *J Minn Acad Sci* 1998; 63: 31-6.
32. Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, et al. Wound bed preparation: a systematic approach to wound management. *Wound Repair Regen* 2003; 11 (Suppl 1): S1-28.
33. Stocum DL. Regenerative biology and medicine. *J Musculoskelet Neuronal Interact* 2002; 2: 270-3.
34. Simpson DM, Ross R. The neutrophilic leukocyte in wound repair, a study with anti-neutrophil serum. *J Clin Invest* 1972: 2009-23.
35. Leibovich SB, Ross R. The role of the macrophage in wound repair: A study with hydrocortisone and anti-macrophage serum. *Am J Pathol* 1975; 1978: 71-91.
36. Fathke C, Wilson L, Hutter J, et al. Contribution of bone marrow-derived cells to skin: collagen deposition and wound repair. *Stem Cells* 2004; 22: 812-22.
37. Bayreuther K RH, Francz PI, Maier K. Differentiation of fibroblast stem cells. In: Lord BI, Dexter TM. (eds.). *Stem cells*. Cambridge: Company of Biologists Ltd; 1988: 115-30.

38. Sempowski GD, Borrello MA, Blieden TM, et al. Fibroblast heterogeneity in the healing wound. *Wound Repair Regen* 1995; 3: 120-31.
39. Gross J. Getting to mammalian wound repair and amphibian limb regeneration: a mechanistic link in the early events. *Wound Repair Regen* 1996; 4: 190-202.
40. Lindblad WJ. Perspective article: collagen expression by novel cell populations in the dermal wound environment. *Wound Repair Regen* 1998; 6: 186-93.
41. Phipps RP, Penney DP, Keng P, et al. Characterization of two major populations of lung fibroblasts: Distinguishing morphology and discordant display of The 1 and class II MHC. *Am J Respir Cell Mol Biol* 1989; 1: 65-74
42. Ali-Bahar M, Bauer B, Tredget EE, Ghahary A. Dermal fibroblasts from different layers of human skin are heterogeneous in expression of collagenase and types I and III procollagen mRNA. *Wound Repair Regen* 2004; 12: 175-82.
43. Alexander SA, Donoff RB. The glycosaminoglycans of open wounds. *J Surg Res* 1980; 29: 422-9.
44. Grinnell F. Fibronectin and wound healing. *J Cell Biochem* 1984; 26: 107-16.
45. Risau W LV. Changes in the vascular extracellular matrix during embryonic vasculogenesis and angiogenesis. *Dev Biol* 1988: 441-50.
46. Pierce GF. Tissue repair and growth factors. In: Dulbecco R (ed.). *Encyclopedia of human biology*. New York: Academic Press; 1991: 499-509.
47. Grotendorst GR. Chemoattractants and growth factors. In: Cohen IK, Diegelman R, Lindblad WJ (eds.). *Wound healing: biochemical and clinical aspects*. Philadelphia: WB Saunders; 1992: 237-47.
48. Lawrence WT, Diegelmann RF. Growth factors in wound healing. *Clin Dermatol* 1994; 12: 157-69.
49. Gottwald T, Coerper S, Schaffer M, et al. The mast cell-nerve axis in wound healing: a hypothesis. *Wound Repair Regen* 1998; 6: 8-20.
50. Grotendorst GR, Grotendorst CA. Production of growth factors (PDGF and TGF-beta) at the site of tissue repair. In: Hunt TK, Pines E, Barbul A, et al. (eds.). *Biological and clinical aspects of tissue repair*. New York Alan R. Liss Inc.; 1988: 47-54.
51. Morgan CJ, Pledger WJ. Fibroblast proliferation. In: Cohen IK, Diegelman R, Lindblad WJ (eds.). *Wound healing: biochemical and clinical aspects*. Philadelphia: WB Saunders; 1992: 63-76.
52. Wharton W. Hormonal regulation of discrete portions of the cell cycle: commitment to DNA synthesis is commitment to cellular division. *J Cell Physiol* 1983; 117: 423-9.
53. Wahl LM, Wahl SM. Inflammation. In: Cohen IK, Diegelman R, Lindblad WJ (eds.). *Wound healing: biochemical and clinical aspects*. Philadelphia: WB Saunders; 1992: 40-62.

54. Taylor-Papadimitriou J, E R. Interferons as regulators of cell growth and differentiation. In: J T-P (editor). Interferons: their impact in biology and medicine. Oxford: Oxford University Press; 1985: 81-98.
55. Leof EB, Proper JA, Goustin AS, et al. Induction of c-sis mRNA and activity similar to platelet-derived growth factor by transforming growth factor beta: a proposed model for indirect mitogenesis involving autocrine activity. Proc Natl Acad Sci USA 1986; 83: 2453-7.
56. Hubner G, Hu Q, Smola H, Werner S. Strong induction of activin expression after injury suggests an important role of activin in wound repair. Developmental Biology 1996; 173: 490-8.
57. Li WY, Chong SS, Huang EY, Tuan TL. Plasminogen activator/plasmin system: a major player in wound healing? Wound Repair Regen 2003; 11: 239-47.
58. Miller EJ, Gay S. Collagen structure and function. In: Cohen IK, Diegelman R, Lindblad WJ (eds.). Wound healing: biochemical and clinical aspects. Philadelphia: WB Saunders; 1992: 130-51.
59. Weitzhandler M, Bernfi eld MR. Protoglycan glyconjugates. In: Cohen IK, Diegelman R, Lindblad WJ (editors). wound healing: biochemical and clinical aspects. Philadelphia: WB Saunders; 1992: 195-208.
60. Whitby DJ, Ferguson MW. The extracellular matrix of lip wounds in fetal, neonatal and adult mice. Development 1991; 112: 651-68.
61. McDonald JA. Extracellular matrix assembly. Annual Rev Cell Biol 1988; 4: 183-207.
62. Jeffrey J. Collagen degradation. In: Cohen IK, Diegelman R, Lindblad WJ (eds.). Wound healing: biochemical and clinical aspects. Philadelphia: WB Saunders; 1992: 177-94

## Skin structure and wound healing phases

Mona Malekmohammadi, MSc<sup>1</sup>  
 Hossein A. Tehrani, PhD<sup>1</sup>  
 Nasser Aghdami, MD, PhD<sup>2</sup>

1. Department of Medical Biotechnology, Faculty of Medicine, Tarbiat-Modarres University, Tehran, Iran.
2. Department of Stem Cells, Rooyan Research Institute, Tehran, Iran.

Skin injury caused by burns, surgery and other traumas may result in unpleasant psychological experiences and be reflected in behaviors. Extracellular matrix (ECM) is the largest component of natural skin which is gel-like and is produced by skin cells. ECM synthesis is a key factor for filling up skin wounds such as burns, leishmaniasis, chicken pox, acne, etc. ECM is composed of a variety of polysaccharides, water, and collagen proteins. Considering its weight, natural skin strength and its expandability are like steel, while it has high elasticity and compaction capacities. These characteristics are due to dual effects of main ECM molecules, which are secreted by fibroblasts and epidermal cells: 1) structural fiber proteins like: elastin, fibronectin and laminin which give strength and flexibility to ECM, and 2) proteoglycans such as dermatan sulfate and hyaluronic acid which are consisted of few glycosaminoglycan chains that branch out from a linear protein core. Proteoglycans are large and hydrated molecules which are resistant to external forces and protect underneath cells. In general, understanding the skin structure and wound healing phases can help us to design useful experiments and to conduct proper researches in this area.

**Keywords:** fibroblasts, extracellular matrix, wound healing

Received: Oct 23, 2011

Accepted: Dec 8, 2011

Dermatology and Cosmetic 2011; 2 (4): 229-244

**Corresponding Author:**

Mona Malekmohammadi, MSc

Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Jalale Al-e- Ahmad Avenue, Tehran, Iran. P.O.Box 14115-331  
 Email: monamalek.m@gmail.com

**Conflict of interest:** None to declare